

-
1. 面部疔痈病原菌：金黄色葡萄球菌
 2. 根管预备器械旋转运动易折断：H 锉
 3. 拔牙后出血多久是明显出血 30 分钟
 4. 出现脑脊液鼻耳漏是哪个 三型

 - 5.不能用于表面麻醉的药物 普鲁卡因
 6. Howship 陷窝 是破骨细胞（金英杰押题原题）
 - 7.成釉细胞瘤 角化珠形成 棘皮瘤型（金英杰押题原题）
 - 8 舌下腺囊肿残留囊壁不致复发，口外型根治摘除舌下腺，吸净囊液（金英杰押题原题）
 - 9 考口腔癌的发病率：十万分之一
 - 10 中老年人楔缺原因 刷牙方式不对，应力疲劳，
 - 11.上 6，3 条发育沟（金英杰押题原题）
 12. 福代斯斑 - 颊部（金英杰押题原题）
 13. 伴发脑脊液漏的是 LE FORT III 型骨折（金英杰押题原题）
 14. 梨状孔水平、牙槽突上方是 LE FORT I 型骨折（金英杰押题原题）
 - 15.降低相对有效率=对照组龋齿数-试验组龋齿数 / 对照组
 - 16.预防性树脂充填 B 型：流动树脂材料（金英杰押题原题）

 - 18.根尖周囊肿 穿刺 - 褐色 胆固醇晶体

皮脂腺囊肿 穿刺 - 白色凝乳状

牙源性角化囊性瘤 - 黄白色角蛋白 黄白液体

19. 缺牙多于两个乳磨牙、两侧缺失多于一个乳磨牙，或伴有前牙缺失 - 可摘式功能性保持器（金英杰押题原题）

20. 单侧或双侧单个乳磨牙早失 - 带环（全冠）丝圈保持器（金英杰押题原题）

21. 听诊吹风样杂音 - 动静脉畸形（金英杰押题原题）

22. 隐形唇裂 - 皮肤黏膜无裂开，肌层未联合或错位联合

23. 糖尿病血糖 8.88mmol/L 以内且无酸中毒可以拔牙

24. 三叉神经痛的性质是阵发性痛（金英杰押题原题）

25. 摩擦剂（去除色素沉着、菌斑 碳酸钙、二氧化硅）

26. 洁净剂（降低表面张力 月桂醇硫酸钠，十二烷基）

27. 胶黏剂（防止固体 液体分离，羧甲基纤维素钠）

28. 牙石覆盖 2/3 以上，计分为 CI-S 3

29. 以下哪项是接触传染：病毒性肝炎

30. I 型单纯疱疹病毒引起：原发性疱疹性口炎

31. 窝沟封闭酸蚀面积：牙尖斜度 2/3

1. 牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后 E

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 6 个月

E. 1~3 个月

2. 某氟病区的病人，其症状可见牙微黄，并有部分人牙缺损，骨关节疼痛感，四肢僵直，进而行动困难。化验：尿氟、发氟均增高，该地氟中毒流行类型最有可能是 B

A. 食源性

B. 饮水型

C. 饮茶型

D. 煤烟型

E. 空气型

3 氟中毒的机理主要在于 B

A. 氟磷灰石被取代

B. 破坏了钙磷代谢

C. 碱性磷酸酶活性被抑制

D. 钙质在骨内过多沉积

E. 骨钙被取代

4 口角的正常位置相当于 (D)。

-
- A. 第二前磨牙与第一磨牙之间
 - B. 第一前磨牙与第二前磨牙之间
 - C. 第一磨牙与第二磨牙之间
 - D. 尖牙与第一前磨牙之间
 - E. 侧切牙与尖牙之间

5 施舌系带矫正术的合适年龄是 (C)

- A. 6 个月
- B. 1 岁
- C. 1.5 岁
- D. 2 岁后
- E. 5 岁后、

6 义齿修复前 对口腔软组织的处理不包括 D (金英杰押题原题)

- A. 粘膜病的治疗
- B. 粘膜瘢痕组织的修整
- C. 松软牙槽嵴的修整
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇、舌系带的修整

7. 女，45 岁，幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补 10% 葡

萄糖 2500ml，5%葡萄糖盐水 1000 ml，10%氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量 1500ml 左右，最可能的原因是

- A.低钾血症
- B.低钠血症
- C.高钾血症
- D.高钠血症
- E.低钙血症

答案：

A

8.继承恒牙迟迟不萌出，乳牙保留在恒牙列内，X 线片上未见恒牙胚，应诊断为 C

- A.恒牙迟萌
- B.牙齿固连
- C.乳牙滞留
- D.异位萌出
- E.恒牙阻生

9 裂隙的定义 E

- A.龋病的好发部位

-
- B.副沟相交而成凹陷部位
 - C.牙冠上不规则的凹陷部位
 - D.三条或三条以上发育沟相交处的凹陷
 - E.钙化不良而形成的凹陷

10 咀嚼效率是指 D

- A.在一定时间内咀嚼磨细食物的数量
- B.咀嚼磨细一定量食物所需的时间
- C.在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度
- D.在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度
- E.咀嚼磨细食物的能力

11. 一次局部麻醉应用利多卡因的最大剂量是 C

- A.3.3mg/kg
- B.2.2mg/kg
- C.4.4mg/kg
- D.8.8mg/kg
- E.7.7mg/kg

12. 髓腔增龄性变化的描述，错误的是

- E
- A. 髓腔体积髓年龄增大而不断缩小

-
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
 - C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
 - D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
 - E. 随着磨耗，髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

13. 纤维囊壁内出现腺体的是 e

- A. 含牙囊肿
- B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿
- D. 根尖周囊肿
- E. 甲状舌管囊肿

14. 转移发生较迟且少见的口腔癌是 a

- A. 唇癌
- B. 舌癌
- C. 口底癌
- D. 颊癌
- E. 牙龈癌

15. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前颌突过度生长，出生后应尽早行

- A. 咽成形术

-
- B. 正畸治疗
 - C. 唇裂整复术
 - D. 牙槽突裂植骨术
 - E. 腭裂整复术

16.单侧下颌角骨折的最佳固定方法是

- A.单颌结扎
- B.颅颌绷带固定
- C.坚固内固定
- D.钢丝内固定
- E.颌间结扎

正确答案：C

17.男，50岁。左上颌后牙肿瘤1周，开口困难3天。检查：L7残冠，叩诊(++)。颊侧前庭沟稍肿，有深压痛，开口受限(一横指)。最可能的诊断是

- A.颊间隙感染
- B.颞下间隙感染
- C.眶下间隙感染
- D.颞间隙感染
- E.翼下颌间隙感染

正确答案：A

18.关于正中联合部双发骨折，描述不正确的是

-
- A.如为粉碎性骨折或有骨质缺损，下颌牙弓变窄
 - B.骨折线两侧肌群牵引力量相等，常无明显移位
 - C.正中骨折段可因降颌肌群的作用而向下后方移位
 - D.两侧骨折段受下颌舌骨肌的牵引可向中线移位
 - E.如为粉碎性骨折或有骨质缺损，可使舌后坠甚至窒息

19.急性浆液性根尖周炎的病理变化时

- A.少量中性粒细胞浸润
- B.根尖部牙槽骨增生
- C.病变内间增生的鳞状上皮条索
- D.病变中大量肉芽组织形成
- E.根尖部牙骨质吸收

正确答案：A

20.男，2岁。患有唇裂。行修补手术时，需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为

- A.眶下缘中点下 1.5cm，鼻翼至耳屏连线的中点
- B.眶下缘中点下 0.5cm，鼻尖至耳屏连线的中点
- C.眶下缘中点下 1.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点
- D.眶下缘中点下 0.5cm，鼻尖至睑外侧连线的中点
- E.眶下缘中点下 0.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点

正确答案：D

-
- A.前牙和后均没有接触
 - B.非工作侧多个后牙接触
 - C.工作侧多个后牙接触
 - D.工作侧和非工作侧均没有接触
 - E.工作侧和非工作侧均有接触

21.双侧平衡希的咬合接触是指

正确答案： E

22.组牙功能的咬合接触是指

正确答案： C

- A.福代斯斑
- B.牙源性囊肿
- C.上皮剩余
- D.侧支根管余
- E.牙颈部牙本质敏感症

23.上皮根鞘在牙本质形成后让不断裂会引起

正确答案： E

24 上皮根鞘残留在牙周膜中称为

正确答案： C

25.上皮根鞘连续性破坏形成

正确答案： D

26. 变性蛋白质的主要特点是

- A. 不易被蛋白酶水解
- B. 分子量降低
- C. 溶解增加
- D. 生物学活性降低
- E. 共价键被破坏

27 以下属于医务人员个人防护

- A. 手套
- B. 口罩
- C. 防护镜
- D. 保护性工作服
- E 以上均是

答案】 E

28.女 36 岁 开口困难伴疼痛一个月，检查：自然开口 30mm，被动开口 30mm，开口偏向患侧，诊断为 C

- A 关节盘附着松弛
- B 关节盘后区损伤
- C 不可复性盘前移位
- D 翼外肌功能亢进

E 可复性盘前移位

