

口腔专业 · 2019.2.27 · 空暇记忆 · 儿牙 (4)

第四单元 牙发育异常

第一节 滞留

定义	指继承恒牙已经萌出，未能按时脱落的乳牙。 或者恒牙未萌出，保留在恒牙列中的乳牙
病因	1.继承恒牙萌出方向异常 2.先天缺失恒牙 3.继承恒牙萌出无力 4.遗传因素
临床表现	常见 () 滞留，恒中切牙于舌侧萌出，呈现 () 现象 第一乳磨牙的残冠或残根滞留于继承前磨牙的 () 第二乳磨牙常因继承恒牙先天缺失而滞留
治疗	先天缺失继承恒牙导致的滞留乳牙可不予处理 继承恒牙已经萌出，滞留的乳牙应该拔除

第二节 早萌

乳牙早萌	萌出的时间超前于正常萌出的时间，而且萌出牙齿的牙根发育不足	多见于下颌中切牙。 诞生牙和新生牙多是正常牙，少数是额外牙，早萌牙极度松动，摩擦系带影响吸吮 鉴别：马牙子是 () 不是 ()	拔除极度松动的早萌牙。形成创伤性溃疡时可暂停哺乳改用匙喂。溃疡处涂药
恒牙早萌	根长的 ()	与乳磨牙早脱落有关，早失牙周围的严重感染促使早萌牙继续发育。 下颌 () 多见	控制早失牙区的感染，对早萌牙进行局部涂氟治疗，预防龋齿。必要时做阻萌器

第三节 迟萌 (助理不考)

	迟萌定义	病因	治疗
乳牙迟萌	1周岁后仍不萌出第一颗乳牙	先天无牙畸形，全身因素如佝偻病、甲状腺功能低下、营养缺乏、良性脆骨症	拍 X 线牙片确定有无恒牙，对因治疗
恒牙迟萌	牙齿萌出时间滞后，最常见 ()	局部因素局部牙龈角化增生、恒牙牙根弯曲、间隙狭窄 全身因素颅骨锁骨发育不全、先天性甲状腺分泌减少症	

第四节 额外牙（助理不考）

定义	多于正常牙类、牙数以外的额外牙
病因	1.牙板过度增殖而发生的第三次牙蕾 2.牙板断裂时，脱落的上皮细胞过度增殖 3.恒牙胚分裂而形成的 4.发育缺陷或遗传有关
临床表现	好发于（）之间，前牙区多见 额外牙可以萌出于口腔内，也可以埋伏阻生，其形态变异较大

第五节 融合牙（助理不考）

定义	由两个正常牙胚的牙釉质或牙本质融合在一起而成的
病因	牙齿发育受压力因素外，还有遗传倾向
临床表现	乳牙列融合牙比恒牙列多。乳牙多见于（）和（），或乳侧切牙和乳尖牙融合。乳牙融合多（）发生，两个牙融合多见。乳牙融合常并发继承恒牙先天缺失现象 （）多见于额外牙和正常牙融合
治疗	对乳前牙区的融合牙定期观察，对牙列无影响者，不作处理 为预防龋齿，对融合牙的异常沟窝点隙应及早进行窝沟封闭