

终极押题卷中西医执业第三单元

A1/A2 型选择题

0. COPD 的标志性症状是

- A. 慢性咳嗽
- B. 咳痰
- C. 气短或呼吸困难
- D. 喘息
- E. 食欲减退

答案:C

解析:慢性阻塞性肺疾病的临床表现:(1)慢性咳嗽:随病程发展可终身不愈。常晨间咳嗽明显,夜间有阵咳或排痰。(2)咳痰:一般为白色黏液或浆液性泡沫样痰,偶可带血丝,清晨排痰较多。急性发作期痰量增多,可有脓性痰。(3)气短或呼吸困难:早期在劳力时出现,后逐渐加重,以致在日常活动甚至休息时也感到气短,是 COPD 的标志性症状。(4)喘息、胸闷:部分患者特别是重度患者或急性加重时出现。(5)其他 晚期患者有体重下降、食欲减退等。

标签:

1. 下列关于急性加重期慢性阻塞性肺疾病的治疗,错误的是

- A. 应用支气管扩张剂
- B. 对于重度及极重度患者可应用糖皮质激素
- C. 高流量吸氧
- D. 根据病原菌类型及药物敏感情况选用抗生素
- E. 根据病情严重程度决定门诊或住院治疗

答案:C

解析:慢阻肺急性加重期治疗。①支气管舒张药,β受体阻滞剂、抗胆碱能药、茶碱类;②持续低流量吸氧,28-30%,避免吸入氧浓度过高引起二氧化碳潴留;③控制感染,根据所在地常见病原菌类型及药物敏感情况;④糖皮质激素;⑤祛痰剂。

标签:

2. 哮喘的病机关键是

- A. 肺失宣肃,肺气上逆
- B. 外邪引动伏痰
- C. 卫表不和,肺失宣肃
- D. 肺肾气虚,气失摄纳
- E. 胸阳不振,阴寒痰湿闭阻

答案:B

解析:哮喘的病因为宿痰内伏于肺。哮喘的病位在肺,而与心、肝、脾、肾

密切相关。哮喘的病理因素以痰为主，成为发病的潜在“宿根”，发作时的病理环节为痰阻气闭。

标签：

3. 支气管激发试验阳性的诊断标准

- A. FEV1 下降 $>20\%$
- B. FEV1 较用药前增加 15%
- C. PEF 较治疗前增加 $\geq 20\%$
- D. 哮喘发作时 PEF 下降
- E. FEV1/FVC%降低

答案:A

解析:支气管激发试验适用于 FEV1 在预计值 70%以上的患者。吸入激发剂(如组胺、乙酰甲胆碱)后通气功能下降,气道阻力增加。FEV1 $>20\%$,为激发试验阳性。支气管舒张试验。阳性诊断标准:①FEV1 较用药前增加 15%或以上,且其绝对值增加 200mL 或以上。②PEF 较治疗前增加 60L/min 或增加大于等于 20%。即 B、C。PEF 及其变异率的测定:哮喘发作时,呼气峰值流速(PEF)下降。若昼夜 PEF 变异率 $\geq 20\%$,符合气流受限可逆性改变的特点。即 D。E 是通气功能检测。

标签：

4. 支气管哮喘早期发作时的 X 线表现是

- A. 肺纹理增多
- B. 可见两肺透光度增加
- C. 患侧透亮度增强,肺纹理消失
- D. 左心大,肺淤血症征
- E. 肺纹理增多及炎症浸润影

答案:B

解析:胸部 X 线检查。早期发作时可见两肺透亮度增加,缓解期多无明显异常,反复发作或并发呼吸道感染,可见肺纹理增加及炎性浸润阴影,可并发肺不张、气胸或纵膈气肿。故早期为 B,反复发作伴有感染见 A、E,其他并发症见 C、D。

标签：

5. 下列各项中,关于肺炎中医病因病机的叙述,错误的是

- A. 风热犯肺
- B. 痰热壅肺
- C. 阴竭阳脱
- D. 热闭心神
- E. 劳倦内伤

答案:E

解析:病因病机包括:邪犯肺卫、痰热壅肺、热闭心神、阴竭阳脱、正虚邪恋。

本病总属外感病，强调邪气致病。阴竭阳脱为邪热内闭，阳郁不达，或阳旺邪盛，邪正剧争，骤然外脱。正虚邪恋为邪气稽留，久羁不解，耗伤气血阴阳。故以外感论，强调正虚邪恋，而非劳倦内伤。且劳倦可导致正气不足，外邪客之；而劳倦内伤就属内伤范畴，与本病属外感病不相符，故 E 为最佳选项。

标签：

6. 葡萄球菌肺炎的临床表现是

- A. 寒战，高热，胸痛，咳嗽，咯铁锈色痰
- B. 早期可出现肺实变体征
- C. 低热，盗汗，病程长
- D. 高热，咳嗽，脓性痰
- E. 咯粉红色泡沫痰

答案：D

解析：葡萄球菌肺炎。症状：起病急，寒战高热，胸痛，咳嗽，脓痰，痰带血丝或脓血状。早期可无体征，病情发展可出现两肺散在湿啰音，病变较大或融合时可有肺实变体征。

标签：

7. 原发性支气管肺癌的中医基本病机是：

- A. 外邪内侵，化热生痰酿毒于肺，久成癥积
- B. 正气虚弱，癆虫乘虚耗阴伤肺，久成癥积
- C. 正气虚弱，毒恋肺脏瘀阻络脉，久成癥积
- D. 外寒内饮，痰浊淤血互结阻肺，久成癥积
- E. 本虚标实，痰邪夙根伏隐于肺，久成癥积

答案：C

解析：肺癌基本病机是由于正气虚弱，毒恋肺脏瘀阻络脉，久而癥积。后期以正虚为根本，因虚致实。其虚以阴虚、气阴两虚多见，实则不外乎气滞、血瘀、痰凝、毒聚。

标签：

8. 中央型肺癌通过 X 线检查表现的直接征象是：

- A. 肺不张
- B. 阻塞性肺炎
- C. 局限性肺气肿
- D. 一侧肺门肿块
- E. 继发性肺囊肿

答案：D

解析：胸部 X 线检查是发现肺癌的最基本方法。中央型肺癌多为一侧肺门类圆形阴影，边缘毛糙，可见分叶和切迹。肿块与肺不张、阻塞性肺炎并存时，可见“S”形 X 线征象。局限性肺气肿、肺不张、阻塞性肺炎和继发性肺脓肿

等则是支气管完全或部分阻塞而形成的间接征象。故选D。

标签:

9. 肺动脉高压的 X 线表现是

- A. 双肺纹理增多
- B. 双肺透亮度增加
- C. 右下肺动脉干增宽横径 $\geq 15\text{mm}$
- D. 右心房肥大
- E. 右心室肥厚、扩张

答案:C

解析:肺动脉高压早期的 X 线表现为右下肺动脉干扩张,其横径 $\geq 15\text{mm}$;其横径与气管横径之比值 ≥ 1.07 ;肺动脉段明显突出,或其高度 $\geq 3\text{mm}$;右心室肥大征。故本题选C。

标签:

10. 急性左心衰竭的咯痰特征是

- A. 粉红色泡沫样痰
- B. 鲜红色痰
- C. 铁锈色痰
- D. 灰黄色痰
- E. 棕褐色痰

答案:A

解析:急性左心衰出现肺淤血,而导致呼吸困难,严重时急性肺水肿和心源性休克。急性肺水肿频繁咳嗽并咳出大量粉红色泡沫样血痰。

标签:

11. 下列各项,不属急性心衰急救治疗措施的是

- A. 左心衰使用吗啡
- B. 右室梗死使用利尿剂
- C. 左心衰使用利尿剂
- D. 梗死 24 小时内避免使用洋地黄制剂
- E. 左心衰患者端坐位,吸氧

答案:B

解析:应该扩容。禁用利尿剂合血管扩张剂,避免进一步降低右心室充盈压。

标签:

12. 治疗心力衰竭痰饮阻肺证,应首选的方剂是:

- A. 四逆汤合五苓散
- B. 参附汤合炙甘草汤
- C. 苓桂术甘汤、丹参饮
- D. 生脉饮合五苓散
- E. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤

答案:C

解析:痰饮苓桂术甘汤、苓桂术甘汤均可。但丹参饮治在心、真武汤治在肾。

标签:

13. 下列各项, 不属于房性早搏心电图表现的是

- A. 提早出现的 P'波, 形态与窦性 P 波不同
- B. P'-R>0.12 秒
- C. QRS 形态正常, 亦可增宽(室内差异性传导)或未下传
- D. 代偿间歇不完全
- E. 代偿间歇完全

答案:E

解析:过早搏动(期前收缩): ①房性早搏, 提前出现 P'波; P'-R>0.12s; QRS 形态正常; 代偿间歇不完全。②交界性早搏, 提前出现的 QRS 波, 其前无相关 P 波; QRS 形态正常; 代偿间歇完全。③室性早搏, QRS 提前出现, 宽大、畸形、切迹, 时间 0.12s; T 波宽大, 与 QRS 主波方向相反; 代偿间歇完全。

标签:

14. 下列各项, 属于 2 级高血压的是

- A. 收缩压 138mmHg, 舒张压 106mmHg
- B. 收缩压 145mmHg, 舒张压 92mmHg
- C. 收缩压 158mmHg, 舒张压 98mmHg
- D. 收缩压 165mmHg, 舒张压 112mmHg
- E. 收缩压 120mmHg, 舒张压 92mmHg

答案:A

解析:3 级高血压收缩压临界值分别是 180、160、140mmHg, 舒张压分别是 110、100、90 mmHg。

标签:

15. 血管紧张素转化酶抑制剂的不良反应主要是

- A. 低血钾
- B. 心率增快、面部潮红、头痛、下肢水肿
- C. 心动过缓、乏力、四肢发冷
- D. 体位性低血压
- E. 刺激性干咳和血管性水肿

答案:E

解析:血管紧张素转化酶抑制剂的不良反应主要是:刺激性干咳和血管性水肿。

标签:

16. 适用于高血压伴有前列腺增生的降压药是

- A. α 受体阻滞剂
- B. 钙通道阻滞剂

- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. 利尿剂

答案:A

解析:(1) α 受体阻滞剂,一般不作为高血压治疗的首选药,适用于高血压伴前列腺增生患者,也用于难治性高血压患者的治疗。(2)钙通道阻滞剂适用于各种不同程度高血压,尤其是用于老年高血压,单纯收缩期高血压,伴稳定性心绞痛、冠状动脉或颈动脉粥样硬化及周围血管病患者。(3)血管紧张素转换酶抑制剂尤其适用于伴有慢性心力衰竭、心肌梗死后、非糖尿病肾病、糖尿病肾病、代谢综合征、蛋白尿或微量蛋白尿的高血压患者。(4) β 受体阻滞剂,适用于各种不同程度高血压,尤其是心率较快的中青年患者或合并心绞痛患者。(5)利尿剂,适用于老年人和高龄老年高血压、单独收缩期高血压或伴心力衰竭患者,也是难治性高血压的基础药物之一。

标签:

17. 治疗心肌梗死心阳欲脱证,应首选的方剂是

- A. 生脉散合左归饮
- B. 补阳还五汤
- C. 真武汤
- D. 苏合香丸
- E. 参附龙牡汤

答案:E

解析:大剂参附汤回阳救逆,龙骨、牡蛎潜阳固涩。

标签:

18. 不属慢性胃炎中医病因的是

- A. 寒邪客胃
- B. 饮食伤胃
- C. 脾胃阳虚
- D. 肝气犯胃
- E. 脾胃虚寒

答案:C

解析:饮食伤胃、七情内伤、寒邪客胃。

标签:

19. 下列关于消化性溃疡的叙述,正确的是

- A. 归属中医“胃瘕”
- B. 病位在胃,与肝胆关系密切
- C. 幽门螺杆菌感染和急性应激是最常见的病因
- D. 典型溃疡呈圆形或椭圆形,底部洁净,边缘不整齐。
- E. DU(十二指肠溃疡)多发于十二指肠球部,前壁常见;GU(胃溃疡)以胃角和

胃窦小弯常见

答案:E

解析:A 胃脘痛。B 与肝脾关系密切。C 幽门螺杆菌感染和服用非甾体抗炎药是最常见的病因。急性胃炎是急性应激,慢性胃炎是幽门螺旋菌感染。D 边缘光整。

标签:

20. 消化性溃疡肝胃郁热证中医治法是

- A. 养阴益胃, 和中止痛
- B. 疏肝理气, 和胃止痛
- C. 清热利湿, 醒脾化浊
- D. 健脾养阴, 益胃止痛
- E. 清胃泄热, 疏肝理气

答案:E

解析:治疗消化性溃疡肝胃郁热证, 治以清胃泄热, 疏肝理气, 化肝煎合左金丸。

标签:

21. 早期胃癌是指病变局限在

- A. 黏膜层
- B. 黏膜层和黏膜下层
- C. 黏膜层和肌层
- D. 肌层
- E. 胃全层, 未发生远处转移

答案:B

解析:早期胃癌是指病变局限在黏膜层和黏膜下层且未发生远处转移。故本题选B。注意胃癌的分型是病灶局限深度,而非有无转移。

标签:

22. 溃疡性结肠炎的腹痛特点是:

- A. 左下腹疼痛-便意-便后缓解
- B. 转移性右下腹痛
- C. 膈下钻顶样腹痛
- D. 夜间隐痛, 阵发性加剧
- E. 腹痛-餐后缓解

答案:A

解析:溃疡性结肠炎的腹痛特点:有“疼痛-便意-便后缓解”的规律,可伴腹胀、食欲不振、恶心及呕吐。若并发中毒性巨结肠或炎症波及腹膜,有持续性剧烈疼痛。

标签:

23. 下列药物对幽门螺杆菌无治疗作用的是

- A. 替硝唑
- B. 羟基苜青霉素
- C. 呋喃唑酮
- D. 多潘立酮
- E. 胶体次枸橼酸铋

答案:D

解析:多潘立酮即吗丁啉为促胃动力药,对幽门弯曲菌无治疗作用。其余药物皆为治疗幽门螺杆菌常用的三联药物。

标签:

精华

简单

记忆

24. 治疗消化性溃疡脾胃虚寒证,应首选

- A. 黄芪建中汤
- B. 一贯煎
- C. 化肝煎
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 柴胡疏肝散

答案:A

解析:脾胃虚寒治疗当温中散寒。一贯煎具有滋阴疏肝之功,用于治疗肝肾阴虚,血燥气郁证,不符合。化肝煎具有泻肝清胃之功,用于治疗肝胃积热证,不符合。失笑散合丹参饮具有活血化瘀定痛之功,适用于治疗瘀血内阻所致的腹痛,不符合。柴胡疏肝散具有疏肝解郁,健脾和营之功,用于治疗肝郁血虚证,不符合。健脾补气。理中丸温中散寒加黄芪建中汤健脾益气,温中补虚,和里缓急,用于治疗脾胃虚寒证。选A。

标签:

精华

简单

理解

25. 消化性溃疡上腹胀满,疼痛餐后加重,恶心呕吐后症状缓解。应首先考虑的是

- A. 胃神经官能症
- B. 穿孔
- C. 出血
- D. 幽门梗阻
- E. 癌变

答案:D

解析:A 胃神经官能症之腹痛无规律可循,可发生于餐前,亦可发生于餐后,

不支持。B 消化道穿孔常表一，为突然剧烈腹痛，持续性加重，板样腹，不支持。C 消化道出血临床表现是呕血、便血，不支持。E 癌变时腹痛呈持续性，且进行性加重，不支持。只有幽门梗阳时出现腹痛于餐后加重，呕吐后疼痛可暂时缓解。

标签：

精华

简单

记忆

26. 治疗尿路感染膀胱湿热证，应首选的方剂是

- A. 猪苓汤
- B. 程氏革藓分清饮
- C. 知柏地黄汤
- D. 八正散
- E. 真武汤

答案：D

解析：尿路感染膀胱湿热证首选八正散治疗。知柏地黄汤用于阴虚证，程氏革藓分清饮用于膏淋，猪苓汤用于水热互结证，八正散用于湿热淋证。

标签：

应用

精华

简单

27. 关于肾病综合征的中医证型，不包括的是

- A. 水湿浸渍
- B. 阳虚水泛
- C. 风水相搏
- D. 脾虚湿困
- E. 瘀血阻滞

答案：E

解析：肾病综合征的中医证型有风水相搏、水湿浸渍、疮毒浸淫、脾虚湿困、湿热内蕴、阳虚水泛。

标签：

精华

简单

记忆

28. 尿中常见大量红细胞管型的疾病是

- A. 肾结核
- B. 肾结石
- C. 急性肾盂肾炎

- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

答案:E

解析:血尿为急性肾炎所见,或肉眼血尿或镜下血尿,尿中红细胞多为严重变形红细胞,但应用袪利尿剂时可暂为非肾变形红细胞。此外还可见红细胞管型,提示肾小球有出血渗出性炎症,是急性肾炎的重要特点。

标签:

精华

简单

记忆

29. 慢性肾衰竭的中医根本病机是

- A. 饮食不当,痰湿内阻
- B. 肾元虚衰,湿浊内蕴
- C. 肾病日久,瘀血阻络
- D. 感受外邪,热毒侵袭
- E. 劳倦内伤,脾肾两虚

答案:B

解析:肾元虚衰,湿浊内蕴是其根本病机。

标签:

精华

简单

记忆

30. 关于慢性肾小球肾炎的叙述,正确的是

- A. 慢性肾炎可发于任何年龄,但以中青年为主,女性多见
- B. 慢性肾炎多数起病隐匿,进展迅速,病程较长
- C. 以蛋白尿、血尿、高血压、水肿为主要临床表现
- D. 晚期无明显的肾功能减退
- E. 大多由急性肾炎转变而来

答案:C

解析:A 慢性肾炎可发生于不同年龄、性别,但以青壮年男性居多。急性肾小球肾炎儿童多见。尿路感染以育龄期妇女最为常见。原发性高血压肾损害,多见于中老年患者。B 进展缓慢→病程较长。D 慢性肾小球肾炎,蛋白尿、血尿、水肿、高血压为基本临床表现,常伴有不同程度肾功能损害。病情时轻时重,迁延难愈,渐进性发展为慢性肾衰竭。E 急性链球菌感染后肾炎迁延不愈,病程超过1年以上者,可转为慢性肾炎,但仅占15%-20%。所以大部分慢性肾炎并非急性肾炎迁延所致。

标签:

31. 慢性肾衰竭脾肾阳虚型治宜

- A. 济生肾气丸
- B. 杞菊地黄丸
- C. 附子理中丸合五苓散
- D. 金匱肾气丸
- E. 无比山药丸

答案:A

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

32. 下列哪一项是诊断慢性肾盂肾炎的可靠依据

- A. 临床症状迁延不愈超过半年
- B. 反复发作超过半年
- C. 中段尿细菌培养多次阳性
- D. 静脉肾盂造影示肾盂、肾盏变形或双肾大小不一
- E. 尿常规中有蛋白及红、白细胞

答案:D

解析:诊断慢性肾盂肾炎的可靠依据: ①尿路感染病史在 1 年以上, 而且持续有细菌尿或频繁复发者; ②经治疗症状消失后, 仍有肾小管功能减退者(如肾浓缩功能差、尿比重低、酚红排泄率下降等); ③X 线造影证实有肾盂、肾盏变形, 肾影不规则甚至缩小。

标签:

精华

简单

记忆

33. 慢性肾炎发病的主要中医病机不包括

- A. 禀赋不足
- B. 劳倦太甚
- C. 饮食不节
- D. 情志不遂
- E. 饮水过多

答案:E

解析:饮水过多不会导致肾脏损伤。

标签:

精华

简单

记忆

34. 下列哪项不是再生障碍性贫血的中医证型

- A. 热毒壅盛
- B. 气血两虚
- C. 阳虚水停
- D. 肾阳亏虚
- E. 肾阴虚

答案:C

解析:再生障碍性贫血的中医证型主要包括:热毒壅盛、肾阴虚、肾阳亏虚、气血两虚、肾阴阳两虚、肾虚血瘀几个类型,没有阳虚水停证。故答案为 C。

标签:

精华

简单

记忆

35. 治疗缺铁性贫血脾肾阳虚证,应首选的方剂是

- A. 香砂六君子汤合当归补血汤
- B. 归脾汤合人参养荣汤
- C. 六味地黄丸合金匱肾气丸
- D. 八珍汤合无比山药丸
- E. 化虫丸合八珍汤

答案:D

解析:治疗缺铁性贫血脾肾阳虚证,治法为温补脾胃,养心安神,方选八珍汤合无比山药丸。A 香砂六君子汤合当归补血汤用于脾胃虚弱证,B 归脾汤合人参养荣汤用于心脾两虚证,E 化虫丸合八珍汤用于虫积证。

标签:

应用

精华

简单

36. 急性白血病发生的贫血的最主要原因

- A. 由于出血
- B. 由于化疗后胃肠功能紊乱
- C. 由于脾功能亢进
- D. 体内产生抗红细胞抗体
- E. 骨髓造血受白血病细胞干扰

答案:E

解析:急性白血病发生的贫血的最主要原因是骨髓造血功能受到白血病细胞干扰,导致正常红细胞生成减少。

标签:

精华

简单
记忆

37. 下列关于缺铁性贫血的叙述，错误的是

- A. 归属中医“血劳”“萎黄”“虚劳”
- B. 病位在脾胃，与肝肾相关
- C. 基本病机，脾虚
- D. 主要治法，健脾益气生血
- E. 面色萎黄，便溏，嗜食生米，是脾胃虚弱证的表现

答案:E

解析:嗜食异物，虫积证，化虫丸合八珍汤。

标签:

38. 下列各项，不属成人原发免疫性血小板减少症临床特点的是

- A. 全身皮肤出现瘀点
- B. 女性可表现为月经量过多
- C. 脾脏显著增大
- D. 牙龈出血
- E. 血小板功能正常

答案:C

解析:特发性血小板减少性紫癜诊断要点:①广泛出血累及皮肤、黏膜、内脏。②多次检查血小板计数减少。③脾不大。④骨髓巨核细胞增多或正常，有成熟障碍。⑤泼尼松或脾切除无效。⑥排除其他继发性血小板减少症。

标签:

39. 诊断甲状腺功能亢进最有意义的体征是

- A. 脉压增大
- B. 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音
- C. 浸润性突眼
- D. 心率增快，第一心音亢进
- E. 双手指细颤

答案:B

解析:诊断甲状腺功能亢进之病位在甲状腺，如发现弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音意义最大。而浸润性突眼、脉压增大、心率增快，第一心音亢进、双手指细颤均为甲亢的症状或体征。

标签:

精华
简单
记忆

40. 1型糖尿病最主要的原因是

- A. 食糖过多

- B. 长期大量用糖皮质激素
- C. 胰岛素分泌绝对或相对不足
- D. 过度肥胖
- E. 胰岛素分泌过多

答案:C

解析:1 型糖尿病最主要的原因是胰岛素分泌绝对或相对不足,为先天因素。食糖过多、长期大量用糖皮质激素、过度肥胖均为2型糖尿病的易感因素。

标签:

精华

超纲

简单

记忆

41. 金匱肾气丸适用于糖尿病的

- A. 气阴两虚证
- B. 阴阳两虚证
- C. 阴虚阳盛证
- D. 阴阳欲绝证
- E. 气滞血瘀证

答案:B

解析:方选七味白术散加减治疗气阴两虚型糖尿病;阴阳两虚型,方选金匱肾气丸加减,其余选项均为不典型证型。

标签:

应用

精华

简单

42. 放射性 ^{131}I 治疗甲亢的最主要并发症是

- A. 突眼恶化
- B. 甲状腺功能低下
- C. 粒细胞减少
- D. 甲亢危象
- E. 甲状腺癌变

答案:B

解析:因放射性 ^{131}I 治疗甲状腺功能亢进主要是使甲状腺腺泡上皮细胞萎缩,从而减少其分泌。因此,早期可使腺体破坏,后期则可使腺泡细胞分裂及分泌功能受抑制或自身免疫反应引起组织破坏而导致甲状腺功能降低。

标签:

精华

超纲

简单
记忆

43. 甲亢危象时使用碘剂的主要目的是

- A. 增强抗甲状腺药物的作用
- B. 抑制甲状腺素的合成
- C. 降低基础代谢率
- D. 阻抑甲状腺素的释放
- E. 阻断甲状腺素兴奋交感神经作用

答案:D

解析:甲亢危象时使用碘剂的主要目的是抑制已合成的甲状腺激素释放入血。

标签:

精华

简单

记忆

44. 中医学认为, 甲状腺功能亢进症的基本病理是

- A. 气滞、血瘀、火盛
- B. 痰凝、血瘀、正虚
- C. 痰凝、火盛、血瘀
- D. 气滞、痰凝、瘀阻
- E. 气滞、火盛、痰凝

答案:E

解析:基本病机为气滞痰凝, 气郁化火, 耗气伤阴。

标签:

45. 治疗糖尿病并发雀目, 首选的方剂是

- A. 玉女煎
- B. 麦味地黄汤
- C. 六味地黄丸
- D. 金匱肾气丸
- E. 杞菊地黄丸

答案:E

解析:糖尿病并发雀目、白内障、耳聋首选杞菊地黄丸、羊肝丸、磁朱丸加減。

标签:

46. 对诊断尪痹最有意义的实验室检查是

- A. 血沉
- B. 类风湿因子
- C. 补体 C3
- D. 抗核抗体

E. 肾功能

答案:B

解析:血沉无特异性。类风湿因子见于约 70% 尪痹患者血清中。抗核抗体及补体 C3 降低有助于系统性红斑狼疮的诊断。肾功能异常无特异性, 只能说明有肾脏损害。

标签:

精华

简单

记忆

47. 下列哪项不是类风湿关节炎的关节外表现

A. 心包炎

B. 类风湿结节

C. 类风血管炎

D. 小细胞低色素性贫血

E. 面部对称性水肿性红斑

答案:E

解析:类风湿关节炎的关节外表现有类风湿结节、类风湿血管炎、类风湿肺、心包炎、腕管综合征、干燥综合征、小细胞低色素性贫血以及脊髓受压的表现等。

标签:

精华

简单

记忆

48. 类风湿关节炎的诊断标准中有对称性关节肿和

A. 皮疹

B. 晨僵

C. 发热

D. 活动障碍

E. 肢体麻木

答案:B

解析:类风湿关节炎的诊断标准: ①晨僵至少 1 小时(每天), 病程至少 6 周; ②3 个或 3 个以上的关节肿胀, 持续至少 6 周; ③腕、掌指、近指关节肿胀至少 6 周; ④对称性关节肿至少 6 周; ⑤有皮下结节; ⑥手 X 线片改变(至少有骨质疏松和关节间隙的狭窄); ⑦类风湿因子阳性。有上述七项中四项者即可诊断为类风湿关节炎。

标签:

精华

简单

记忆

49. 在系统性红斑狼疮的下列临床表现中主要的是

- A. 育龄女性多发
- B. 皮肤黏膜与关节表现
- C. 肾炎
- D. 浆膜炎
- E. 贫血

答案:B

解析:SLE 中, 80%在病程中出现皮疹, 关节痛是常见症状。有临床表现的肾炎占 75%, 60%有贫血。半数以上急性发作期出现浆膜炎。

标签:

精华

简单

记忆

50. 下列在系统性红斑狼疮中最具有该病标记性意义的抗体是

- A. 抗 RNP
- B. 抗双链 DNA
- C. 抗 Scl-70
- D. 抗 Sm
- E. 抗 Jo-1

答案:D

解析:抗 Sm 抗体是 SLE 的标记性抗体, 30%(+), 特异性达 99%。

标签:

精华

简单

记忆

51. 癫痫发作期治疗方法为

- A. 健脾化痰、补益肝肾
- B. 育阴熄风、活血通络
- C. 豁痰息风、开窍定痫
- D. 健脾化痰、开窍定痫
- E. 补益肝肾、育阴熄风

答案:C

解析:癫痫发作期可表现为意识丧失, 肢体阵挛性抽搐, 喉中痰鸣等一系列风痰闭阻之象, 治疗则采用豁痰息风、开窍定痫之法。健脾化痰、补益肝肾, 育阴熄风、活血通络, 健脾化痰、开窍定痫, 补益肝肾、育阴熄风分别为癫痫不同证型的治法。

标签:

精华
简单
记忆

52. 急性脑血管病中，发病最快的是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

答案:B

解析:脑栓塞发病急骤，在数秒或数分钟内症状即达高峰。脑出血、脑血栓形成蛛网膜下腔出血、高血压脑病发病急剧程度都不及脑栓塞。

标签:

精华
简单
记忆

53. 治疗短暂性脑缺血发作痰瘀互结，阻滞脉络证，应首选的方剂是

- A. 镇肝熄风汤合四物汤
- B. 补阳还五汤合二陈汤
- C. 黄连温胆汤合桃红四物汤
- D. 羚角钩藤汤合平胃散
- E. 半夏白术天麻汤合桃红四物汤

答案:C

解析:治疗短暂性脑缺血发作痰瘀互阻、阻滞脉络证，方选黄连温胆汤合桃红四物汤。A 镇肝熄风汤合四物汤用于治疗阴虚风动证；B 补阳还五汤合二陈汤用于治疗气虚血瘀、脉络瘀阻证；D 羚角钩藤汤合平胃散用于治疗痰火瘀闭证；E 半夏白术天麻汤合桃红四物汤用于治疗风痰上扰证。

标签:

应用
精华
简单

54. 脑栓塞应用阿司匹林治疗的目的是

- A. 改善神经功能的缺失
- B. 保护脑细胞
- C. 增加再灌注
- D. 预防复发
- E. 扩张血管

答案:D

解析:防止栓塞复发可选用华法林或抗血小板聚集药物阿司匹林、力抗栓等。

标签:

精华

简单

记忆

55. 有关对阿尔茨海默病的描述, 不正确的是

- A. 有记忆障碍和全面的智能减退
- B. 是老年期痴呆中最主要疾病之一
- C. 早期可出现人格改变
- D. 早期可出现幻觉妄想
- E. HaChinski 缺血评分量表 <6 分

答案:E

解析:HaChinski 缺血评分量表:0~2分为 Alzheimer 病, 5~9分为多发性脑梗死性痴呆, 3~4分不定。

标签:

精华

简单

记忆

56. 中毒的治疗原则是

- A. 立即终止接触毒物
- B. 使用特效解毒药
- C. 清除进入体内的毒物
- D. 对症处理
- E. 以上均是

答案:E

解析:中毒的治疗原则包括:立即终止接触毒物、使用特效解毒药、清除进入体内的毒物、对症处理。故选 E。

标签:

精华

简单

记忆

57. 服毒后最好几小时内洗胃

- A. 3
- B. 6
- C. 1
- D. 12
- E. 24

答案:B

解析:一般在服毒后 6 小时内洗胃有效,因服毒物在 6 小时内胃中尚有残留,洗胃可以清除未被吸收的毒物。

标签:

精华

简单

记忆

58. 诊断有机磷中毒的最重要指标为

- A. 呕吐物有大蒜味
- B. 毒蕈碱样和烟碱样症状
- C. 确切的毒物接触史
- D. 血胆碱酯酶活性降低
- E. 阿托品试验阳性

答案:D

解析:诊断有机磷中毒的最重要指标为血胆碱酯酶活性降低。而确切的毒物接触史、呕吐物有大蒜味、毒蕈碱样和烟碱样症状、阿托品试验阳性只可作为辅助诊断的依据。

标签:

精华

简单

记忆

59. 治疗急性一氧化碳中毒首选的治疗措施是

- A. 静脉滴注 ATP
- B. 冬眠疗法
- C. 血液透析
- D. 氧气疗法
- E. 快速静脉滴注甘露醇

答案:D

解析:迅速纠正缺氧状态。吸入含 5%CO₂ 的氧气可加速 COHb 解离,增加 CO 的排出。吸入新鲜空气时,CO 由释放出半量约需 4 小时;吸入纯氧时可缩短至 30~40 分钟,吸入个大气压的纯氧可缩短至 20 分钟。

标签:

应用

精华

简单

60. 休克的病理特点是()

- A. 组织器官有效灌流量锐减与有效循环血量不足
- B. 有效循环血量不足
- C. 有效循环血量代偿性增加

- D. 组织器官灌流量减少
- E. 组织器官有效灌流量增加

答案:A

解析:

标签:

精华

简单

记忆

61. 心源性休克首选的血管活性药物是()

- A. 多巴胺
- B. 心得安
- C. 肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 地塞米松

答案:A

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

62. 中暑时发生肌肉痛性痉挛最常见的部位是下列哪一项

- A. 腹直肌
- B. 腓肠肌
- C. 胸大肌
- D. 肠平滑肌
- E. 肛门括约肌

答案:B

解析:中暑痉挛时最常见的发生肌肉痉挛部位为腓肠肌。

标签:

精华

简单

记忆

63. 实喘的基本病机是

- A. 外邪袭肺, 肺气上逆
- B. 肺气胀满, 不能敛降
- C. 卫表不和, 肺失宣肃
- D. 邪壅肺气, 宣降不利
- E. 气无所主, 肺气上逆

答案:D

解析:实喘在肺,为肝郁气逆,邪壅肺气,宣降不利所致;虚喘责之肺、肾两脏,因阳气不足,阴精亏耗,而致肺肾出纳失常,且尤以气虚为主。

标签:

64. 不寐肝火扰心的治法是

- A. 疏肝解郁, 清心安神
- B. 清热化痰, 和中安神
- C. 补益心脾, 养血安神
- D. 益气镇惊, 安神定志
- E. 疏肝泻火, 镇心安神

答案:E

解析:不寐肝火扰心证,宜疏肝泻火,镇心安神,方用龙胆泻肝汤加减。

标签:

65. 胁痛的中医基本病机

- A. 肝胆郁滞, 疏泄失调, 脉络瘀阻
- B. 肝气郁结
- C. 瘀血阻络
- D. 肝经湿热
- E. 肝阴不足

答案:A

解析:BCDE,不通则痛、不荣则痛。胁痛病位在肝胆,肝胆郁滞,疏泄失调,枢机不利,脉络痹阻或失养是胁痛病机关键。

标签:

66. 积证瘀血内结证, 首选方剂

- A. 血府逐瘀汤
- B. 通窍活血汤
- C. 身痛逐瘀汤
- D. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- E. 补阳还五汤

答案:D

解析:积证瘀血内结证治法为祛瘀软坚,佐以扶正健脾。所以重点在合用六君子。健脾,联想记忆,膈下。

标签:

67. 便血脾胃虚寒证, 选方

- A. 小建中汤
- B. 黄土汤
- C. 黄龙汤
- D. 归脾汤

E. 桑杏汤

答案:B

解析:常考方,记住。

标签:

68. 关于内伤发热的辨证论治, 错误的是

A. 阴虚发热证, 知柏地黄丸

B. 血虚发热证, 归脾汤

C. 气虚发热证, 补中益气汤

D. 气郁发热证, 丹栀逍遥散

E. 痰湿郁热证, 黄连温胆汤

答案:A

解析:清骨散。

标签:

69. 治疗慢性支气管炎痰湿蕴肺证, 宜选用()

A. 五苓散

B. 二陈汤

C. 三拗汤

D. 真武汤

E. 香砂六君子汤

答案:B

解析:五苓散具有利水渗湿, 温阳化气功效, 主治外有表证, 内停水湿。二陈汤具有燥湿化痰, 理气和中功效, 主治湿痰咳嗽。三拗汤具有宣肺解表功效, 主治感冒风邪。真武汤具有温阳利水功效, 主治脾肾阳虚, 水气内停。香砂六君子汤具有健脾和胃, 理气止痛功效, 主治脾胃气虚, 寒湿滞于中焦。

标签:

精华

简单

记忆

70. 治疗便秘气秘证, 应首选()

A. 大黄附子汤

B. 麻子仁丸

C. 大承气汤

D. 润肠丸

E. 六磨汤

答案:E

解析:便秘不外冷热虚实。气秘实证用六磨汤顺气导滞、降逆通便。热秘实证用大承气汤峻下热结, 或麻子仁丸泻热导滞, 润肠通便。气虚便秘用黄芪汤补气健脾、润肠通便。血虚便秘用润肠丸养血润燥、滋阴通便。阳虚冷秘

用大黄附子汤温阳通便。故选 E。

标签:

应用

精华

简单

71. 与水肿关系最为密切的脏腑是()

- A. 肺、脾、肾
- B. 肺、胃、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肝、肾

答案:A

解析:水肿是由于肺失通调,脾失转输,肾失开合,膀胱气化不利,导致体内水液潴留,泛滥肌肤的一类病证。水肿与肺脾肾三脏关系最为密切,故选 A。肺主通调水道,脾主运化水液,肾主气化,故水肿之病,以背为本,以肺为标,以脾为制水之脏,故选 A。心、肝、胃与水没有直接关系,故排除 B、C、D、E。

标签:

精华

简单

记忆

72. 萎缩性胃炎,胃黏膜的病理改变是()

- A. 充血,水肿
- B. 糜烂,出血
- C. 肥厚,粗糙
- D. 灰暗,变薄
- E. 渗出

答案:D

解析:萎缩性胃炎的胃黏膜表面反复受到损害后导致黏膜固有腺体萎缩,甚至消失。因此,胃黏膜有不同程度的变薄,颜色灰暗,并常伴有肠上皮化生,炎性反应及不典型增生。其余选项均不是萎缩性胃炎的表现。故本题选 D。

标签:

精华

简单

记忆

73. 血虚便秘证,阴血已复,便仍干燥,治疗应首选()

- A. 黄芪汤
- B. 增液汤

- C. 润肠丸
- D. 五仁丸
- E. 青麟丸

答案:D

解析:血虚便秘宜养血润燥,滋阴通便,用润肠丸。但是阴血已复,不需再滋阴养血,用五仁丸润肠即可。选D。

标签:

应用

精华

简单

74. 下列哪一项对积与聚无鉴别意义

- A. 积的病位在大腹,聚的病位在小腹
- B. 积属血,聚属气
- C. 积属脏病,聚属腑病
- D. 积的病程长,聚的病程短
- E. 积为固定不移,聚为聚散无常

答案:A

解析:聚病在气分,多属于腑病,病机以气机逆乱为主,可望之有形,但按之无块,聚散无常,痛无定处,病程较短。积病在血分,多属于脏病,病机以痰凝血结为主,望之可无形,但触之必见结块。且固定不移,痛有定处。

标签:

精华

简单

记忆

75. 关于糖尿病的胰岛素治疗,正确的是

- A. 肥胖的糖尿病人较适宜于胰岛素治疗
- B. I型糖尿病人可不用胰岛素治疗
- C. 清晨高血糖而半夜有饥饿感、出冷汗的糖尿病人应增加胰岛素剂量
- D. 因感染发热而厌食的糖尿病人应将胰岛素剂量加倍
- E. 经一段时间的胰岛素治疗后,可产生胰岛素抗体

答案:E

解析:【考点】糖尿病的胰岛素治疗。(肥胖的糖尿病人为2型糖尿病,常常不是胰岛素缺乏而是对胰岛素不敏感、有抵抗,胰岛素治疗往往使病人发胖、体重增加,所以肥胖的糖尿病人没有急、慢性并发症时一般不采用胰岛素治疗;1型糖尿病人体内缺乏胰岛素,必须用胰岛素治疗;而半夜有饥饿感、出冷汗是低血糖反应表现,清晨高血糖是低血糖后继发的反应性高血糖,称为Somogyi反应,增加胰岛素剂量会加重夜间低血糖而无助于改善清晨高血糖;当糖尿病人感染、发热而出现厌食等情况时胰岛素剂量需调整,此时

更应注意是否发生了酮症，因不能正常进食而输液，依据血糖水平随时调整胰岛素剂量，不能简单地加倍；胰岛素是蛋白质类多肽激素，不论是动物源的还是纯度较高的基因工程制造的人胰岛素使用一段时间后皆可能产生一些胰岛素抗体。因此正确答案是 E。

标签：

精华

简单

记忆

76. 患者，女，58 岁。咳声重浊，反复发作，咳痰黏稠，色白量多，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉濡滑。其证型是

- A. 痰湿蕴肺
- B. 寒痰阻肺
- C. 燥痰伤肺
- D. 痰热郁肺
- E. 肝火犯肺

答案：A

解析：患者咳痰黏稠，量多，说明有痰邪，且不夹燥邪；咳痰色白表明不伴热邪，可排除 C、D、E。标题中未提示怕冷、恶寒等寒邪症状，不支持 B，故选 A。

标签：

应用

精华

简单

77. 患者，男，51 岁。有大量吸烟史 23 年，咳嗽痰中带血 2 月。近 1 月四肢关节疼痛及杵状指。X 线显示右肺上叶肺不张。应首先考虑的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 肺结核
- C. 肺癌
- D. 甲状腺功能亢进症
- E. 慢性支气管炎阻塞性肺气肿

答案：C

解析：根据患者 51 岁男性既往有大量吸烟史 23 年，此次症状为咳嗽痰中带血 2 月，伴有四肢关节疼痛及杵状指，X 线显示右肺上叶肺不张，首先考虑的诊断是肺癌。故选 C。

标签：

应用

精华

简单

78. 患者，男，62 岁，有吸烟史 30 余年，近十余年晨间咳嗽明显，伴有白色浆液性泡沫样痰，夜间有阵咳，常感到气短，喘息、胸闷等，食欲减退，该患者初步考虑为

- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 原发性支气管肺癌

答案:D

解析:结合患者的病史“吸烟史 30 余年”以及症状“咳嗽、咯痰、气短、喘息、胸闷以及食欲减退”可初步诊断该患者为慢性阻塞性肺疾病。

标签:

79. 患者，女，70 岁。间断咳嗽，咯痰，胸闷 10 余年。查体:桶状胸，双侧语颤减弱，叩诊呈过清音，心浊音界变小。呼吸音减弱，呼气性呼吸困难。胸部 X 线提示肺纹理增多紊乱，血气分析提示低氧血症。肺功能检测提示 $FEV_1/FVC < 70\%$ ， $30\% \leq FEV_1 < 50\%$ 预计值。该患者的诊断是

- A. 慢阻肺 IV 级，极重度
- B. 慢阻肺 0 级，高度
- C. 慢阻肺 I 级，轻度
- D. 慢阻肺 II 级，中度
- E. 慢阻肺 III 级，重度

答案:E

解析:桶状胸、过清音、慢性呼吸系统病史 10 余年，考虑慢阻肺。分 5 级 (0-高危、I-轻度、II-中度、III-重度、IV-极重度)， FEV_1/FVC 均 $< 70\%$ ，以 $FEV_1\%$ 预计值区分，I 至 IV 级以 80%、50%、30% 为临界值。即 I 级 $\geq 80\%$ 、 $50\% \leq II$ 级 $< 80\%$ 、 $30\% \leq III$ 级 $< 50\%$ 、IV 级 $< 30\%$ 。

标签:

80. 患者，男，32 岁，患肺炎，现突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数。其治法宜选

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 清热化痰，宽胸止咳
- C. 清热解毒，化痰开窍
- D. 益气养阴，润肺化痰
- E. 解表散寒，清泄里热

答案:B

解析:肺炎痰热壅肺证 证候:咳嗽，咳痰黄稠或咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，

脉洪数或滑数。治法:清热化痰,宽胸止咳。方药:麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减。

标签:

81. 患者有肺心病病史 8 年,前日酒后受凉。发热,喘息气粗,胸闷,咯吐黄痰,口渴,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 五苓散
- B. 涤痰汤
- C. 真武汤
- D. 苏子降气汤
- E. 越婢加半夏汤

答案:E

解析:痰热壅肺证。

标签:

82. 患者,女,70 岁。胸闷胸痛反复发作半年余,多与劳累有关。现胸闷气短,自汗,神倦畏寒,面色晄白,四肢不温,舌质淡胖,苔白,脉沉细。心电图 V3、V4、V5、V6 导联 ST 段下移,T 波倒置。治疗应首选

- A. 知柏地黄丸
- B. 柴胡疏肝散
- C. 参附汤合桂枝甘草汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤

答案:C

解析:从自汗,神倦畏寒,面色晄白,四肢不温,舌质淡胖,苔白,脉沉细可判断为阳气虚弱,治疗当温阳益气。知柏地黄丸为滋阴降火方剂。柴胡疏肝散为疏肝理气方剂。血府逐瘀汤为活血祛瘀方剂。瓜蒌薤白半夏汤为通阳散结,祛痰宽胸方剂。以上均不符合参附汤合桂枝甘草汤既能益气又能温心阳,可选用。

标签:

应用
精华
简单

83. 患者,女,61 岁。由于急性广泛前壁心肌梗死发病 12 小时合并心力衰竭收入院进一步治疗,首选治疗心力衰竭的药物是

- A. 血管扩张剂
- B. 利尿剂
- C. 洋地黄
- D. β 受体阻滞剂
- E. 钙拮抗剂

答案:B

解析:心肌梗死合并心力衰竭, 主要治疗左心衰, 以应用吗啡(或哌替啶)和利尿剂为主。

标签:

应用

精华

简单

84. 某高中女生, 感冒后发热 2 天, 热退后感心悸、胸闷、乏力, 脉率 45 次/分, 律不齐, 临床诊断为病毒性心肌炎。住院第五天, 该同学在病床上突然发生晕厥、四肢抽搐、心音消失, 数秒后心音恢复, 抽搐停止, 逐渐转醒, 应首先考虑

- A. 阿-斯综合征
- B. 癫痫小发作
- C. 低血糖
- D. 直立性低血压
- E. 癫痫性晕厥

答案:A

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

85. 患者, 男, 50 岁。冠心病病史 30 年, 因受凉后出现严重呼吸困难, 呼吸频率 30 次/分, 强迫端坐位, 面色灰白, 紫绀, 大汗, 烦躁, 频繁咳嗽, 咳粉红色泡沫样痰, 甚至模糊, 应首先考虑的诊断是

- A. 过敏性哮喘
- B. 慢性支气管炎急性发作
- C. 急性肺水肿
- D. 右心衰竭
- E. 肺部感染

答案:C

解析:急性肺水肿:起病急骤, 突发的岩肿的呼吸困难、端坐呼吸、烦躁不安并有恐惧感, 呼吸频率可达 30~50 次/分; 咳嗽频繁并咳出大量粉红色泡沫样血痰; 极重者可因脑缺氧而神志模糊。

标签:

86. 患者, 女, 62 岁, 高血压病史 15 年。2 年来登二楼时经常喘息。近日反复熟睡中阵发性呼吸困难, 坐起后缓解, 伴尿少肢肿, 下肢尤甚。现症:心悸, 喘息不能平卧, 形寒肢冷, 舌淡苔白, 脉沉迟弱。查体:心界向两侧扩

大，心率 100 次/分，两下肺闻及细湿罗音，肝-颈静脉反流征(+)，踝部凹陷性水肿。其病症结合诊断是：

- A. 急性左心衰，饮凌心肺证
- B. 急性左心衰，心肺气虚证
- C. 慢性心力衰竭，阳虚水泛证
- D. 慢性心力衰竭，脾肾阳虚证
- E. 慢性支气管炎，心肾阳虚证

答案:C

解析:心源性哮喘需与支气管哮喘鉴别，看病史，本题高血压病史 20 年，排除支气管哮喘。患者活动气急、尿少肢肿、夜间阵发性呼吸困难考虑慢性心力衰竭。沉主里、迟主寒、弱为不足之脉，舌淡、形寒肢冷为阳虚，尿少肢肿、下肢尤甚为肾阳虚，故为(肾)阳虚水泛。

标签:

87. 女，48 岁，心率 38 次/分，乏力、活动时头晕。心电图 P 波与 QRS 波群无固定关系、心房率快于心室率，现症:心悸气短，乏力，失眠多梦，自汗盗汗，五心烦热，舌质淡红少津，脉虚弱或结代。中西医治疗

- A. 无需接受治疗，生脉饮
- B. 阿托品，炙甘草汤
- C. 异丙肾上腺素，生脉散
- D. 麻黄素，炙甘草汤
- E. 永久起搏器、炙甘草汤

答案:E

解析:III度房室传导阻滞，气阴两虚证。窦缓，有症状者可用阿托品。I 度和 II 度 I 型，心室率不太慢者，无需治疗。II 度 II 型和 III 度，症状明显、心室率显著缓慢，及早给予临时性或永久性心脏起搏治疗。另外，人工心脏起搏适应证中明确描述:伴有临床症状的任何水平的完全或高度房室传导在，间歇心室率 < 40 次/分。中医辨证论治，缓慢型气阴两虚用炙甘草汤，快速型气阴两虚用生脉饮。本章选方规律。

标签:

88. 患者，男，74 岁。胸痛持续剧烈，甚则心痛彻背，背痛彻心，形寒肢冷，神疲气怯，伴心悸气促，手足青紫厥冷，舌紫暗苔滑润，脉沉细。诊断为急性前壁心肌梗死，其证型是

- A. 气滞血瘀
- B. 心阳欲脱
- C. 阳虚水泛
- D. 寒凝心脉
- E. 痰瘀互结

答案:D

解析:素体阳虚,阴寒凝滞,气血痹阻,心阳痹阻,其证型属寒凝心脉。

标签:

89. 患者,男,40岁,近一年来上腹部不适,消化不良,偶有上腹部轻度压痛,胃镜检查:镜下胃黏膜充血,色泽较红,边缘模糊。现症见:胃脘隐隐作痛,嘈杂,口干咽燥,五心烦热,大便干结,舌红少津,脉细,治疗首选

- A. 益胃汤
- B. 一贯煎
- C. 芍药甘草汤
- D. 三仁汤
- E. 左金丸

答案:A

解析:胃阴不足证。急性胃炎胃阴不足为BC。

标签:

90. 患者男性,28岁。经常出现规律性上腹痛3年,空腹发作,夜间更重,进食可缓解,服抗酸药可止痛。最可能的诊断为

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 复合性溃疡
- D. 十二指肠壅积症
- E. 胃黏膜脱垂症

答案:B

解析:DU 空腹痛和/或午夜痛,腹痛多于进食或服用抗酸药后缓解,DU 多发生于十二指肠球部。

标签:

91. 男性患者,42岁。不规则低热3个月,厌食,体重下降5kg,右季肋下胀痛,巩膜轻度黄染,面部有3个蜘蛛痣,肝肋下3.5cm,质硬表面不平,脾肋下1cm,肝区可闻及血管杂音,血白细胞 $5.8 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.64,谷丙转氨酶130U/L,碱性磷酸酶30U/L。经中西医治疗无效。应首先考虑的诊断是

- A. 慢性活动性肝炎
- B. 原发性肝癌
- C. 门脉性肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝血管瘤

答案:B

解析:肝硬化与肝癌鉴别。原发性肝癌多发生在肝硬化的基础上,两者鉴别常有困难。若肝硬化有明显的肝大、质硬的大结节或肝萎缩变形而影像学又发现占位性病变,肝癌可能性大。肝硬化时肝脏大小、硬度与平滑程度不一,

早期肝脏肿大，表面光滑，质地中等；晚期缩小、坚硬、表面不平呈结节状，无压痛。本题患者肝脏表面不平且质硬，伴有肝大、消瘦，且治疗无效，考虑肝癌，需影像学及活检进一步明确。

标签：

92. 患者，男，76 岁。晚期胃癌 5 个月。症见：胃脘隐痛，喜温喜按，泛吐清水，形寒肢冷，便溏，舌淡胖苔薄白，脉沉缓。其证型是

- A. 气血亏虚
- B. 脾胃虚寒
- C. 肝胃不和
- D. 痰瘀内结
- E. 痰食交阻

答案：B

解析：喜温主寒，喜按主虚，结合舌质舌苔脉象，结合患者 76 岁男性，晚期胃癌 5 个月。可判断为脾胃虚寒。

标签：

精华

简单

理解

93. 患者，男，50 岁。反复右胁肋疼痛 10 年。现症见肋下积块坚实，痛定不移，脘腹胀满，甚则腹大如鼓，面目发黄晦暗，肌肤甲错，高热烦渴，小便黄赤，大便于黑。舌红有瘀斑，苔黄腻，脉弦数。实验室检查：血清 AFP 阳性，定量检查 $>900\text{ng/ml}$ 。经诊断为“原发性肝细胞肝癌”。其治法是

- A. 清热利湿，解毒破结
- B. 疏肝理气，活血化瘀
- C. 运脾利湿，化气行水
- D. 理气活血，解毒排脓
- E. 养阴清热，解毒祛瘀

答案：A

解析：从高热烦渴，小便黄赤，苔黄腻，脉弦数可判断内有湿热邪毒；肋下积块坚实，痛定不移为瘀血内结。故采用清热利湿，解毒破结之法。

标签：

精华

中等

理解

94. 患者，男，52 岁。肝炎肝硬化病史 5 年，出现腹水 1 年，1 周来低热伴轻度腹痛，腹水明显增多。腹水检查：淡黄色，比重 1.017，蛋白 26g/L，白细胞数 $500 \times 10^6/\text{L}$ ，中性粒细胞 0.80。最可能的诊断是肝硬化合并

- A. 结核性腹膜炎

- B. 自发性腹膜炎
- C. 原发性肝癌
- D. 门静脉血栓形成
- E. 肝肾综合征

答案:B

解析:肝硬化并发自发性腹膜炎时,腹水表现为比重介于漏出液于渗出液之间,白细胞数增多,常在 $500 \times 10^6/L$ 以上,中性粒细胞比值增高。

标签:

应用

精华

中等

95. 患者,男,40岁。反复上腹部节律性疼痛4年,加重半月。现症见上腹隐隐作痛,常感寒而发,喜温喜按,空腹疼痛加重,得食可缓,泛吐清水,神疲乏力,甚则手足不温,大便溏薄,舌淡,苔白,脉细弱。查体:上腹部压痛,无反跳痛及肌紧张。检查:胃镜示十二指肠溃疡,胃液分析示胃酸分泌增高。治疗应首选

- A. 失笑散合丹参饮
- B. 化肝煎合左金丸
- C. 柴胡疏肝散合金铃子散
- D. 八珍汤合左归饮
- E. 理中汤和黄芪建中汤

答案:E

解析:从上腹隐痛,喜温喜按,手足不温,大便溏薄,舌淡,苔白,脉细弱可以判断为脾胃虚寒。A为活血化瘀方剂,B为清泻肝胃实热方剂,C为疏肝理气方剂,D为补肾益气养血方剂,E为健脾益气,温胃止痛方剂。故选E。

标签:

应用

精华

中等

96. 患者,女,30岁。平素有上腹部规律性疼痛,因工作熬夜,晨呕血400ml,排柏油便4次,自觉头昏、心悸。血压13/8kPa,心率108次/分,肝脾未触及,可能的诊断是

- A. 肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- B. 消化性溃疡出血
- C. 急性胃黏膜损伤
- D. 食管贲门黏膜撕裂征
- E. 胃癌出血

答案:B

解析:根据题干考虑为消化性溃疡出血。

标签:

应用

精华

简单

97. 患者, 男, 50 岁。现症见肢体浮肿, 小便短少, 极度乏力, 畏寒肢冷, 但手足心热, 口中尿臭, 口干欲饮, 饮水不多, 腰膝酸软, 大便偏溏。舌质淡胖有齿痕, 脉沉细。实验室检查: 尿素氮 20mmol/L。血肌酐 400 μ mol/L。诊断为“慢性肾功能不全(尿毒症期)”。其治法是

- A. 益气养阴
- B. 滋阴清热
- C. 益气养血
- D. 阴阳双补
- E. 温阳散寒

答案:D

解析:畏寒肢冷, 腰膝酸软, 大便偏溏, 舌质淡胖有齿痕, 脉沉为脾肾阳虚之象; 手足心热, 口干欲饮, 饮水不多为阴虚内热之象。综合判断阴阳两虚, 故治疗时阴阳双补。

标签:

应用

精华

中等

98. 患者, 男, 8 岁。2 周前有咽痛, 现出现下肢及眼睑浮肿, 晨起时明显, 小便色如洗肉水, 血压 140/95mmHg。临床上最可能诊断为

- A. 扁桃体炎
- B. 肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 感冒
- E. 高血压

答案:C

解析:根据题干, 考虑为急性肾小球肾炎

标签:

精华

简单

理解

99. 患者, 女, 48 岁。小便淋漓不已, 时作时止, 每于劳累后发作或加重, 小便有灼热感, 时有尿痛, 面色苍白, 神疲倦怠, 少气懒言, 腰膝酸软, 食

欲不振，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗宜选用

- A. 八正散加减
- B. 丹栀逍遥散加减
- C. 无比山药丸加减
- D. 知柏地黄丸加减
- E. 补中益气汤加减

答案:C

解析:尿路感染脾肾亏虚，湿热屡犯证。①证候:小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作或加重，尿热，或有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细；②治法:健脾补肾；③方药:无比山药丸加减。

标签:

精华

简单

理解

100. 慢性肾功能不全患者表现为面肢浮肿或全身浮肿，甚则有胸水、腹水，应选用

- A. 黄连温胆汤加减
- B. 五皮饮或五苓散加减
- C. 六君子汤加减
- D. 济生肾气丸加减
- E. 二妙丸加减

答案:B

解析:慢性肾功能不全水气证。①证候:面肢浮肿或全身浮肿，甚则有胸水、腹水；②治法:利水消肿；③方药:五皮饮或五苓散加减。

标签:

精华

简单

理解

101. 肾病综合征患者表现为起始眼睑浮肿，继则四肢、全身亦肿，皮肤光泽，按之凹陷易恢复，伴发热，咽痛，咳嗽，小便不利等症，舌苔薄白，脉浮。

应属于以下哪型

- A. 风水相搏证
- B. 湿毒浸淫证
- C. 水湿浸渍证
- D. 脾虚湿困证
- E. 肾阳衰微证

答案:A

解析:肾病综合征之风水相搏证。①证候:起始眼睑浮肿,继则四肢、全身亦肿,皮肤光泽,按之凹陷易恢复,伴发热,咽痛,咳嗽,小便不利等症,舌苔薄白,脉浮;②治法:疏风解表,宣肺利水;③方药:越婢加术汤加减。

标签:

精华

简单

记忆

102. 患者,男,55岁。少尿,浮肿,视物模糊2年,伴有全身乏力,皮肤干燥,腰膝酸软,口中有尿臭味,舌红淡少津,脉弦细。血压180/105mmHg,血钾6.9mmol/L,血肌酐640 μ mol/L,其中西医治疗是

- A. 降压药加羚角钩藤汤
- B. 降压药加镇肝熄风汤
- C. 血液透析加杞菊地黄汤
- D. 血液透析加天麻钩藤饮
- E. 降压药加知柏地黄丸

答案:C

解析:肾衰竭期,肝肾阴虚证。

标签:

103. 患者,男,40岁。脸色苍白、乏力3个月,体检:皮肤黏膜苍白,无黄染,肝脾不大,手指甲扁平。既往身体健康。血常规:血红蛋白60g/L,红细胞大小不均,中央苍白区扩大。白细胞及血小板正常。网织红细胞0.025,可能性最大的是

- A. 缺叶酸性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 缺维生素B₁₂性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 溶血性贫血

答案:B

解析:该患者“皮肤黏膜苍白、无黄染、肝脾不大、手指甲扁平”,考虑为贫血。血常规见,其血红蛋白60g/L,红细胞大小不均,中央苍白区扩大,白细胞及血小板正常,网织红细胞0.025,初步诊断为缺铁性贫血。

标签:

精华

中等

记忆

104. 患者,女,26岁。在服用氯霉素后出现发热,头晕,乏力,心悸,气短,食欲减退,骨髓象示增生减低,巨核细胞明显减少。最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 肾性贫血

答案:B

解析:根据题意,结合患者病史、症状和骨髓象检查,考虑为服用氯霉素后引起的再生障碍性贫血。

标签:

精华

简单

记忆

105. 患者,女,62岁。既往有糖尿病和冠心病。平时劳累后有胸痛发作,近日安静时亦有胸痛发作,胸痛较剧,痛有定处,入夜加重,舌质紫暗,有瘀斑,脉涩。心电图II、III、aVF导联T波倒置,心肌酶谱正常。应首先考虑的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 瓜蒌薤白桂枝汤合涤痰汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 参附汤合右归丸

答案:D

解析:患者胸痛较剧,痛有定处,入夜加重,舌质紫暗,有瘀斑,脉涩,属于胸阳痹阻血行瘀滞,应首先考虑血府逐瘀汤进行治疗。A 主治中风之气虚血虚证;B 可涤痰开窍,温阳通脉;C 主治胸阳不振痰气互结之胸痹;E 主治阳气暴脱,脉微欲绝证。故本题选D。

标签:

106. 患者,男,56岁,有高血压、冠心病、糖尿病病史,今日心前区压榨性疼痛三小时,舌下含服硝酸甘油不缓解,下列应做的检查首选

- A. 冠状动脉造影
- B. CT 造影
- C. 心脏瓣膜检查
- D. 血肌钙蛋白 I
- E. 超声心动图

答案:D

解析:冠心病病史、心前区疼痛、三小时不缓解、含服硝甘不缓解。怀疑心梗。血清标志物不仅早期,而且特异、敏感,故血清心肌坏死标志物更佳。

标签:

107. 患者，女，46岁。间歇性上腹隐痛3年。饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃镜下可见黏膜充血、水肿，呈红白相间，粗糙不平，有出血点。应首先考虑的是

- A. 慢性浅表性胃炎
- B. 胃窦部溃疡
- C. 胃小弯溃疡
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 胃癌

答案:A

解析:患者以上腹部隐痛为主要表现,且胃镜未提示有溃疡、不规则隆起等表现,可初步推断为慢性浅表性胃炎。D项胃镜应示血管显露,胃黏膜失去正常颜色(呈淡红、灰黄,重者呈灰白或灰蓝色),黏膜皱襞变细平坦,有上皮细胞增生或明显的肠化生。故本题选A。

标签:

108. 患者，女，45岁。患糖尿病8年，面色晦暗，消瘦乏力，胸中闷痛，肢体麻木、刺痛，夜间加重，唇紫，舌暗有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选

- A. 消渴方
- B. 桃核承气汤
- C. 玉泉丸
- D. 黄连温胆汤
- E. 桃红四物汤

答案:E

解析:从肢体麻木、刺痛,夜间加重,唇紫,舌暗有瘀斑,脉弦涩可判断为血脉瘀阻证,治疗当活血祛瘀止痛。玉泉丸具有补气养阴生津功效,用于气阴两虚,津液不足证。消渴方具有清热生津止渴功效,用于热伤阴津证。桃核承气汤具有破血下瘀功效,用于下焦蓄血证。黄连温胆汤具有清胆和胃,理气化痰功效,用于胆胃不和,痰热内扰证。桃红四物汤具有养血活血祛瘀功效,用于瘀血内阻证。故选桃红四物汤为宜。

标签:

应用
精华
中等

109. 患者男性，50岁。肝硬化腹水明显，1周前呕血，黑便。近日烦躁不安，经常用很多火柴点不着烟。轻度黄疸，两手举起时腕部阵发颤抖。应首先考虑的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 震颤性麻痹

- C. 氮质血症
- D. 安眠药过量
- E. 肝性脑病

答案:E

解析:腹水为肝硬化失代偿门脉高压表现;呕血、黑便为并发上消化道出血;经常用很多火柴点不着烟,两手举起时腕部阵发颤抖,为扑翼样震颤;结合烦躁不安的轻度性格改变和行为失常,考虑肝硬化-肝性脑病-前驱期。

标签:

110. 患者,女,22岁。多汗,怕热,多食,消瘦,急躁易怒,两手颤抖。舌质红,苔黄腻,脉弦滑数。查体:颈前可触及肿块,可随吞咽上下活动,眼突,心率110次/分,律齐。治疗应首选

- A. 丙硫氧嘧啶加丹栀逍遥散
- B. 丙硫氧嘧啶加一贯煎
- C. 丙硫氧嘧啶加知柏地黄丸
- D. 甲基硫氧嘧啶加天王补心丹
- E. 甲基硫氧嘧啶加黄连阿胶汤

答案:A

解析:从多汗,怕热,多食,消瘦,两手颤抖,颈前可触及肿块,可随吞咽上下活动,眼突,心率快可判断为甲状腺功能亢进症,治疗选用丙硫氧嘧啶。从急躁易怒,颈前可触及肿块,舌质红,苔黄腻,脉弦滑数可判断为肝火痰瘀型,治疗当清热疏肝活血祛瘀。一贯煎具有滋阴疏肝功效,用于肝肾阴虚证,不符合。知柏地黄丸具有滋阴降火退虚热功效,用于阴虚内热证,不符合。丹栀逍遥散具有清热疏肝活血祛瘀功效,故选A。

标签:

应用
精华
中等

111. 患者,男,46岁。2型糖尿病多年,口服多种降糖药,血糖控制差。现症尿频量多,浊如脂膏,腰膝酸软,口干乏力,头晕耳鸣,皮肤干燥,舌红少苔,脉细数。实验室检查:空腹血糖10.9mmol/L,糖化血红蛋白9.1%。应选用的中西医治疗方案是:

- A. 胰岛素,玉女煎
- B. 胰岛素,六味地黄丸
- C. α -糖苷酶抑制剂,消渴方
- D. 磺脲类,知柏地黄丸
- E. 双胍类,石斛明目丸

答案:B

解析:胰岛素治疗适应证:①1型糖尿病替代治疗;②糖尿病酮症酸中毒、

高渗性非酮症糖尿病昏迷和乳酸性酸中毒伴高血糖；③2型糖尿病口服降糖药治疗无效；或新诊断的2型糖尿病患者，如有明显的高血糖症状和/或血糖或A1C水平明显升高，一开始即考虑胰岛素治疗加或不加其他药物；④妊娠期糖尿病；⑤糖尿病合并严重并发症；⑥全胰腺切除引起的继发性糖尿病；⑦因伴发病需要外科手术的围术期。患者口服多种降糖药，血糖控制差，故选用胰岛素。尿频量多，浊如脂膏，腰膝酸软，口干乏力，头晕耳鸣，皮肤干燥，舌红少苔，脉细数考虑下消(肾阴亏虚证)，方选六味地黄丸。

标签：

112. 患者，女，35岁。关节肿胀疼痛，痛有定处，晨僵，屈伸不利，夜间发热，盗汗，口干咽燥，手足心热，舌红苔少，脉细数。诊断为类风湿性关节炎，治疗应首选

- A. 大秦艽汤
- B. 宣痹汤
- C. 丁氏清络饮
- D. 三痹汤
- E. 白虎加桂枝汤

答案:C

解析:患者为阴虚内热证，故选丁氏清络饮养阴清热、祛风通络。其余选项均不是类风湿中医辨证论治考纲所选方。

标签：

113. 患者女性，发热5天，今天病情加重，高热，体温39℃，肢厥，神志昏迷，谵语，舌謇，舌鲜绛，脉细数。某医院诊断为系统性红斑狼疮。其治疗当用清宫汤送服

- A. 安宫牛黄丸
- B. 苏合香丸
- C. 神犀丹
- D. 玉枢丹
- E. 通关散

答案:A

解析:系统性红斑狼疮脑虚瘀热证证候:身灼热，肢厥，神昏谵语，或昏愤不语，或痰壅气粗，舌謇，舌鲜绛，脉细数。治法:清心开窍。方药:清宫汤送服或鼻饲安宫牛黄丸或至宝丹。

标签：

114. 男孩，8岁，吃午饭时，突然意识短暂丧失，面色变白，双目凝视，手中的筷子掉在地上，口角出现细小颤动，持续约15秒后立即清醒。最可能的诊断是

- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫不典型失神发作

- C. 癫痫典型失神发作
- D. 癫痫全面性强直一阵挛发作
- E. 癫痫持续状态

答案:C

解析:典型失神发作通常称小发作,见于5~14岁的儿童。表现为意识短暂丧失,失去对周围的知觉,但无惊厥。病人突然终止原来的活动或中断谈话,面色变白,双目凝视,手中所持物件可能失握跌落,有时眼睑、口角或上肢出现不易觉察的颤动,无先兆和局部症状;一般持续3~15秒,事后对发作全无记忆。发作终止立即清醒。

标签:

115. 患癫痫10年,频繁发作,头晕目眩,两目干涩,心烦失眠,腰膝酸软,舌质红少苔,脉细数。中医治法是

- A. 补益心肾,潜阳息风
- B. 补益肝肾,育阴息风
- C. 活血化瘀,通络息风
- D. 涤痰息风,开窍定痫
- E. 补益心脾,息风通络

答案:B

解析:腰膝酸软,辨为肝肾阴虚。排除CDE。两目干涩对应肝,补益肝肾最佳。补益心肾也可以,但潜阳对应肝阳上亢,应有头重脚轻、头痛目赤、面红等表现。

标签:

116. 患者高血压病史10年,现突然昏仆,口噤不张,口眼喎斜,半身不遂,气粗息高,颜面潮红,舌红,苔黄腻,脉弦滑数,头部CT未见明显高密度影,其病证结合诊断是

- A. 脑梗死,痰湿壅闭心神证
- B. 脑出血,痰热腑实证
- C. 脑出血,痰热内闭清窍证
- D. 脑梗死,元气败脱证
- E. 脑梗死,痰热内闭清窍证

答案:E

解析:头部CT未见明显高密度影,脑梗死。半身不遂,中风;突然昏仆,中脏腑;口噤不张,闭证;苔黄腻,脉弦滑数,痰热。

标签:

117. 患者,男,71岁。突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,痰涎壅盛,四肢欠温,舌淡,苔白滑腻,脉沉。头颅CT示:脑出血,急用苏合香丸灌服后,治疗还应选用的方剂是

- A. 生脉散

- B. 地黄饮子
- C. 羚羊角汤
- D. 参附汤
- E. 涤痰汤

答案:E

解析:痰湿壅闭心神证。A、D用于元气败脱，心神散乱证

标签:

118. 患者，女性，45岁，脘腹痞闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦，治疗首选方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 越鞠丸合枳术丸
- C. 泻心汤合连朴饮
- D. 保和丸
- E. 益胃汤

答案:B

解析:患者脘腹痞闷、胸胁胀满属于中医痞满，同时心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦，证属痞满之肝胃不和证，当用越鞠丸合枳术丸加减治疗。

标签:

应用

精华

简单

119. 患者，男，34岁。近来时常鼻衄，或兼齿衄，血色鲜红，牙龈红肿疼痛，口臭便秘，鼻干口干，舌红苔黄，脉洪数。其治法是

- A. 滋阴润肺
- B. 滋阴降火
- C. 益气摄血
- D. 清肝泻火
- E. 清胃泻火

答案:E

解析:口臭便秘，舌红苔黄，脉洪数为胃热炽盛之证，治以清胃泻火，凉血止血为法。

标签:

精华

简单

记忆

120. 患者，男，60岁。反复牙齿出血，血色淡红。且每因受热或烦劳引发或加重，齿摇而不坚，舌质红，苔少，脉细数。应该选用

- A. 左归饮加减
- B. 六位地黄丸合茜根散加减
- C. 百合固金汤加减
- D. 大菟丝子饮加减
- E. 归脾汤

答案:B

解析:证属阴虚火旺型齿衄, 治宜滋阴降火, 凉血止血。选用六味地黄丸合茜根散加减。

标签:

应用

精华

简单

A3/A4 型选择题

(121-1~121-4 题共用题干)

患者, 男, 15 岁。寒战、高热 3 天, 伴鼻出血和口腔溃疡, 体格检查: 全身可见散在出血点, 浅表淋巴结不肿大, 胸骨无压痛, 肝脾未触及; 血象, Hb 为 100g/L, WBC 为 $1.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.15, 淋巴细胞 0.85, 血小板 $12 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.001。

121. 该患者诊断最可能是

- A. 普通型再障
- B. 败血症合并 DIC
- C. 急性粒细胞缺乏症
- D. 急性早幼粒细胞白血病
- E. 重型再障

答案:E

解析:重型再障的血象标准:①网织红细胞 <0.01 , 绝对值 $<15 \times 10^9/L$; ②中性粒细胞绝对值 $<0.5 \times 10^9/L$; ③血小板 $<20 \times 10^9/L$ 。

标签:

精华

中等

记忆

122. 为明确诊断, 应进一步检查

- A. 骨髓细胞染色体检查
- B. ECT 骨成像
- C. 骨髓象检查
- D. 血培养致病菌+药敏试验
- E. 凝血功能检查

答案:C

解析:为明确诊断,应进一步进行骨髓象检查。

标签:

精华

简单

记忆

123. 本患者治疗首选的是下列哪一项

- A. 抗生素+激素+肝素
- B. 雄性激素+抗生素+血小板输注
- C. 环孢菌素+抗生素+G-CSF
- D. 联合化疗+抗生素
- E. 自体骨髓移植

答案:C

解析:考虑该患者存在感染,故其最佳治疗为环孢菌素+抗生素+G-CSF。

标签:

精华

简单

记忆

(124-1~124-3 题共用题干)

患者,男,65岁。急性心肌梗死2小时。心电图示:V1-V6,ST段弓背抬高,异常Q波,伴T波双向。

124. 心电图定位诊断

- A. 广泛前壁心肌梗死
- B. 高侧壁心肌梗死
- C. 前侧壁心肌梗死
- D. 下壁心肌梗死
- E. 心内膜下心肌梗死

答案:A

解析:答案明显。

标签:

125. 病理变化

- A. 凝固性坏死
- B. 心肌纤维溶解
- C. 形成肌溶灶
- D. 肉芽组织形成
- E. 结缔组织替代

答案:A

解析:冠状动脉闭塞后20-30分钟,受其供血的心肌即有少数坏死,开始了AMI的病理过程。1-2小时之间绝大部分心肌呈凝固性坏死,心肌间质充血、

水肿，伴大量炎症细胞浸润。之后，坏死的心肌纤维逐渐溶解，形成肌溶灶，虽有渐有肉芽组织形成。

标签：

126. 最具临床意义的治疗措施是

- A. 有效缓解胸痛
- B. 消除心律失常
- C. 控制休克
- D. 治疗心力衰竭
- E. 再灌注治疗

答案：E

解析：起病 3-6 小时最迟在 12 小时内，使闭塞的冠状动脉再通，心肌得到再灌注，濒死的心肌可能得以存活或缩小坏死的范围，是一种积极的治疗措施。

标签：

（127-1~127-3 题共用题干）

男，60 岁，高血压病史，吵架后，出现头晕，头痛，意识障碍，肢体瘫痪。现症：突然昏仆，口噤目张，气促息高，两手握固，躁扰不宁，口眼喎斜，半身不遂，昏不知人，颜面潮红，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。

127. 西医诊断考虑

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

答案：D

解析：肢体瘫痪，排除短暂性脑缺血发作。活动起病(生气)，排除脑血栓形成(安静)。蛛网膜下腔出血多因先天性动脉瘤或血管畸形破裂，见于青少年，60 岁以上老年患者临床表现常不典型。脑栓塞以青壮年多见，病史常为慢性房颤。

标签：

128. 为明确诊断或指导治疗，需要进行的检查是

- A. CT
- B. MRI
- C. TCD
- D. DSA
- E. PET

答案：A

解析：①CT 是诊断脑出血安全有效的方法，为临床上脑出血疑诊病例的首选检查；可显示血肿的部位、大小，是否有占位效应，是否破入脑室、蛛网膜

下腔，周围脑组织受损情况，及有无梗阻性脑积水等，故对脑出血确诊和指导治疗均有肯定意义。②MRI，急性期对幕上及小脑出血的诊断价值不如CT，但对脑干出血优于CT。③DSA，只在考虑手术清除血肿或需排除其他疾病时方才进行。④脑脊液检查，有明显颅内压增高者，腰穿因有诱发脑疝的危险，仅在不能进行头颅CT检查且临床无明显颅内压增高表现时进行；怀疑小脑出血禁行腰穿。⑤出血量的估算，多田公式(根据CT影像估算，出血量=0.5×最大面积长轴×最大面积短轴×层面数)，注意出血量的估算近年考试中有涉及，记住公式即可。

标签：

129. 中医治疗选方

- A. 天麻钩藤饮
- B. 真方白丸子
- C. 星蒺承气汤
- D. 安宫牛黄丸合羚羊角汤
- E. 苏合香丸合涤痰汤

答案:D

解析:突然昏仆，开窍，排除ABC。颜面潮红、苔黄腻，痰热，排除E。

标签：

B1 型选择题

(130-1~130-2 题共用备选答案)

- A. 房性期前收缩
- B. 房性期前收缩未下传
- C. 交界性期前收缩
- D. 交界性逸搏
- E. 室性期前收缩

130. 提早出现QRS波，宽0.12秒，其前无相关P波，其诊断是

答案:E

解析:正常心电图QRS波群0.06-0.10s，P-R间期0.12-0.20s。过早搏动(期前收缩):①房性早搏，提前出现P'波；P'-R>0.12s；QRS形态正常；代偿间歇不完全。②交界性早搏，提前出现的QRS波，其前无相关P波；QRS形态正常；代偿间歇完全。③室性早搏，QRS提前出现，宽大、畸形、切迹，时间0.12s；T波宽大，与QRS主波方向相反；代偿间歇完全。本题提前出现的QRS波群为早期收缩；其前无相关P波，可能为房室交界性或室性；QRS>0.10s，宽大畸形，故选E。

标签：

131. 提早出现P波，P-R为0.16秒，QRS形态正常，其诊断是

答案:A

解析:提前出现的P波，期前收缩；QRS形态正常，考虑房性或交界性；有

提前出现 P'波；P'-R>0.12s，为房性。故选 A。

标签：

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 长 Q-T 综合征
- B. 左室射血分数低于 30%
- C. 室壁节段性收缩运动减弱
- D. X 综合征
- E. 电解质失衡

132. 心脏性猝死的最强预测因素是

答案:B

解析:左心室射血分数低于 30%是猝死的**最强预测因素**，心肌梗死后出现频发性与复杂性室性期收缩亦预示猝死高危。

标签：

(133-1~133-2 题共用备选答案)

- A. 交感神经抑制剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. 噻嗪类利尿剂
- E. 血管紧张素转化酶抑制剂

133. 高血压合并痛风患者禁用

答案:D

解析:利尿剂:可作为无并发症高血压患者的首先药物，适用于轻、中度高血压，尤其适宜于老年高血压、肥胖及并发心力衰竭者。有噻嗪类、袢利尿药和保钾利尿药三类，根据具体病情相应选择。禁用于痛风患者。

标签：

134. 高血压妊娠期患者禁用

答案:E

解析:血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI):降压起效缓慢，逐渐增强，在 3~4 周时达最大作用，对伴有心力衰竭、左心室肥大、心肌梗死后、糖耐量减低或糖尿病肾病蛋白尿等并发症的患者尤为适宜。妊娠禁用。

标签：

(135-1~135-2 题共用备选答案)

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 免疫抑制治疗
- D. 脾切除
- E. 糖皮质激素

135. 再障治疗首选

答案:A

解析:解析见下题。

标签:

136. ITP 治疗首选

答案:E

解析:血液系统西医治疗总结。①缺铁性贫血治疗,口服铁剂首选。②再障,骨髓移植是根治的最佳方法,非重型以雄激素治疗为主。③白血病,化疗(羟基脲)。④ITP,糖皮质激素首选。脾切除治疗的有效方法之一。免疫抑制剂,不宜首选。

标签:

(137-1~137-2 题共用备选答案)

- A. 龛影
- B. 胃黏膜僵直
- C. 钡剂潴留
- D. 痉挛性切迹
- E. 上腹疼痛

137. 消化性溃疡的直接征象是

答案:A

解析:解析见下题。

标签:

138. 消化性溃疡的间接征象是

答案:D

解析:X 线发现龛影是消化性溃疡的直接征象,是诊断的可靠依据。切线位观察时龛影突出于胃或十二指肠轮廓之外,周围有透亮带,粘膜皱襞向溃疡集中。局部压痛、痉挛性切迹、十二指肠球部激惹和畸形,是溃疡的间接征象。

标签:

(139-1~139-2 题共用备选答案)

- A. 人体受外界环境中热源作用和体内热量不能通过正常生理性散热达到热平衡
- B. 高温环境中,由于大量出汗,使水和盐丢失过多,仅补充大量水而补盐不足
- C. 过多出汗,失水失盐均较严重
- D. 人体对热环境不适应,引起周围血管过度扩张
- E. 通气不足、弥散障碍、通气/血流比例失调及耗氧量增加

139. 【助不要求】热射病的机制

答案:A

解析:解析见下题。

标签:

140. 【助不要求】热痉挛的机制

答案:B

解析:E 慢性呼衰。热源作用、热蓄积,热“射”病。大量出汗,电解质不足,热痉挛。过多出汗,水电解质均不足;周围血管扩张,热衰竭。

标签:

(141-1~141-2 题共用备选答案)

A. 清燥救肺汤

B. 加味二妙散

C. 参苓白术散

D. 大补阴煎

E. 右归丸

141. 腰痛隐隐,喜温喜按,腰膝无力遇劳更甚,反复发作,舌淡,脉沉细。治宜。

答案:E

解析:腰痛,肾阳虚。

标签:

142. 下肢痿软无力,不能久立,咽干耳鸣,大肉消脱,舌红少苔,脉细数。治宜。

答案:D

解析:痿证,肝肾亏损,髓枯筋痿。

标签:

(143-1~143-2 题共用备选答案)

A. 静止性震颤

B. 姿势性震颤

C. 肌强直

D. 运动迟缓

E. 姿势步态异常

143. 帕金森病主症

答案:A

解析:帕金森病又称震颤麻痹,典型表现是静止性震颤,常为首发症状。

标签:

144. 特发性震颤主症

答案:B

解析:特发性震颤,震颤以姿势性或运动性为特征,发病年龄早,饮酒或用心得安后可显著减轻,无肌强直和运动迟缓,1/3 患者有家族史。

标签:

(145-1~145-2 题共用备选答案)

- A. 桑菊饮或三拗汤
- B. 麻杏石甘汤合苇茎汤
- C. 清营汤合四逆汤
- D. 生脉散合四逆汤
- E. 竹叶石膏汤

145. 某女，患肺炎 4 天不见好转，高热骤降，大汗肢冷，颜面苍白，呼吸急迫，四肢厥冷，唇甲青紫，神志恍惚，舌淡青紫，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

答案:D

解析:解析见下题。

标签:

146. 某男，发病初起，咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠色黄，发热重，恶寒轻，无汗，口微渴，头痛，鼻塞，舌边尖红，苔薄微黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

答案:A

解析:邪犯肺卫证用三拗汤或桑菊饮；痰热壅肺证用麻杏石甘汤合千金苇茎汤；热闭心神证用清营汤；阴竭阳脱证用生脉散合四逆汤；正虚邪恋证用竹叶石膏汤。

标签:

(147-1~147-2 题共用备选答案)

- A. 共济失调
- B. 癔病性瘫痪
- C. 流涎
- D. 横纹肌肌束颤动
- E. 精神抑郁

147. 有机磷杀虫药中毒毒蕈碱样的症状是

答案:C

解析:毒蕈碱样症状(M 样症状)，由于堆积的乙酰胆碱使副交感神经末梢过度兴奋，引起平滑肌舒缩失常和腺体分泌亢进。用胆碱受体阻断药，以阿托品为代表药物。

标签:

148. 有机磷杀虫药中毒烟碱样的症状是

答案:D

解析:烟碱样症状(N 样症状)，乙酰胆碱堆积在横纹肌神经-肌肉接头处，出现肌纤维颤动，甚至全身骨骼肌强制性痉挛，过度兴奋后会出现抑制，发生肌力减退甚至呼吸肌麻痹；乙酰胆碱还可刺激交感神经节和肾上腺髓质，出现血压升高和心律失常。用胆碱酯酶复能药，对抗外周 N2 受体。

标签: