

护考 1000 题 (上)



金英杰护考圈

Jinyingjie.com

(一)

1. (A1 型题) 产科急诊收治一位产妇，主诉今晚入睡前突感一阵水样物质从阴道内流出，平卧着被送至医院。查阅产前检查记录单及体检：孕 33 周，臀先露。胎先露高浮，胎心好，无宫缩。急诊医生将检查结果、治疗方案、可能的并发症告知家属，其中最严重的并发症为

- A. 早产
- B. 脐带脱垂
- C. 胎儿宫内窘迫
- D. 母亲宫内感染
- E. 产程延长

1. 答案：B

解析：胎膜早破并发症：早产、感染、胎儿宫内窘迫和脐带脱垂等，其中以脐带脱垂最为严重，故答案选 B。

2. (A1 型题) 风湿性心脏病孕产妇死亡的主要原因是

- A. 心力衰竭
- B. 心律失常
- C. 产褥感染
- D. 产后出血
- E. 流产

2. 答案：A

解析：心脏病孕产妇的主要死亡原因是心力衰竭和感染，对妊娠合并心脏病的处理主要取决于心脏的功能状况。因此，本题选 A。

3. (A1 型题) 妊娠合并糖尿病对胎儿的不良影响，不包括

- A. 早产儿
- B. 胎儿畸形
- C. 溶血症
- D. 巨大儿
- E. 胎儿生长受限

3. 答案：C

解析：妊娠合并糖尿病对胎儿的不良影响包括巨大儿（发生率高达 25%~40%）、胎儿畸形（主要死亡原因）、早产和胎儿生长受限。故本题选 C。

4. (A1 型题) 妊娠合并心脏病的孕妇何时开始每日食盐量不超过 4~5g

- A. 妊娠 7 周
- B. 妊娠 16 周
- C. 妊娠 12 周
- D. 妊娠 28 周
- E. 妊娠 32 周

4. 答案：B

解析：心脏病孕妇摄入高热量、高维生素、低盐低脂饮食且富含多种微量元素如铁、锌、钙等，宜少量多餐，多食蔬菜和水果，防止便秘加重心脏负担。整个孕期孕妇体重增加不超过 10kg。妊娠 16 周后，每日食盐量不超过 4~5g。故本题选 B。

5. (A1 型题) 下列哪种情况分娩开始即需应用抗生素预防感染

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 妊娠合并贫血
- C. 妊娠合并病毒性肝炎
- D. 妊娠合并糖尿病
- E. 妊娠合并肺结核

5. 答案：A

解析：心脏病产妇如无产科指征、心功能良好，可在严密监护下经阴道分娩。要严密观察病情变化，防止发生心衰。心脏病产妇也可选择剖宫产，但如有急性心衰时，应先控制心衰，再行手术。同时，常规给予广谱抗生素，直至产后一周，以预防亚急性细菌性心内膜炎。因此，本题选 A。

6. (A1 型题) 关于妊娠合并肝炎，下列说法错误的是

- A. 使早孕反应加重
- B. 孕晚期易发生妊高征
- C. 分娩期易发生产后出血

- D. 对胎儿无影响
- E. 妊娠期易发生病毒性肝炎

6. 答案: D

解析: 病毒性肝炎主要有甲型、乙型、丙型、丁型、戊型五种病毒, 以乙型肝炎常见。妊娠期感染肝炎病毒, 不仅严重危害孕妇健康, 也累及胎儿, 是孕产妇和围生儿死亡的重要原因之一。因此, 对胎儿无影响错误, 故选 D。

7. (A1 型题) 初产妇, 妊娠合并心脏病, 产后心功能 II 级。护士实施的护理措施不包括

- A. 产后 3 天严密观察心力衰竭的表现
- B. 按医嘱应用抗生素至产后 1 周
- C. 不宜母乳喂养
- D. 进食富含纤维素食物, 预防便秘
- E. 可在产后 10 天出院

7. 答案: C

解析: 心功能 I ~ II 级的产妇可以母乳喂养, 但应避免过劳; 保证充足的睡眠和休息。故本题选 C。

8. (A1 型题) 某产妇妊娠合并糖尿病, 孕期无其他合并症。于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴, 对于该新生儿应重点监测的内容是

- A. 大小便
- B. 体重
- C. 黄疸
- D. 血糖
- E. 体温

8. 答案: D

解析: 新生儿出生后仍存在高胰岛素血症, 如不及时补充糖易发生新生儿低血糖, 严重时危及生命。故本题选 D。

9. (A1 型题) 妊娠合并心脏病孕妇, 心功能 III 级, 行剖宫产术。术后安全返回病房, 子宫收缩好, 血压正常, 护士给予产妇的正确护理措施是

- A. 清淡饮食, 防止便秘

- B. 尽早协助哺乳，促进子宫收缩
- C. 不宜再妊娠，产后 42 天后行绝育术
- D. 产后 3 天按医嘱应用抗生素
- E. 产后 72 小时严密观察生命体征，每 4 小时一次

9. 答案：A

解析：心功能III级的产妇应及时回乳，不宜哺乳，B 错误；不宜再妊娠，在剖宫产后 1 周行绝育术，C 错误；产后按医嘱预防性使用抗生素及协助恢复心功能的药物，无感染征象时停药，D 错误；产后 72 小时不间断严密观察生命体征，E 错误。故本题选 A。

10. (A1 型题) 子宫收缩乏力的止血措施首选

- A. 宫腔填塞纱布条
- B. 按摩子宫并注射缩宫素
- C. 压迫腹主动脉
- D. 结扎子宫动脉
- E. 子宫切除术

10. 答案：B

解析：对子宫收缩乏力产妇应协助医生积极处理，胎儿娩出后立即注射宫缩剂。胎盘娩出后仔细检查胎盘、胎膜是否完整、软产道有无裂伤。产后 2~4 小时密切观察宫缩、阴道流血、血压、脉搏情况。督促产妇排尿，如合并产后出血应教会产妇及家属按摩宫底，促进子宫收缩。因此，本题选 B。

11. (A1 型题) 宫缩乏力对母体的影响与哪项无关

- A. 影响休息、进食
- B. 导致肠胀气
- C. 产程缩短
- D. 引起产后出血
- E. 易引起产褥感染

11. 答案：C

解析：宫缩乏力对产妇的影响：由于产程延长，产妇休息不好，进食少，精神与体力消耗，可出现疲乏无力、肠胀气、排尿困难等，严重时可引起脱水、酸中毒、

低钾血症。胎膜早破以及多次肛查或阴道检查增加感染机会。产后宫缩乏力影响胎盘剥离、娩出和子宫壁的血窦关闭，容易引起产后出血，因此，C选项错误，其余均正确，本题选C。

12. (A1型题) 协调性子宫收缩乏力表现为

- A. 子宫收缩无对称性
- B. 容易发生胎膜早破
- C. 不宜静脉滴注缩宫素
- D. 产程常延长
- E. 不易发生产后出血

12. 答案: D

解析: 协调性子宫收缩乏力又称低张性子宫收缩乏力，是指子宫收缩具有正常的节律性、对称性及极性，但收缩力弱，宫腔压力低于15mmHg，持续时间短，间歇期长且不规律，宫缩小于2次/10分钟。在宫缩的高峰期，宫体隆起不明显，用手指压宫底部肌壁仍可出现凹陷，可使产程延长甚至停滞。故本题选D。

13. (A1型题) 潜伏期延长是指初产妇第一产程潜伏期超过

- A. 6小时
- B. 8小时
- C. 14小时
- D. 16小时
- E. 20小时

13. 答案: D

解析: 潜伏期是指从出现规律宫缩开始至宫口扩张3cm，超过16小时称潜伏期延长。故本题选D。

14. (A1型题) 轻度头盆不称的正确试产为

- A. 给予镇静剂
- B. 观察2~4小时
- C. 给予灌肠
- D. 予静脉输液
- E. 观察1~2小时

14. 答案：B

解析：轻度头盆不称在严密监护下可以试产，一般不可使用镇静剂，少肛查，禁灌肠。试产 2~4 小时，胎头仍未入盆，并伴胎儿窘迫者，应停止试产，及时剖宫产。故本题选 B。

15. (A1 型题) 孕妇，32 岁，足月妊娠，胎膜早破就诊。产科检查示胎头未入盆，诊断为头盆不称，拟次日行剖宫产术。关于该孕妇的健康教育内容，不恰当的是

- A. 适当抬高臀部
- B. 卧床休息时可取左侧卧位
- C. 解释剖宫产术前、术后注意事项
- D. 讲解保持会阴清洁的必要性
- E. 鼓励术前适当下床活动

15. 答案：E

解析：胎膜早破的产妇应绝对卧床，取左侧卧位，注意抬高臀部防止脐带脱垂造成胎儿缺氧或宫内窘迫。故本题选 E。

16. (A1 型题) 某孕妇身体矮小，匀称，骨盆测量数值如下：髂前上棘间径 22cm，髂嵴间径 24cm，骶耻外径 17cm，出口横径 7.5cm，对角径 11.5cm，此孕妇骨盆为

- A. 扁平骨盆
- B. 畸形骨盆
- C. 漏斗骨盆
- D. 横径狭小骨盆
- E. 均小骨盆

16. 答案：E

解析：骨盆形状正常，但各径线可较正常值缩短 2cm 以上，因此，它的各个平面都有一定程度的缩小，多见于矮小妇女，结合该患者径线长度可以诊断为均小骨盆，故答案为 E。

17. (A1 型题) 持续性枕后位的表现正确的是

- A. 胎心在脐上方一侧听诊最清楚
- B. 产妇过早感觉肛门坠胀而向下屏气用力

- C. 不易发生宫颈水肿
- D. 可致第一产程延长
- E. 正常胎位

17. 答案: B

解析: 持续性枕后位的临床表现为产程延长, 尤其因其枕骨持续位于母体骨盆后方, 直接压迫直肠, 产妇自觉肛门坠胀及排便感, 子宫颈口尚未开全, 过早屏气使用腹压, 使产妇疲劳, 宫颈前唇水肿, 胎头水肿, 影响产程进展。故本题选 B。

18. (A1 型题) 对于臀位出生的新生儿应防止其发生

- A. 新生儿肝炎
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿破伤风
- D. 新生儿颅内出血
- E. 新生儿肺炎

18. 答案: D

解析: 臀位出生的新生儿因分娩时由于臀围小于头围, 后出胎头困难, 除了可发生新生儿窒息, 还可因产伤发生颅内出血, 臀位发生颅内出血是头先露的 10 倍。故本题选 D。

19. (A1 型题) 孕妇产前检查时发现胎儿臀位, 需要给予胎位矫治。护士应告知其最佳的干预时间是

- A. 孕 8 周
- B. 孕 16 周
- C. 孕 24 周
- D. 孕 30 周
- E. 孕 36 周

19. 答案: D

解析: 胎位异常者在 30 周前多能自行转为头先露, 若 30 周后仍未纠正, 可指导孕妇采取膝胸卧位。故本题选 D。

20. (A1 型题) 孕妇, 孕 30 周, 臀先露, 为矫正胎位, 可采取的体位是

- A. 膝胸卧位

- B. 半卧位
- C. 左侧卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 俯卧位

20. 答案: A

解析: 胎位异常者在 30 周前多能自行转为头先露, 若 30 周后仍未纠正, 可指导孕妇采取膝胸卧位。故本题选 A。

21. (A1 型题) 产后出血应处理哪项不妥

- A. 应迅速而又有有条不紊地抢救
- B. 医生到后, 方可采取止血措施
- C. 宫缩乏力引起出血立即按摩子宫
- D. 压出宫腔积血可促进宫缩
- E. 注射子宫收缩剂

21. 答案: B

解析: 产后出血是产褥期严重并发症, 居我国目前孕产妇死亡原因的首位, 治疗原则为针对原因迅速止血、补充血容量纠正休克及防治感染。护理人员要镇定, 做到有条不紊, 切忌手忙脚乱, 一边采取止血措施: 如按摩子宫, 注射子宫收缩剂等, 一边迅速通知医生。故本题 B 错误, 其余选项均正确, 答案选 B。

22. (A1 型题) 导致产后出血首位的原因为

- A. 胎盘残留
- B. 胎盘粘连
- C. 宫缩乏力
- D. 宫颈撕裂
- E. 凝血功能障碍

22. 答案: C

解析: 子宫收缩乏力是产后出血最常见的原因, 占产后出血总数的 70%~80%。故本题选 C。

23. (A1 型题) 胎盘滞留是指胎儿娩出后而胎盘未娩出超过

- A. 5 分钟

- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 25 分钟
- E. 30 分钟

23. 答案: E

解析: 胎儿娩出后, 胎盘应在 15 分钟内娩出, 若 30 分钟仍未娩出者, 胎盘剥离面血窦不能正常关闭而导致产后出血。故本题选 E。

24. (A1 型题) 产后出血最重要的预防措施是

- A. 适度做会阴侧切术
- B. 胎肩娩出后立即肌内注射缩宫素 10U
- C. 督促产妇及时排空膀胱
- D. 产后 24 小时内观察阴道流血及宫缩情况
- E. 产后早期哺乳

24. 答案: B

解析: 子宫收缩乏力是产后出血最常见的原因, 故防止产后出血应保证产后宫缩正常, 应在胎肩娩出后立即注射缩宫素, 加强宫缩, 减少出血。故本题选 B。

25. (A1 型题) 下述哪项不是产后出血的病因

- A. 胎盘滞留
- B. 产后宫缩乏力
- C. 凝血功能障碍
- D. 软产道裂伤
- E. 胎儿窘迫

25. 答案: E

解析: 引起产后出血的原因主要有子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤和凝血功能障碍。其中以子宫收缩乏力所致者最常见, 故本题选项中不属于产后出血的病因的是 E。

26. (A1 型题) 初产妇, 28 岁, 足月妊娠, 分娩过程中该产妇出现软产道血肿, 以下哪项是该症最常见的主诉

- A. 口渴

- B. 头痛
- C. 排便感明显
- D. 腹痛
- E. 怕冷

26. 答案: C

解析: 软产道损伤造成阴道壁血肿的产妇会有尿频或肛门坠胀感, 排便感明显, 排尿疼痛。故本题选 C。

27. (A1 型题) 孕妇, 29 岁, 孕 39 周, 于胎儿娩出后发生产后出血。护士评估其产后出血的原因, 不包括下列哪项因素

- A. 胎盘因素
- B. 凝血功能障碍
- C. 软产道损伤
- D. 子宫收缩乏力
- E. 骨盆畸形

27. 答案: E

解析: 产后出血主要是由子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道损伤和凝血功能障碍造成的。故本题选 E。

28. (A1 型题) 初产妇, 产程延长行产钳助产, 胎儿娩出后阴道持续不断流血, 色鲜红。检查: 胎盘完整, 子宫底脐下 2 指, 质硬, 阴道不断有鲜红色血流出, 有凝血块。首要的措施是

- A. 补充血容量
- B. 检查软产道
- C. 注射止血药
- D. 记录出血情况
- E. 静脉滴注缩宫素

28. 答案: B

解析: 产妇行产钳助产, 容易造成产道损伤, 又产妇的阴道不断有鲜红色血液流出, 血液能自凝, 故怀疑是软产道裂伤导致的出血, 应立即检查软产道。故本题选 B。

29. (A1 型题) 初产妇, 顺产后阴道出血量大, 暗红色。检查发现子宫体软。护士采取的首要措施是

- A. 检查胎盘是否完整
- B. 检查软产道有无损伤
- C. 抽血检查凝血功能
- D. 按摩子宫
- E. 做好输血准备

29. 答案: D

解析: 子宫收缩乏力造成的产后出血, 子宫多宫底高, 软如袋状, 轮廓不清, 应立即使用宫缩剂、按摩子宫、宫腔内填塞纱布条或结扎血管等加强宫缩以止血。故本题选 D。

30. (A1 型题) 羊水栓塞可有

- A. 凝血功能障碍
- B. 阴道分泌物异常
- C. 恶变
- D. 下腹包块
- E. 输卵管破裂

30. 答案: A

解析: 羊水栓塞: 羊水内的凝血活酶进入母体导致 DIC, 故选 A。其他妇科疾病症状: 稽留流产可发生凝血功能障碍, 导致 DIC, 造成严重出血; 卵巢肿瘤的并发症包括蒂扭转、破裂、感染、恶变; 子宫肌瘤的主要症状为月经改变、下腹包块、白带增多、压迫症状等。

31. (A1 型题) 初产妇, 30 岁, 足月妊娠, 产后发生羊水栓塞, 首要的处理原则是

- A. 纠正缺氧
- B. 抗凝治疗
- C. 纠正酸中毒
- D. 抗休克
- E. 防治多器官损伤

31. 答案：A

解析：羊水栓塞产妇应首先改善低氧血症，正压给氧，必要时行气管插管或气管切开，保证供氧，减轻肺水肿，改善脑缺氧；并进行抗过敏、解痉挛、纠正心衰、抗休克纠正酸中毒等治疗。故本题选 A。

32. (A1 型题) 不属于先兆子宫破裂的临床表现为

- A. 子宫收缩力强
- B. 子宫病理性缩复环
- C. 子宫下段压痛
- D. 胎心率 100 次/分
- E. 腹壁下清楚触及胎儿肢体

32. 答案：E

解析：子宫先兆破裂时子宫下段膨隆，压痛明显，子宫圆韧带极度紧张，可明显触及并有压痛。由于过频宫缩，胎儿供血受阻，胎心率改变或听不清。故 A、B、C、D 均正确，腹壁下清楚触及胎儿肢体是子宫破裂的表现，先兆子宫破裂触不到胎体，故本题答案为 E。

33. (A1 型题) 病理缩复环可见于

- A. 前置胎盘
- B. 多胎妊娠
- C. 羊水过多
- D. 胎盘早剥
- E. 先兆子宫破裂

33. 答案：E

解析：先兆子宫破裂的四大主要症状是子宫形成病理性缩复环、下腹部压痛、胎心率改变及血尿出现。故本题选 E。

34. (A1 型题) 初产妇，妊娠 40 周。产程进展 24h，宫口开大 4cm 给予静脉点滴缩宫素后，宫缩持续不缓解，胎心 100 次/分，腹部缩复环上升至平脐，耻骨联合处有压痛，且导尿出现血尿。应考虑为

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥

- C. 痉挛性子宫
- D. 先兆子宫破裂
- E. 子宫收缩过强

34. 答案: D

解析: 先兆子宫破裂的四大主要临床表现是子宫形成病理性缩复环、下腹部压痛、胎心率改变及血尿出现。

35. (A1 型题) 初产妇, 孕 40 周, 宫口开 5cm, S+1 已破膜, 持续腹痛, 烦躁, 脐下触到一个狭窄部, 有压痛, 不正确的处理

- A. 予氧气吸入
- B. 予哌替啶 100mg 肌注
- C. 按摩产妇背部
- D. 使用硫酸镁
- E. 使用缩宫素

35. 答案: E

解析: 产妇有病理性缩复环、下腹部压痛、烦躁、腹部拒按等表现, 考虑为先兆子宫破裂, 使用缩宫素会加强宫缩, 导致子宫破裂。应立即采取有效措施抑制子宫收缩, 立即行剖宫产, 结束分娩。故本题选 E。

36. (A1 型题) 产褥感染护理哪项不妥

- A. 防止交叉感染, 进行床边隔离
- B. 产妇平卧臀部抬高
- C. 体温超过 38℃ 应停止哺乳
- D. 保证营养摄入
- E. 保持外阴清洁

36. 答案: B

解析: 产褥感染是指分娩时及产褥期生殖道受病原体感染, 引起局部和全身的炎性变化。本题中 A、C、D、E 均为产褥感染的护理措施, 而产妇平卧臀部抬高会造成炎症逆行感染而致盆腔炎、腹膜炎。应嘱产妇取半卧位, 以利于恶露引流及炎症局限。因此, 本题选 B。

37. (A1 型题) 产褥感染最常见的病变是

- A. 急性输卵管炎
- B. 急性子宫内膜炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 盆腔腹膜炎
- E. 血栓性下肢静脉炎

37. 答案: B

解析: 产褥感染的病理: ①急性外阴、阴道、宫颈炎; ②急性子宫内膜炎, 是最常见的病变; ③急性盆腔结缔组织炎、急性输卵管炎; ④急性盆腔腹膜炎及弥漫性腹膜炎; ⑤血栓性静脉炎; ⑥脓毒血症及败血症。产褥感染最常见的病理变化是急性子宫内膜炎。本题 B。

38. (A1 型题) 关于产褥感染的防治, 下述哪项不妥

- A. 加强孕期保健
- B. 产时尽量少做肛查
- C. 产前、产时常规用抗生素
- D. 产褥期保持外阴清洁
- E. 掌握阴道检查适应证

38. 答案: C

解析: 产褥感染的预防: 加强孕期保健, 临产前 2 个月避免性生活及盆浴, 加强营养, 增强体质; 掌握阴道检查适应证, 产时尽量少做肛查; 产褥期保持外阴清洁; 接产严格无菌操作。因此 A、B、D、E 均正确, 产前常规用抗生素是不妥的, 本题选 C。

39. (A1 型题) 产褥感染的病因, 错误的说法是

- A. 缩宫素的使用
- B. 产科手术操作
- C. 妊娠末期性交
- D. 产道本身存在细菌
- E. 盆浴

39. 答案: A

解析：缩宫素是维持和增强子宫收缩、促进分娩完成的主要激素，具有兴奋子宫平滑肌的作用，并不会引起感染。被污染的手术器械、妊娠末期性交以及产妇生殖道或其他部位的细菌都可以引起产褥感染。故本题选 A。

40. (A1 型题) 产褥感染体温高的护理措施，错误的是

- A. 嘱病人卧床休息
- B. 体温超过 39℃ 不予物理降温
- C. 鼓励病人多饮水
- D. 病房要定时通风
- E. 给予易消化的半流质饮食

40. 答案：B

解析：产褥感染体温过高的护理：严密观察病人的生命体征、意识状态及全身情况；嘱病人卧床休息，取半卧位；体温超过 39℃ 者给予物理降温，鼓励产妇多饮水；摄入高热量、高蛋白、高维生素、易消化的饮食；遵医嘱应用敏感抗生素，有效控制感染；病房要定时通风。因此 A、C、D、E 均正确，错误的是 B。

41. (A1 型题) 胎盘胎膜残留引起的产后出血，护理措施首选

- A. 刮宫术
- B. 绝对卧床
- C. 行开腹探查
- D. 子宫动脉结扎术
- E. 输血补充血容量

41. 答案：A

解析：胎盘滞留性出血的护理：胎盘剥离不全、粘连或残留者，应在无菌操作下，立即行人工剥离胎盘术，取出胎盘。或有部分残留者可用大号刮匙刮除残留组织。对植入性胎盘不易剥离者，应作好腹部手术的准备工作。可见，本题选 A。

42. (A1 型题) 初产妇，33 岁，足月妊娠，经阴道分娩出一健康女婴，产后被确诊为晚期产后出血。以下关于“晚期产后出血”的陈述，正确的是

- A. 产后 12 小时大出血称为晚期产后出血
- B. 最常发生在产后 1~2 周
- C. 发生晚期产后大出血子宫体已恢复

- D. 晚期产后大出血多伴凝血功能障碍
- E. 人工喂养产妇易发生晚期产后出血

42. 答案: B

解析: 部分产妇分娩 24 小时后, 于产褥期内发生子宫大量出血, 被称为晚期产后出血, 多于产后 1~2 周内发生, 也有迟至产后 2 个月左右。故本题选 B。

43. (A2 型题) 患者, 女, 26 岁。孕 32 周时行自我胎动计数, 正常的是

- A. 1~2 次/小时
- B. 3~5 次/小时
- C. 6~8 次/小时
- D. 9~12 次/小时
- E. 13~15 次/小时

43. 答案: B

解析: 从妊娠 28 周后开始直至临产, 每日早、中、晚自行计数胎动 1 次, 每次 1 小时, 3 次相加总数乘 4 即为 12 小时胎动数。正常胎动每小时 3~5 次或 12 小时不少于 10 次。如胎动减少应考虑胎儿有宫内缺氧。本题只有 B 正确。

44. (A2 型题) 患者, 女, 25 岁。初孕妇, 停经 50 天。在“妇儿卫生保健咨询日”向护士咨询, 孕期哪段时间应禁止性生活, 正确回答是在妊娠

- A. 2 个月内及最后 1 个月
- B. 2 个月内及最后 2 个月
- C. 3 个月内及最后半个月
- D. 3 个月内及最后 1 个月
- E. 3 个月内及最后 3 个月

44. 答案: E

解析: 孕早期避免性生活, 以防流产、感染; 妊娠 28 周后避免性生活, 以防早产, 胎膜早破及感染。本题中 A、B、C、D 均错误, 只有 E 符合题意。

45. (A2 型题) 患者, 女, 23 岁, 初孕妇。产科检查: 宫底位于脐上 3 横指, 估计妊娠时间为

- A. 12 周末
- B. 16 周末

- C. 24 周末
- D. 28 周末
- E. 32 周末

45. 答案：D

解析：本题 A. 12 周末子宫在耻骨联合上 2~3 横指；B. 16 周末子宫在脐耻之间；C. 24 周末子宫在脐上 1 横指；D. 28 周末子宫在脐上 3 横指；E. 32 周末子宫在脐与剑突之间。可见，本题只有 D 符合题意。

46. (A2 型题) 患者，女，25 岁。停经 50 日，恶心、呕吐 1 周，每日呕吐 3~4 次，进食量明显减少，尿酮体阴性，正确的护理措施是

- A. 日服镇静剂
- B. 高蛋白饮食
- C. 鼓励少量多餐
- D. 绝对卧床休息
- E. 输血

46. 答案：C

解析：早孕妇女大多会发生恶心、呕吐、食欲不振等，这些都属正常生理现象，不需治疗，但应加强营养、注意饮食，吃容易消化吸收富含蛋白质、维生素及矿物质的食物，应少量多餐和避免油腻的清淡食物以减轻症状。本题 A、B、D、E 均错误，只有 C 符合题意。解析：

47. (A2 型题) 患者女，妊娠 8 周，不应该

- A. 有早孕反应
- B. 出现尿频现象
- C. 乳房增大，乳晕着色
- D. 在耻骨联合上扪及子宫底
- E. 尿妊娠试验呈阳性

47. 答案：D

解析：早孕反应约半数妇女于停经 6 周左右出现，于妊娠 12 周左右自行消失 (A 正确)；妊娠早期可出现尿频，约在妊娠 12 周以后自行消失 (B 正确)；自妊娠 8 周起，受增多的雌激素及孕激素影响，乳房逐渐增大，乳晕着色；尿妊娠试

验在早期即可阳性（E 正确）。妊娠 12 周后才在耻骨联合上扪及子宫底，故本题应选 D。

48.（A2 型题）患者女，妊娠 28 周，产前检查均正常，咨询监护胎儿情况最简单的方法，应指导其采用

- A. 胎心听诊
- B. 自我胎动计数
- C. 测宫高、腹围
- D. B 超检查
- E. 电子胎心监护

48. 答案：B

解析：该孕妇妊娠 28 周，产前检查均正常，监护胎儿最简便有效的方法是数胎动。一般 12 小时胎动次数在 30~40 次为正常范围。胎动计数 \leq 10 次/12 小时，提示胎儿缺氧。故本题答案为 B。

49.（A2 型题）患者女，初孕妇，孕 34 周，四步触诊结果，于子宫底部触到坚而硬的胎头，在耻骨联合上方触到较软而宽，形状不规则的胎臀，胎背位于母体腹部右前方，胎心音于脐上右侧听到。该孕妇胎方位为

- A. 骶左前
- B. 骶右前
- C. 骶左后
- D. 骶右后
- E. 骶左横

49. 答案：B

解析：胎儿为臀先露，以骶骨为指示点，根据指示点与母体骨盆前、后、左、右、横的关系判定胎方位；胎背位于母体腹部右前方，则骶骨位于骨盆右前方，故该孕妇的胎方位为骶右前，本题应选 B。

50.（A2 型题）患者女，末次月经日期记不清，来医院检查时子宫底在脐上一横指，胎心音正常。估计妊娠为

- A. 16 周末
- B. 20 周末

- C. 24 周末
- D. 28 周末
- E. 32 周末

50. 答案：C

解析：不同妊娠孕周的宫底高度：12 周末，耻骨联合上 2~3 横指；16 周末，脐耻之间；20 周末，脐下 1 横指；24 周末，脐上 1 横指；28 周末，脐上 3 横指；32 周末，脐与剑突之间；36 周末，剑突下 2 横指；40 周末，脐与剑突之间或略高。故该患者应为 C。

51. (A2 型题) 患者女，29 岁。尿 HCG 阳性，超声检查：宫内孕 6 周，对期孕期健康指导正确的是

- A. 妊娠初期 8 周内谨慎用药
- B. 28 周后每天数胎动 1 次
- C. 妊娠 12~28 周避免性生活
- D. 胎心率在 160~180 次/分
- E. 妊娠 30 周后进行乳房护理

51. 答案：A

解析：在妊娠期，许多药物可通过胎盘而进入胚胎内，影响胚胎发育，尤其是在妊娠最初 2 个月，是胚胎器官发育形成时期，此时用药更应注意，因此 A 选项正确。孕妇应每日早中晚各数 1 小时胎动，每小时胎动数应不少于 3 次，12 小时内胎动累计数不得小于 10 次，因此 B 选项一天只数 1 次胎动是不正确的。妊娠前 3 个月及末 3 个月，均应避免性生活，以防流产、早产及感染。因此 C 选项错误。胎心率正常在 120~160 次/分，因此 D 选项错误。怀孕中后期(4~7 个月)就应开始对乳头进行护理，要经常用棉签或干净柔软的毛巾蘸温盐水擦洗乳头(注意不要用碱性水)，保持乳头清洁，因此 E 选项也错误。

52. (A2 型题) 患者，女，29 岁，已婚，闭经，首先考虑引起闭经的原因是

- A. 精神刺激
- B. 妊娠
- C. 卵巢功能失调
- D. 生殖器肿瘤

E. 子宫内膜结核

52. 答案：B

解析：因该患者处于生育期，出现闭经后应首先考虑妊娠的可能。停经 10 天或以上应首先考虑早期妊娠的可能，如停经已达八周，则妊娠的可能性更大。故本题选 B。

53. (A2 型题) 某孕妇，38 岁。孕 2 产 0，孕 40 周临产，该患者为

- A. 高龄初产妇
- B. 低龄初产妇
- C. 高龄经产妇
- D. 低龄经产妇
- E. 正常初产妇

53. 答案：A

解析：年龄超过 35 岁即为高龄产妇，孕 2 产 0 即为初产妇，故本题选 A。

54. (A2 型题) 患者，女，27 岁。妊娠 10 个月，有临产预兆，急诊入院。产科检查：宫口开大 4cm。接诊护士应首办理的是

- A. 帮助产妇办入院手续
- B. 指导产妇沐浴更衣后入病区
- C. 为产妇清洗会阴，观察产程
- D. 扶持产妇步行进入病区
- E. 平车送产妇进入产房待产

54. 答案：E

解析：本题中产妇宫口开大 4cm 提示已进入第一产程，此时不宜耽误时间办理入院手续，也不宜沐浴更衣，而应用平车送产妇进入产房待产。因此，本题选 E。

55. (A2 型题) 患者，女，29 岁。第二产程延长，助产娩一男婴，重 3500g，胎盘娩出后，阴道持续出血 800ml，护理措施正确的是

- A. 不能按摩子宫，以免出血
- B. 检查胎盘胎膜是否完整
- C. 会阴垫可不保留
- D. 产后 12 小时下床活动

E. 为预防感染，3 天后开始阴道灌洗

55. 答案：B

解析：产后若子宫收缩不佳，阴道流血量多，应按摩子宫底，注射宫缩剂以加强宫缩，减少出血。本题中 A 错误，保留会阴垫估计出血量，C 错误，产后合理安排休息和活动，为预防感染，可给予抗生素，产褥期禁止阴道灌洗，D、E 错误，因此，本题选 B。

56. (A2 型题) 患者女，第 1 胎，妊娠 39 周来院检查，医生告之临产先兆，收住院。最可靠的依据是

- A. 宫缩强度增加
- B. 胎儿下降感
- C. 见红
- D. 上腹部舒适感
- E. 尿频

56. 答案：C

解析：在分娩前 24—48 小时，阴道会流出一些混有血的黏液，即见红，是分娩即将开始比较可靠的征兆。故本题应选 C。

57. (A2 型题) 患者女，自然分娩。产后 2 小时观察内容不包括

- A. 血压及脉搏
- B. 子宫收缩情况
- C. 阴道流血量
- D. 乳汁分泌情况
- E. 膀胱充盈情况

57. 答案：D

解析：产后出血约 80% 发生在产后 2 小时内，故胎盘娩出后，产妇应继续留在产房观察 2 小时，严密观察产妇一般情况、生命体征、宫缩和阴道流血情况。产后鼓励产妇及时排空膀胱，不能排空者应予导尿。故 A、B、C、E 正确；乳汁分泌在产后 72 小时开始，不属于产后 2 小时的观察内容，本题应选 D。

58. (A2 型题) 患者女, 26 岁, 妊娠 40 周, 规律宫缩 8 小时, 宫口开大 3 指, 胎心 136 次/分, 宫缩每 3~4 分钟一次, 每次持续 30 秒, 产妇精神非常紧张不断叫嚷“活不成了。”该产妇首先的护理是

- A. 严密观察产程
- B. 按时听胎心
- C. 做好心理调适
- D. 按时做肛查
- E. 鼓励进食

58. 答案: C

解析: 初产妇由于产程较长, 容易产生焦虑、紧张和急躁情绪, 助产人员应安慰产妇并耐心讲解分娩是生理过程, 增强产妇对自然分娩的信心, 调动产妇的积极性与助产人员密切合作, 以便能顺利分娩。故答案为 C。

59. (A2 型题) 患者女, 产妇, 26 岁, 第一胎, 足月临产 14 小时, 肛查: 宫口开全, 胎膜已破, 胎方位正常, 先露头, 双顶径达坐骨棘水平, 胎心音正常, 在处理中首先考虑的是

- A. 陪伴在产妇身旁, 指导使用腹压
- B. 观察胎头是否已达到阴道口
- C. 准备产包
- D. 消毒外阴
- E. 洗手准备接生

59. 答案: A

解析: 该产妇已临产 14 小时, 宫口已开全, 各项指标均无异常, 首先考虑阴道分娩, 所以应指导产妇正确运用腹压, 使胎儿顺利娩出, 故本题应选 A。

60. (A2 型题) 患者女, 初产妇, 顺产, 产后第 14 天子宫复旧情况哪项不正常

- A. 耻骨联合上方扪及宫底
- B. 白色恶露
- C. 宫颈内口关闭
- D. 子宫颈外口呈“一”型
- E. 子宫内膜尚未充分修复

60. 答案：A

解析：产后 10 日子宫降入骨盆腔内，此时腹部检查于耻骨联合上方扪不到宫底（A 错误）；宫颈外形（产后 1 周）及宫颈内口（产后 10 日）恢复至未孕状态；血性恶露约持续 3 日，逐渐转为浆液恶露，约 2 周后变为白色恶露，约持续 3 周干净（B 正确）；胎盘附着部位全部修复需至产后 6 周（E 正确）。产后 1 周，子宫颈外形及子宫颈内口恢复至未孕状态；产后 4 周时，子宫颈完全恢复至正常形态，由于子宫颈外口分娩时发生轻度裂伤，使初产妇的子宫颈外口由产前的圆形变为产后的“一”字型横裂（C、D 正确）。故 A 选项错误。

61.（A2 型题）患者女，28 岁。分娩时行会阴侧切，分娩后用 25%硫酸镁湿敷，护士在操作过程中应特别注意的是

- A. 热敷局部皮肤涂凡士林
- B. 保持合适的水温
- C. 敷料拧至不滴水为止
- D. 严格执行无菌操作
- E. 操作完毕后及时更换敷料

61. 答案：D

解析：进行湿热敷时，若热敷部位有伤口，须按无菌技术处理，以防伤口感染，加重病情。故本题选 D。

62.（A2 型题）患者女，顺产一女婴，产后第 2 天门窗紧闭，不让护士为其病室通风。护士给其宣教通风的目的，不恰当的是

- A. 减少感染的发生
- B. 减少细菌数量
- C. 增加氧含量
- D. 抑制细菌生长
- E. 净化空气

62. 答案：D

解析：产褥期妇女室内勤开窗通风，可以减少有害细菌的滋生。勤开窗通风保证室内氧气含量对婴儿的发育也是有好处的，还可以净化空气，故 A、B、C、E 正确。室内通风顺畅并没有抑制细菌的生长，本题选 D。

63. (A2 型题) 患者女, 初产妇、剖宫后乳汁少。以下鼓励母乳喂养的措施中哪一项不对

- A. 母婴同室
- B. 多进营养丰富的汤汁饮食
- C. 两次哺乳间给婴儿加少量糖水
- D. 增加哺乳次数
- E. 精神愉快、睡眠充足

63. 答案: C

解析: 根据常识就可以排除 A、B、D、E 选项, 鼓励纯母乳喂养, 而两次哺乳间给婴儿加少量糖水是错误的, 正确应鼓励增加哺乳次数。故选项 C 错误。

64. (A2 型题) 患者, 女, 30 岁。已婚, 停经 2 个月余, 阴道少量流血 4 日, 伴右下腹隐痛入院。妇科检查: 阴道少量流血, 宫颈口闭合, 子宫如 2 个月妊娠大, 附件未触及异常, 最可能发生的是

- A. 妊娠合并阑尾炎
- B. 先兆流产
- C. 滞留流产
- D. 不全流产
- E. 难免流产

64. 答案: B

解析: 先兆流产指妊娠 28 周前, 先出现少量阴道流血, 继之常出现阵发性下腹痛或腰背痛, 妇科检查宫颈口未开, 胎膜未破, 妊娠产物未排出, 子宫大小与停经周数相符, 妊娠有希望继续者。本题中患者的症状体征与 B 相符。因此, 选 B。

65. (A2 型题) 患者, 女, 24 岁。停经 50 天, 阴道少量流血伴下腹部隐痛 1 周。近 3 天腹痛加剧, 出血量增多。检查: 宫口已开, 子宫如孕 7 周大小, 尿妊娠试验 (-), 可能性最大的是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 稽留流产

E. 异位妊娠

65. 答案：B

解析：难免流产指流产已不可避免。由先兆流产发展而来，此时阴道流血量增多，阵发性下腹痛加重或出现阴道流液（胎膜破裂）。妇科检查宫颈口已扩张，有时可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈口内，子宫大小与停经周数相符或略小。本题中患者的症状体征与 B 相符。

66. (A2 型题) 患者，女，30 岁，已婚。停经 2 个月余，阴道少量流血 4 日，伴下腹隐痛入院。妇科检查：阴道少量血液，宫口闭，子宫有 2 个月妊娠大小，附件未触及异常，尿妊娠试验阳性。恰当的处理是

- A. 立即清宫
- B. 保胎治疗
- C. 立即引产
- D. 阴道后穹窿穿刺
- E. 催产素静脉滴注

66. 答案：B

解析：先兆流产指经保胎有希望继续妊娠者。妇检宫口未开，子宫大小与孕周相符，胎膜未破，妊娠物尚未排出。因此，本题选 B。

67. (A2 型题) 患者女，娩一女婴身长 35cm，体重 1000g，皮下脂肪少，头发、指甲已长出，新生儿娩出后能啼哭、吞咽，但生活能力很差。估计该新生儿娩出时孕周为

- A. 8 周
- B. 16 周
- C. 20 周
- D. 28 周
- E. 40 周

67. 答案：D

解析：28 周末，胎儿身长约 35 厘米，体重约 1000 克，皮下脂肪沉积不多，皮肤粉红，可以有呼吸运动，但胎肺未成熟，出生后能啼哭，但生活力很弱。32 周末，胎儿身长约 40 厘米，体重约 1700 克。皮肤深红，面部毳毛已脱，生活力

尚可，出生后加强护理可能存活。36周末，身长45厘米，体重约2500克，皮下脂肪较多，指（趾）甲已达指（趾）尖，出生后能啼哭和吸吮，生活力良好，此时出生基本可以存活。40周末，胎儿已成熟，身长约50厘米，体重约3000克以上，皮下脂肪丰满，皮肤粉红，指（趾）甲已超过指（趾）端。出生后哭声响亮，吸吮能力强，生活力强，能很好存活。根据该女婴的身长、体重，外观特征和个人能力，可以估计该新生儿娩出时孕周约为28周。故本题答案为D。

68. (A2型题) 患者女，孕1产0，孕37周，诊断“中度妊娠高血压综合征”住院治疗。自诉因担心药物影响胎儿发育成长，不愿接受药物治疗，但又怕不服药会使病情加重，威胁胎儿的安全，心情矛盾。在护理中，首先应是

- A. 测量血压 2~4 次/天
- B. 安静地休息
- C. 观察症状
- D. 心理护理
- E. 观察并发症

68. 答案：D

解析：子痫患者常因对疾病缺乏认识，担心胎儿预后而出现各种心理反应，这反而加重病情。首要的护理应是心理护理，向产妇说明治疗的必要性，可选用对胎儿影响小的药物等，故本题答案为D。

69. (A2型题) 孕妇由于妊高征应用硫酸镁治疗，在治疗过程中出现膝反射消失，呼吸浅而慢，每分钟10次，此患者除立即停药外应给下述哪种药

- A. 5%葡萄糖静脉滴注
- B. 肌注山莨菪碱
- C. 静注50%葡萄糖
- D. 静注10%葡萄糖酸钙
- E. 静注低分子右旋糖酐

69. 答案：D

解析：硫酸镁具有很强的抗惊厥和降血压作用，经常用于子痫患者。但硫酸镁的治疗浓度和中毒浓度相近，所以每次用药前和用药期间，均应检测以下指标：膝腱反射必须存在；呼吸每分钟不少于16次；尿量每小时不少于25mL。硫酸镁过

量首先表现为膝反射消失，随着血镁浓度增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制，严重者心跳可突然停止。当出现镁中毒时，立即静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10ml。故本题选 D。

70. (A2 型题) 孕 38 周孕妇，因先兆子痫入院。目前患者轻微头痛，血压为 140/90mmHg，尿蛋白(++)，呼吸、脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中，护士应报告医师停药的情况是

- A. 呼吸 18 次/分
- B. 膝反射消失
- C. 头痛缓解
- D. 血压 130/90mmHg
- E. 尿量 800ml/24h

70. 答案: B

解析: 硫酸镁的治疗浓度和中毒浓度相近，因此在进行硫酸镁治疗的时候，应严密观察其毒性作用。并控制硫酸镁的入量。中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失。随着血镁浓度升高，还会出现全身肌张力减退及呼吸抑制，尿量 24 小时少于 600ml 或每小时少于 25ml，严重者心跳可突然停止。故本题选 B。

71. (A2 型题) 输卵管妊娠患者前来就诊时，最常见的主诉是

- A. 腹痛
- B. 胸痛
- C. 咳嗽
- D. 咯血
- E. 呼吸急促

71. 答案: A

解析: 腹痛是输卵管妊娠患者就诊最常见的症状，未发生流产或破裂前，常表现为一侧下腹隐痛或酸胀感。发生流产或破裂时，病人突感一侧下腹部撕裂样疼痛，常伴有恶心、呕吐。故本题选 A。

72. (A2 型题) 患者，女性，25 岁。主诉停经 40 天，1 小时前突发右下腹撕裂样疼痛，伴有肛门坠胀感，晕厥 1 次。查体: 血压 90/60mmHg，右下腹反跳痛明

显，移动性浊音(+)，阴道后穹窿饱满，宫颈举痛，后穹窿穿刺抽出暗红色不凝固血液。护理措施不正确的是

- A. 严密监测生命体征
- B. 建立静脉通道，补充血容量
- C. 按急诊手术要求做好术前准备
- D. 按非手术治疗做好生活护理
- E. 做好配血检查

72. 答案：D

解析：输卵管妊娠流产或破裂者，阴道后穹窿饱满。有宫颈抬举痛或摇摆痛，是输卵管妊娠的主要体征之一。且后穹窿穿刺可抽出不凝血。故可知患者发生输卵管妊娠破裂，应立即做好术前准备，严密监测生命体征，建立静脉通道，补充血容量，配血备用。故本题选D。

73. (A2型题) 患者，女性，30岁，因左下腹痛1天就诊。主诉停经52天，阴道不规则出血1周。尿妊娠试验(+)，后穹窿穿刺抽出不凝血4ml，诊断为异位妊娠。该患者最可能的病因是

- A. 盆腔炎
- B. 子宫内膜炎
- C. 阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 输卵管炎

73. 答案：E

解析：患者诊断为异位妊娠，异位妊娠中最常见的是输卵管妊娠，而输卵管炎是引起输卵管妊娠最主要的原因。故本题选E。

74. (A2型题) 患者女，G₂P₁妊娠36周，出现腹痛，阴道流血来诊，诊断为胎盘早剥。此时首要的护理措施是

- A. 做好阴道检查的准备
- B. 细致全面地了解病史
- C. 立即建立静脉通道
- D. 做超声检查的准备

E. 做阴道分娩的准备

74. 答案: E

解析: 该患者并未说出现休克症状, 因此静脉通道可以缓一缓再开通, C 不选。其余选项都不是首要的准备。胎盘早剥是一种妊娠晚期严重危及母儿生命的并发症, 一旦确诊, 应及时终止妊娠, 依孕妇病情轻重、胎儿宫内状况、产程进展、胎产式等具体状态决定分娩方式。该患者胎儿已 36 周, 估计胎肺已成熟, 而该患者出现腹痛、流血症状, 且为经产妇, 应准备顺产准备。

75. (A2 型题) 患者女, 孕 38 周, 突感到剧烈腹痛伴有少量阴道流血。检查: 血压 150/110mmHg, 子宫似足月妊娠大小, 硬如木板、有压痛。胎心 90 次/分, 胎位不清, 最大可能是

- A. 早产
- B. 临产
- C. 前置胎盘
- D. 胎盘早期剥离
- E. 不完全性子宫破裂

75. 答案: D

解析: 本题孕 38 周, 孕周已足月, 排除早产; 孕妇感疼痛剧烈, 子宫硬如木板、有压痛, 可排除前置胎盘(无诱因的无痛性反复阴道流血是前置胎盘的主要症状); 阴道流血不多, 血压略增高, 排除子宫破裂, 应首先考虑胎盘早剥。故本题选 D。

76. (A2 型题) 前置胎盘患者进行产科检查, 错误的是

- A. 胎方位清楚
- B. 先露高浮
- C. 胎心正常
- D. 子宫大小与停经月份一致
- E. 宫颈抬举痛明显

76. 答案: E

解析: 前置胎盘只是胎盘附着位置异常, 在检查时, 其胎方位, 胎心音, 子宫大小均应与正常妊娠一样, 而先露部由于胎盘的影响可以高浮, 但不会出现宫颈抬举痛, 故本题错误的选项是 E。

77. (A2 型题) 对胎膜早破患者的护理措施, 应除外

- A. 立即听胎心并记录破膜时间
- B. 每天会阴护理 2 次
- C. 注意羊水的性状和颜色, 出现胎儿宫内缺氧的表现, 应及时给予吸氧
- D. 超过 12 小时尚未临产, 遵医嘱给予抗生素
- E. 一旦脐带脱垂, 可等待自然分娩

77. 答案: E

解析: 产妇应绝对卧床, 左侧卧位, 注意抬高臀部防止脐带脱垂造成胎儿缺氧或宫内窘迫, 进行阴道检查确定有无隐形脐带脱垂, 如有脐带脱垂, 应在数分钟内结束分娩。故本题选 E。

78. (A2 型题) 某患者, 因“胎膜早破”入院。检查: 头先露, 未入盆, 其余正常, 错误的护理措施是

- A. 绝对卧床休息, 禁灌肠
- B. 休息时取半卧位
- C. 严密观察胎心音
- D. 严密观察流出羊水的性状
- E. 指导孕妇自测胎动

78. 答案: B

解析: 孕妇胎膜早破后应住院、绝对卧床, 避免不必要的肛诊与阴道检查, 防止发生脐带脱垂, 选择抬高臀部, 故 B 选项错误; 胎膜早破者禁止灌肠, A 选项正确; 要严密观察孕妇和胎儿情况, C、D、E 选项均正确。因此, 本题错误的护理措施是 B。

79. (A2 型题) 对妊娠合并心脏病患者, 下列哪项护理是错误的

- A. 每日至少睡眠 10 小时
- B. 给予低盐易消化无刺激饮食
- C. 便秘者给予灌肠
- D. 心功能三级以上者, 记出入液量
- E. 防止受凉

79. 答案: C

解析：有阴道出血、胎膜早破、胎位异常、剖宫产史、胎儿窘迫、重度妊娠高血压综合征、妊娠合并心脏病、宫缩过强及有急产史者，不宜灌肠，因此 C 选项错误。对妊娠合并心脏病患者，要充分休息，防止受凉，给予低盐易消化无刺激饮食；心功能三级以上者，记出入液量。故本题 A、B、D、E 均正确，错误的护理措施是 C。

80. (A2 型题) 患者女，26 岁，宫口开大 4cm 后产程进展缓慢，诊断为协调性子宫收缩乏力，产妇因此烦躁不安，情绪不稳定，对自己自然分娩失去信心，针对此孕妇最主要的护理措施是

- A. 提供心理支持，减轻焦虑
- B. 促进子宫收缩，加快产程
- C. 鼓励孕妇多进食，恢复体力
- D. 做剖宫产准备
- E. 开放静脉

80. 答案：A

解析：对于第一产程出现协调性子宫收缩乏力的患者，要关心和安慰产妇、消除精神紧张与恐惧心理，故 A 正确。必要时对产程时间长产妇过度疲劳或烦躁不安者按医嘱可给镇静剂；使其休息后体力有所恢复，子宫收缩力也得以恢复。本题选 A。

81. (A2 型题) 患者女，第一胎，足月顺产，当胎儿娩出后，即阴道出血约为 500ml，血液呈鲜红色，很快凝成血块，此时胎盘尚未娩出，根据上述情况，考虑出血原因的最大可能是

- A. 宫缩乏力
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘滞留
- D. 胎盘残留
- E. 凝血功能障碍

81. 答案：B

解析：产后出血的原因：①子宫收缩乏力：常发生产程延长、胎盘剥离延缓、阴道流血过多等，出血多为间歇性，暗红，有血凝块；②胎盘因素：胎盘娩出前阴

道多量流血时首先考虑为胎盘因素所致；③软产道裂伤：出血发生在胎儿娩出后，持续不断，血色鲜红能自凝；④凝血功能障碍：多见为子宫大量出血或少量持续不断出血，血液不凝，不易止血。故首先考虑为B。

82. (A2型题) 患者，女，28岁。在家娩出一新生儿，体重4kg，产后6小时出现阴道大量流血，急诊入院。查体：宫缩好，宫底平脐，R23次/分，P92次/分，BP70/50mmHg，首要的护理措施为

- A. 立即建立静脉通路
- B. 迅速按摩子宫
- C. 做好术前准备
- D. 合血、输血
- E. 检查软产道

82. 答案：A

解析：本题中产妇发生了产后出血，由于失血产妇血容量下降，导致血压下降（BP70/50mmHg），此时首要的护理措施是立即建立静脉通路补充血容量、升压，然后再查找出血原因，协助医生迅速止血。因此，本题选A。

83. (A2型题) 某产妇，29岁。G1P0，孕39周。因胎儿畸形分娩时子宫破裂行子宫修补术。该患者术后再次妊娠至少需要

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 2年
- E. 3年

83. 答案：D

解析：子宫破裂行子宫修补术后应注意修养，再次妊娠至少需要2年。再次妊娠子宫破裂的可能性很大，再次怀孕需要谨慎。故本题选D。

84. (A2型题) 患者，女，28岁。因子宫破裂、胎儿死亡，行子宫切除术，术后心理护理哪项不妥

- A. 允许产妇诉说内心感受
- B. 适当时候向产妇解释胎儿死亡原因

- C. 安排与哺乳产妇同住一室
- D. 鼓励家属多陪伴产妇
- E. 观察产妇的情绪变化

84. 答案：C

解析：安排与哺乳产妇同住一室会增加产妇的悲伤心情，因此本题选 C。其余都正确。

85. (A2 型题) 患者女，产后 6 天发热 40℃，恶露多而混浊，有臭味，子宫复旧不佳，有压痛。下述哪项护理不妥

- A. 半卧位
- B. 床边隔离
- C. 物理降温
- D. 抗炎治疗
- E. 坐浴 1~2 次/天

85. 答案：E

解析：该产妇的症状和体征提示发生产褥感染。因此相应护理措施有：半卧位、床边隔离、物理降温、抗炎治疗等。但是产褥感染者禁止坐浴，因此 E 错误。故本题 A、B、C、D 均正确，答案是 E。

86. (A2 型题) 患者女，会阴左切开术分娩，产后第 4 天，伤口红肿、疼痛、流脓。错误的处理是

- A. 嘱右侧卧
- B. 拆线引流
- C. 会阴擦洗
- D. 坐浴
- E. 红外线照射

86. 答案：D

解析：产后 10 天内子宫颈口尚未关闭，此时不宜坐浴，故选项 D 错误；患者取伤口对侧卧位有利于切口愈合；伤口红肿、疼痛、流脓时应拆线引流；会阴擦洗防感染；红外线照射利于伤口愈合。故 A、B、C、E 均正确，本题答案为 D。

87. (A2 型题) 患者女, 30 岁。分娩后 2 周发生阴道大量出血入院, 护士对患者进行健康评估时, 与病情最不相关的是

- A. 了解患者的分娩史
- B. 评估患者的血压、脉搏、呼吸、神志情况
- C. 观察患者阴道出血量
- D. 了解宫底的大小及有无压痛
- E. 母乳喂养情况

87. 答案: E

解析: 患者为晚期产后出血, 护士评估的内容应包括患者的分娩史、生命体征、阴道的出血量以及子宫复旧的情况、有无压痛。故本题选 E。

88. (A3 型题)

王女士, 25 岁, 孕 39⁺² 周, G₁P₀, 腹部阵痛 6 小时入院。产科检查: 骨盆外测量正常范围, 宫高 32cm, 腹围 96cm, 胎方位 LOA, 宫缩 30~40 秒/3~4 分钟, 胎心率 142 次/分, 肛查宫口开大 4cm, 前羊膜囊膨隆。B 超检查 BPD9.1cm, 羊水指数 12.5cm, 胎盘成熟度 III 级。

该产妇处于

- A. 假临产
- B. 第一产程潜伏期
- C. 第一产程活跃期
- D. 第二产程
- E. 临产先兆

88. 答案: C

解析: 第一产程又称宫颈扩张期, 初产妇约需 11~12 小时, 经产妇约需 6~8 小时。潜伏期是指从出现规律宫缩开始至宫口扩张 3cm, 约需 8 小时。活跃期是指宫口扩张 3cm 到开全, 约需 4 小时。故本题选 C。

89. (A3 型题)

王女士, 25 岁, 孕 39⁺² 周, G₁P₀, 腹部阵痛 6 小时入院。产科检查: 骨盆外测量正常范围, 宫高 32cm, 腹围 96cm, 胎方

位 LOA，宫缩 30~40 秒/3~4 分钟，胎心率 142 次/分，肛查宫口开大 4cm，前羊膜囊膨隆。B 超检查 BPD9.1cm，羊水指数 12.5cm，胎盘成熟度 III 级。

针对该患者的处理措施，下列哪项不正确

- A. 给予人工破膜
- B. 鼓励产妇在宫缩间歇期少量多次进食
- C. 严密观察产程进展，绘制产程图
- D. 监测胎心变化
- E. 静脉注射缩宫素

89. 答案：E

解析：缩宫素是维持和增强子宫收缩、促进分娩完成的主要激素，具有兴奋子宫平滑肌的作用。故可以静滴缩宫素，不可静脉注射。故本题选 E。

90. (A3 型题)

患者女，第 1 孕，妊娠 40 周，初产妇。临产 6 小时，宫口开大 3cm；临产 11 小时，宫口开全，先露：头，先露“0”，胎心正常。

此时，产程属于

- A. 产程正常
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 活跃期停滞
- E. 第二产程延长

90. 答案：A

解析：第一产程从开始出现间歇 5~6 分钟的规律宫缩到宫口开全，初产妇约需 11~12 小时；潜伏期是指临床后规律宫缩开始到宫口扩张 3cm，需 8 小时，超过 16 小时为潜伏期延长；活跃期是指宫口扩张 3cm 到宫口开全，需 4 小时，超过 8 小时为活跃期延长。该产妇临产 6 小时，宫口开大 3cm，潜伏期时限正常；临产 11 小时，宫口开全，第一产程时限也正常。故本题选 A。

91. (A3 型题)

患者女，第 1 孕，妊娠 40 周，初产妇。临产 6 小时，宫口开大 3cm；临产 11 小时，宫口开全，先露：头，先露“0”，胎心正常。

宫口开全已 2 小时，产妇仍在屏气用力，此时，产程属于

- A. 正常
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 活跃期停滞
- E. 第二产程延长

91. 答案：E

解析：第二产程从宫口开全到胎儿娩出，初产妇约需 1~2 小时；若第二产程超过 2 小时为第二产程延长。故答案为 E。

92. (A3 型题)

产妇，32 岁，妊娠 38 周，于某日 2: 30pm 顺产。6: 40pm 病人主诉腹胀、腹痛。

视诊：下腹膀胱区隆起；叩诊：耻骨联合上鼓音。

护士判断该产妇存在的健康问题是

- A. 分娩后疼痛
- B. 体液过多
- C. 尿路感染
- D. 尿潴留
- E. 产褥热

92. 答案：D

解析：产后 2~3 天产妇往往多尿，并且容易排尿困难，特别是产后第一次小便，容易发生尿潴留和尿路感染，产妇膀胱区隆起，叩诊鼓音，说明产妇发生尿潴留。

故本题选 D。

93. (A3 型题)

患者，女，30 岁，孕 12 周。下腹阵发性疼痛，阴道排出一大块肉样组织，仍有阴道大量出血，呈贫血貌。妇科检查：宫口已开，有组织堵塞宫口，子宫较孕周小。

其诊断首先考虑可能为

- A. 稽留流产
- B. 先兆流产

- C. 不全流产
- D. 难免流产
- E. 感染性流产

93. 答案: C

解析: 不全流产指妊娠产物已部分排出体外, 尚有部分残留于宫腔内, 由难免流产发展而来。由于宫腔内残留部分妊娠产物, 影响子宫收缩, 致使子宫出血持续不止, 甚至因流血过多而发生失血性休克。妇科检查宫颈口已扩张, 不断有血液自宫颈口内流出, 有时尚可见胎盘组织堵塞于宫颈口或部分妊娠产物已排出于阴道内, 而部分仍留在宫腔内。一般子宫小于停经周数。可见, 本题选 C。

94. (A3 型题)

患者, 女, 30 岁, 孕 12 周。下腹阵发性疼痛, 阴道排出一大块肉样组织, 仍有阴道大量出血, 呈贫血貌。妇科检查: 宫口已开, 有组织堵塞宫口, 子宫较孕周小。

下列护理措施正确的是

- A. 取头高脚低位
- B. 通知医生来后再进行抢救
- C. 需要输血者让病人家属去取血
- D. 将术中刮出物送病理检查
- E. 术后认真测量血压、脉搏、呼吸

94. 答案: D

解析: 不全流产酌情尽快清除宫腔内残留组织并送检, 大量流血时, 应在输血、输液的同时, 迅速行钳刮术; 若流产时间长, 出血不多者, 应先抗感染, 然后再予以清宫。可见, 本题选 D。

95. (A3 型题)

患者, 30 岁, 已婚 4 年未孕。因停经 10 周, 阴道少量出血来院就诊。查体: 体温 37.1℃, 脉搏 88 次/分, 血压 125/85mmHg。宫颈口未开, 胎膜未破, 子宫 70 天妊娠大小, 软。尿妊娠试验阳性。

该患者可能发生的问题是

- A. 先兆流产

- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 习惯性流产
- E. 宫外孕

95. 答案: A

解析: 先兆临产表现为停经后先出现少量阴道流血, 有时伴轻微下腹痛、腰痛。妇科检查: 子宫大小与停经周数相符, 宫颈口未开, 胎膜未破, 妊娠产物未排出。

故本题选 A。

96. (A3 型题)

患者, 30 岁, 已婚 4 年未孕。因停经 10 周, 阴道少量出血来院就诊。查体: 体温 37.1℃, 脉搏 88 次/分, 血压 125/85mmHg。宫颈口未开, 胎膜未破, 子宫 70 天妊娠大小, 软。尿妊娠试验阳性。

以下哪项检查对明确诊断意义最大

- A. 超声检查
- B. 基础体温测定
- C. 尿 HCG 检查
- D. 胎心监测
- E. OST 试验

96. 答案: A

解析: B 超可以显示有无胎囊、胎动、胎心等, 从而可以诊断并鉴别流产及其类型, 指导正确处理。故本题选 A。

97. (A3 型题)

患者, 30 岁, 已婚 4 年未孕。因停经 10 周, 阴道少量出血来院就诊。查体: 体温 37.1℃, 脉搏 88 次/分, 血压 125/85mmHg。宫颈口未开, 胎膜未破, 子宫 70 天妊娠大小, 软。尿妊娠试验阳性。

以下措施, 不正确的是

- A. 嘱孕妇尽量卧床休息, 禁止性生活
- B. 嘱孕妇保持心情愉快, 减少刺激
- C. 遵医嘱补充黄体酮

- D. 尽早终止妊娠
- E. 遵医嘱给予镇静剂、孕激素

97. 答案: D

解析: 先兆流产的处理原则是: 卧床休息, 禁止性生活; 减少刺激, 必要时给予对胎儿危害小的镇定剂; 对于黄体功能不足的孕妇, 按医嘱每日肌注黄体酮 20mg, 以利于保胎; 并注意及时进行超声检查, 了解胚胎发育情况, 避免盲目保胎。故本题选 D。

98. (A3 型题)

孕妇, 29 岁, 停经 33 周, 腰酸、腹部疼痛伴下坠感。观察子宫有不规则收缩, 无阴道流水, 胎位 ROA、胎心 146 次/分。

以下护理评估不正确的是

- A. 考虑胎膜早破是本次的高危因素
- B. 考虑子宫畸形是本次的高危因素
- C. 详细询问既往有否流产、早产史
- D. 进一步核实孕周, 评估羊水成熟度
- E. 查胎儿纤维连接蛋白, 评估胎儿成熟度

98. 答案: A

解析: 患者出现不规则阴道收缩, 考虑有早产可能。又该患者无阴道流水, 说明没有发生胎膜早破, 故胎膜早破不是孕妇早产的高危因素。故本题选 A。

99. (A3 型题)

患者, 女, 38 岁, 妊娠 36 周, 近两天自觉头痛、头晕、胸闷、视物不清来院就诊。查体: 体温 36.5℃, 脉搏 95 次/分, 血压 180/120mmHg, 子宫大小与孕周相符, 胎心 150 次/分, 枕左前位, 水肿(+), 无宫缩, 未见红, 未破膜。24 小时尿蛋白定量为 6g。该孕妇一个月前血压为 105/85mmHg。

该孕妇发生的问题是

- A. 子痫前期重度
- B. 妊娠期高血压
- C. 子痫前期轻度
- D. 高血压脑病

E. 子痫

99. 答案：A

解析：重度子痫前期：BP \geq 160/110mmHg；尿蛋白 \geq 2.0g/24h 或随机尿蛋白 \geq (++)；血清肌酐 $>$ 106 μ mol/L，持续性头痛或其他脑神经或视觉障碍；持续性上腹不适。故本题选 A。

100. (A3 型题)

患者，女，38 岁，妊娠 36 周，近两天自觉头痛、头晕、胸闷、视物不清来院就诊。查体：体温 36.5℃，脉搏 95 次/分，血压 180/120mmHg，子宫大小与孕周相符，胎心 150 次/分，枕左前位，水肿(+)，无宫缩，未见红，未破膜。24 小时尿蛋白定量为 6g。该孕妇一个月前血压为 105/85mmHg。

此时的处理措施，以下哪项不正确

- A. 遵医嘱给予地西洋
- B. 遵医嘱给予硫酸镁解除血管痉挛
- C. 应用降压药
- D. 适时终止妊娠
- E. 加强孕期保健，每周产前检查一次

100. 答案：E

解析：重度子痫前期患者需及时住院治疗，给予解痉、降压、镇静等，以防止发生子痫和并发症。故本题选 E。

(二)

1. (A1 型题) 有关“护理程序”概念的解释哪项不妥

- A. 是指导护士工作及解决问题的工作方法
- B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
- C. 是以系统论为理论框架
- D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
- E. 是由评估、诊断、计划、实施四个步骤组成

1. 答案：E

解析：护理程序是以促进和恢复病人的健康为目标所进行的一系列有目的、有计划的护理活动，是一个综合的、动态的、具有决策和反馈功能的过程，对护理对

象进行主动、全面的护理，使其达到最佳健康状态。系统论组成了护理程序的框架。护理程序一般可分为五个步骤，即评估、诊断、计划、实施和评价。故本题 E 选项错误。

2. (A1 型题) 护理诊断指出护理方向，有利于

- A. 收集客观资料
- B. 制定护理措施
- C. 实施护理措施
- D. 进行护理评估
- E. 修改护理计划

2. 答案：B

解析：护理诊断是关于个人、家庭或社区对现存的或潜在的健康问题或生命过程反应的一种临床判断，是护士为达到预期目标（预期结果）选择护理措施的基础，而预期目标（预期结果）是由护士负责制订的。护理诊断有利于进一步护理措施的制订，只有制订了护理措施，才可以进一步实施护理措施。故本题答案为 B。

3. (A1 型题) 属于护理程序“计划”阶段内容的是

- A. 分析资料
- B. 提出护理诊断
- C. 确定护理目标
- D. 实施护理措施
- E. 评价患者反应

3. 答案：C

解析：制定护理计划是如何解决护理问题的一个决策过程，其目的是为了确认护理对象的护理重点目标以及护士将要实施的护理措施。故本题选项中属于计划阶段的内容是 C。

4. (A1 型题) 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是

- A. 体格检查
- B. 交谈和观察
- C. 心理社会测试
- D. 阅读相关资料

E. 使用疼痛评估工具

4. 答案：B

解析：A 项：是对患者进行身体状况评估的方法。B 项：是临床上评估患者心理社会状况的主要方法。C 项、D 项：心理社会评估可采用的方法。E 项：评估患者舒适程度的方法。故本题答案为 B。

5. (A1 型题) 属于主观方面的健康资料是

A. 血压 130/100mmHg

B. 头昏脑涨

C. 骶尾部皮肤破损 1cm×2cm

D. 膝关节红肿、压痛

E. 肌张力三级

5. 答案：B

解析：主观资料是指病人的主诉，包括病人所感觉的、所经历的以及看到的、听到的、想到的内容的描述，是通过与病人及有关人员交谈获得的资料，也包括亲属的代诉。客观资料是指护士经观察、体检、借助其他仪器检查或实验室检查等所获得的病人的健康资料。头昏脑涨是患者的感觉，不是体检结果，属于主观资料。故本题选 B。

6. (A2 型题) 健康评估时，患者的资料不应来自

A. 患者自述

B. 配偶介绍

C. 病历记录

D. 护士的主观想象

E. 其他医务人员

6. 答案：D

解析：患者资料最主要的来源是患者本人，其次是家庭成员、医务人员、健康记录或病例，资料包括患者主观资料，及病人所感觉的、所经历的以及看到的、听到的、想到的内容的描述，但不能包括其他人对该患者的主观想象，故本题选 D。

7. (A2 型题) 不属于患者心理社会状况的资料是。

A. 应激水平与应对能力

- B. 自理能力
- C. 患者的工作学习情况
- D. 患者的经济状况
- E. 患者对医护人员的期望

7. 答案：B

解析：患者就业状态、角色问题、社交状况、面对压力的应对能力及耐受形态都属于社会状况的资料，患者的自理能力不属于社会状况的资料，故本题选 B。

8. (A2 型题) 患者，男性，41 岁，颅脑外伤。主诉：剧烈头痛、头昏、视物不清。查体：呼吸 10 次/分，心搏有力、50 次/分，血压 160/120mmHg。护士收集资料后为其制定护理计划。计划中应优先解决的健康问题是

- A. 皮肤完整性受损
- B. 潜在并发症：脑疝
- C. 潜在并发症：呼吸性碱中毒
- D. 有感染的危险
- E. 睡眠形态改变

8. 答案：B

解析：应优先解决对患者生命威胁最大的护理问题，患者血压 160/120mmHg，应首先警惕脑疝的发生，故本题选 B。

9. (A1 型题) 下列不属于主观资料的是

- A. 头痛、头晕
- B. 咽部充血、体温 38.1
- C. 脸色潮红、全身不适
- D. 咽部干燥、流涕
- E. 呼吸急促、发冷

9. 答案：B

解析：主观资料即病人的主诉，包括病人所感觉的、所经历的以及看到的、听到的、想到的内容的描述，是通过与病人及有关人员交谈获得的资料，客观资料是经观察、体检、借助其他仪器检查或实验室检查等所获得的病人的健康资料，B 选项中，体温 38.1 为借助体温计所得出的结果，属于客观资料，故本题选 B。

10. (A1 型题) 护理职业最常见的职业损伤因素是

- A. 锐器伤
- B. 放射性损伤
- C. 温度性损伤
- D. 噪声
- E. 工作压力

10. 答案: A

解析: 锐器伤是最常见的职业损伤因素之一, 相对于其他的选项发生率最高。故本题选 A。

11. (A1 型题) 化疗药物外漏时的处理要求不正确的是

- A. 眼睛被污染时, 应立即用清水或生理盐水反复冲洗
- B. 若是药粉, 则用湿纱布轻轻抹擦
- C. 药液溢洒在桌面或地面上, 应用吸水毛巾或纱布吸附
- D. 药液溅到工作服或口罩上, 应立即更换
- E. 药液溅到皮肤上, 应立即用 2% 碘伏擦拭污染部位的皮肤

11. 答案: E

解析: 在配制、使用化疗药物和处理污染物的过程中, 药液溅到皮肤上, 应立即用肥皂水和清水清洗污染部位的皮肤。故本题选 E。

12. (A1 型题) 不符合铺床节力原则的是

- A. 备齐用物, 按序放置
- B. 身体靠近床沿
- C. 上身前倾, 两膝直立
- D. 下肢稍分开, 保持稳定
- E. 使用肘部力量, 动作轻柔

12. 答案: C

解析: 铺床时首先要备齐用物, 并按次序放置, 避免多次走动, 既提高工作效率又能节省体力。故 A 正确。护士站在床头一侧, 身体靠近床沿减少来回走动, 省力。故 B 正确。在铺床时要正确利用力学原理, 使用肘部力量, 双脚分开, 两膝稍弯曲, 并确保身体平衡。所以 D、E 选项均符合省力原则。故本题选 C。

13. (A1 型题) 门诊发现肝炎病人, 护士应立即

- A. 安排提前就诊
- B. 转急诊治疗
- C. 转隔离门诊治疗
- D. 给予卫生指导
- E. 问清病史

13. 答案: C

解析: 门诊处应做到严格的消毒隔离, 传染病或疑似传染病病人, 应分诊到隔离门诊就诊, 并立即上报主管部门, 做好疫情报告工作。肝炎病人属传染病病人, 故本题选 C。

14. (A1 型题) 抢救时间记录不包括

- A. 患者到达的时间
- B. 医生到达的时间
- C. 抢救措施落实的时间
- D. 病情变化的时间
- E. 家属到达的时间

14. 答案: E

解析: 做好抢救记录时要记录病人和医生到达时间, 抢救措施落实时间, 医嘱内容和病人病情变化。记录应及时、准确、字迹清晰。

15. (A1 型题) 下列不属于门诊健康教育形式的是

- A. 板报
- B. 讲座
- C. 录像
- D. 发放宣传册
- E. 健康体检

15. 答案: E

解析: 健康教育是向人们用口头或书面或影视来宣传普及健康相关的知识, 门诊健康教育形式不包括体检。答案选 E。

16. (A1 型题) 为达到置换病室内空气的目的, 一般每次通风的时间是

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 60 分钟
- E. 90 分钟

16. 答案: C

解析: 一般是 30 分钟便可达到置换空气的目的。答案选 C。

17. (A2 型题) 患者, 女, 25 岁, 胃部不适来门诊, 护士对此患者首先应进行
- A. 健康教育
 - B. 卫生指导
 - C. 预检分诊
 - D. 查阅病案
 - E. 心理安慰

17. 答案: C

解析: 患者胃部不适首先要进行预检分诊, 让患者尽快得到治疗, 减轻不适感, 当患者得到治疗减轻痛苦之后再行健康教育、卫生指导、心理安慰等等。因此答案选 C。

18. (A1 型题) 急救物品的合格率应保持在

- A. 90%以
- B. 95%以上
- C. 97%以上
- D. 99%以上
- E. 100%

18. 答案: E

解析: 急救物品完好率应达到 100%, 抢救生命不允许差错, 因此答案选 E。

19. (A2 型题) 患者, 男, 48 岁。脑外伤, 在全麻下行颅内探查术。术后的床单位应是

- A. 麻醉床, 床中部和床上部各铺一橡胶单、中单
- B. 暂空床, 床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

- C. 暂空床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单
- D. 麻醉床，床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单
- E. 备用床，床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

19. 答案：A

解析：术后的床单位为麻醉床，排除 B、C、E 选项。准备麻醉床时应根据患者手术部位分别在床头、床中或床尾部铺橡胶单、中单，避免术后渗出污染床单位，一般头、颈、胸、上腹部手术后在床的上、中部铺单，下腹部、会阴部、下肢手术在床的中、下部铺单，此患者头部手术应铺中上部，因此选 A。

20. (A2 型题) 患者男，自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹痛剧烈。门诊护士应采取的措施是

- A. 安排患者提前就诊
- B. 让患者就地平卧休息
- C. 为患者测量脉搏、血压
- D. 安慰病人，仔细观察
- E. 让医生加快诊治速度

20. 答案：A

解析：门诊护士安排候诊和就诊时，要随时观察候诊病人病情，遇到高热、剧痛、呼吸困难、出血、休克等病人，应立即安排提前就诊或送急诊室处理。因此根据李先生病情，本题选 A。

21. (A2 型题) 患者，女性，22 岁，新入院患者。护士为其准备床位的原则是

- A. 将其安排在观察室
- B. 由分管医师安排床位
- C. 根据病情需要选择床位
- D. 将其安排在监护室
- E. 按患者意愿安排床位

21. 答案：C

解析：新入院患者应根据病情需要安排床单位，这样可以快速的对病情变化做出应对措施，例如危重患者应安排在有抢救设备的单间或离手术室近处，病情较轻者可离手术室稍远。因此答案选 C。

22. (A2 型题) 患者, 男性, 50 岁, 肺炎球菌肺炎。上午在护士陪送下前往放射科拍摄 X 线胸片, 其病床应铺成

- A. 备用床
- B. 暂空床
- C. 麻醉床
- D. 盖被扇形折叠置于床的一侧
- E. 盖折叠成被筒, 平铺于床上

22. 答案: B

解析: 暂空床的目的是: 保持病室整洁; 迎接新病人; 供暂时离床的人使用。铺法是在备用床的基础上将床头盖被向内反折四分之一, 再扇形三折于床尾。因此答案选 B。

23. (A2 型题) 患者, 男性, 65 岁, 因呼吸困难, 行气管切开术, 呼吸机辅助呼吸。对该患者病室环境的管理特别应注意

- A. 适宜的温、湿度
- B. 不摆设鲜花
- C. 加强通风
- D. 光线适宜
- E. 减少陪护, 防止感染

23. 答案: A

解析: 气管切开者气管黏膜水分蒸发快, 因此要求适宜的温、湿度来保护气管黏膜的湿润。答案选 A。

24. (A2 型题) 患者男, 因右下肢开放性骨折于 9am 进入手术室, 病区护士为其准备麻醉床, 以下操作不符合要求的是

- A. 更换清洁被单
- B. 床头和床中部各铺中单及橡胶单
- C. 盖被纵向三折于门对侧床边
- D. 枕横立于床头开口背对门
- E. 椅子放于折叠被的同侧

24. 答案: B

解析：病人是下肢受伤，因此橡胶单和中单应铺在床中部和尾部，因此 B 项错误。

25. (A2 型题) 患者，男，24 岁，诊断为“大叶性肺炎”入院。目前病室的湿度为 30%，这种环境可能使患者出现以下哪种情况

- A. 寒冷不适
- B. 闷热难受，肾脏负担加重
- C. 疲惫、焦躁、头痛、耳鸣
- D. 失眠、血压升高
- E. 口干舌燥、咽痛、烦渴

25. 答案：E

解析：病室的湿度以 50%~60% 为宜，目前的湿度过低，可导致空气干燥，水分大量蒸发，可致口干舌燥、烦渴等。因此答案选 E。

26. (A2 型题) 患者，男，20 岁，有机磷中毒后在急诊室留观。护士对此患者的护理工作内容中，下列哪项不包括在内

- A. 住院登记
- B. 建立病历
- C. 及时处理医嘱
- D. 观察病情
- E. 预防接种

26. 答案：E

解析：有机磷中毒患者不需要进行预防接种，答案选 E。

27. (A2 型题) 患者，女，34 岁，下楼梯时不慎致胫骨骨折入院，现进行胫骨牵引。护士为其整理床单位时，以下哪项措施是错误的

- A. 协助患者翻身侧卧，面向护士
- B. 操作过程中注意观察患者的情况
- C. 取下枕头，更换枕套拍松后放回患者头下
- D. 减少过多的暴露患者
- E. 必要时使用床档

27. 答案：A

解析：行牵引患者不可随意搬动病人，防止牵引松动。因此答案选 A。

28. (A1 型题) 医院分级护理级别划分的依据是

- A. 病情
- B. 病种
- C. 年龄
- D. 性别
- E. 自理能力

28. 答案: A

解析: 分级护理是根据对病人病情的轻重缓急及自理能力的评估结果, 给予不同级别的护理。故本题选 A。

29. (A1 型题) 住院处为病人办理入院手续最主要的依据是

- A. 单位介绍信
- B. 门诊病历
- C. 医院特约检查单
- D. 以往住院的病历
- E. 医生签发的住院证

29. 答案: E

解析: 急诊或门诊医师经初步诊断, 确定病人需要住院时, 由医师签发住院证, 病人或家属持住院证到住院处办理住院手续。ABCD 均与题目无关, 排除之。故本题选 E。

30. (A1 型题) 急性心肌梗死病人急需住院治疗, 住院处护运人员首先应

- A. 办理入院手续卫生处置
- B. 进行护理诊断
- C. 介绍医院规章制度
- D. 氧气吸入, 立即用平车送病人入病区
- E. 留尿便标本进行检验

30. 答案: D

解析: 入院护理一般程序为由护理人员指导办理入院手续卫生处置, 进行护理诊断, 介绍医院规章制度, 必要时留尿便标本进行检验。但是急诊或者危重症患者可直接采取急救处理措施。故本题答案为 D。

31. (A1 型题) 住院处护士送病人入病区时其病人的物品应与

- A. 门诊值班医生交接
- B. 门诊护士长交接
- C. 病区值班医生交接
- D. 病区护士长交接
- E. 病区值班护士交接

31. 答案: E

解析: 住院处收到门诊医生签发的住院证后, 办理入院手续, 由住院处护士送病人入病区, 并与病区的值班护士做好交接(物品)工作。故本题答案为 E。其余选项均不符合。

32. (A2 型题) 对于结核病患者入院时换下的衣物, 正确的处理是

- A. 直接焚烧
- B. 直接存入患者储物柜
- C. 消毒后存放
- D. 直接交给患者家属
- E. 消毒后交给患者

32. 答案: C

解析: 结核病属于传染病, 因此结核病患者入院必须将其衣物进行消毒然后存放。因此答案选 C。

33. (A2 型题) 门诊护士甲接诊到下列患者, 首先应安排入院的是

- A. 急性胃肠炎
- B. 肾绞痛
- C. 急性肾炎
- D. 严重颅脑损伤
- E. 晚期胃癌

33. 答案: D

解析: 门诊护士在接待患者时应按病情轻重缓急来进行安排, 严重颅脑损伤病情严重, 需要立即救治, 应安排提前就诊并做好入院准备。因此答案选 D。

34. (A1 型题) 以下关于出院护理说法错误的是

- A. 协助患者尽快适应原生活和工作
- B. 指导患者办理出院手续
- C. 自动出院者无需告知可自行离院
- D. 停止一切医嘱
- E. 整理病案

34. 答案: C

解析: 自动出院的病人应在出院医嘱上注明“自动出院”, 并要求病人或家属签名认可。因此答案选 C。

35. (A2 型题) 急性心肌梗死患者需住院治疗, 住院处护理人员首先应

- A. 测量生命体征和体重
- B. 介绍病区环境、作息时间及有关规章制度
- C. 填写有关表格
- D. 氧气吸入, 立即用平车送患者入病区
- E. 建立静脉通道, 留血标本送检

35. 答案: D

解析: 急性心肌梗死患者病情紧急, 在接到病人后应立即吸氧用平车推入病区, 准备好急救物品做好抢救准备, E 选项在抢救患者过程中可进行操作, 待患者抢救过来之后再行 ABC 几项步骤的进行。因此答案选 D。

36. (A1 型题) 处理出院病人医疗护理文件的方法, 错误的是

- A. 整理病历交病案室保存
- B. 出院病历的最后一页是体温单
- C. 诊断卡、治疗卡夹入病历内
- D. 注销床头卡、饮食卡
- E. 填写病人出院登记本

36. 答案: C

解析: 出院后病历排列顺序: 住院病历首页、出院记录、入院记录、病史和体格检查单、病程记录、各种检查检验报告单、护理记录单、医嘱单、长期医嘱执行单、体温单。B 正确。整理病历交档案室保存, A 正确; 填写出院病人登记本和

出院护理记录，E 正确；注销床头卡、饮食卡，D 正确；诊断卡、治疗卡应与床头卡、饮食卡一起注销。因此答案选 C。

37. (A2 型题) 一人搬运患者时，平车与床的位置是

- A. 平行紧靠
- B. 平车头端与床头成锐角
- C. 平车头端与床尾成锐角
- D. 平车头端与床头成钝角
- E. 平车头端与床尾成钝角

37. 答案：E

解析：一人搬运适用于体重较轻或儿科病人，且病情允许的病人。平车头端与床尾呈钝角，便于护士抱起病人后移步转身便可将病人放至平车上。因此答案选 E。

38. (A2 型题) 用平车运送患者时，做法不正确的是

- A. 冬季注意为患者保暖
- B. 上、下坡时告知患者
- C. 下坡时使患者头在低处一端
- D. 注意观察患者生命体征
- E. 保持行车平稳，维持治疗

38. 答案：C

解析：平车上下坡时，病人的头部应在高处，以防止病人引起不适。因此 C 项错误，答案选 C。

39. (A2 型题) 患者，男，46 岁，因发热待查住院，护士为其准备床单应

- A. 按其要求准备床位
- B. 根据病情准备
- C. 将其安排在危重病房
- D. 将其安排在隔离病室
- E. 将其安排在办公室旁

39. 答案：B

解析：在接受新入院患者时，要根据新入院患者的病情准备。A、C、D、E 选项都是需要确定病情后才能安排，都属于根据病情准备。故选项 B 是最佳答案。

40. (A2 型题) 患者, 男, 55 岁, 胃癌大部切除术后 24 小时, 护理等级为

- A. 三级护理
- B. 二级护理
- C. 一级护理
- D. 特别护理
- E. 监护护理

40. 答案: C

解析: 一级护理的病情依据是: 各种大手术后需严格卧床休息的患者及病情趋于稳定的重症患者, 所以选项 C 是正确的。

41. (A2 型题) 患者因外伤疑为腰椎骨折, 需用平车送放射科检查, 搬运时宜用

- A. 挪动法
- B. 一人搬运法
- C. 二人搬运法
- D. 三人搬运法
- E. 四人搬运法

41. 答案: E

解析: 单人搬运法适用于患儿及病情许可, 体重较轻者; 二人、三人搬运法用于不能自己活动、体重较重者; 四人搬运法用于危重或颈椎、腰椎骨折病人。因为患者属于腰椎骨折的患者, 所以 E 正确。

42. (A2 型题) 患者男, 45 岁。刚出院, 对病床单位的处理下列哪项不妥

- A. 撤下被服送洗
- B. 床垫、棉被置于日光下曝晒 6 小时
- C. 痰杯、便盆浸泡于消毒液中
- D. 病床位用消毒液擦拭
- E. 立即铺好暂空床

42. 答案: E

解析: 病人出院后, 要整理床单位, 撤下被服, 放入污物袋, 并根据病情决定清洗消毒方法, 非一次性使用的痰杯、便盆需要用消毒液浸泡, 床旁桌椅要用消毒液擦拭, 床垫、床褥、棉胎等放在日光下暴晒或是紫外线消毒, 之后病室要开窗

通风。此后铺好备用床，迎接新病人。A、B、C、D均是病人出院后的处理内容，只有E中铺暂空床不对，所以答案是E。

43. (A2型题) 患者，女，53岁，因哮喘急性发作，急诊护士在入院初步护理中，下列哪项不妥

- A. 护士自我介绍，消除陌生感
- B. 立即给患者氧气吸入
- C. 安慰患者，减轻焦虑
- D. 详细介绍环境及规章制度
- E. 通知医生，给予诊治

43. 答案：D

解析：病人哮喘急性发作入院后，急诊护士首先立即给予氧气吸入，缓解缺氧状态，通知医生诊治，向在患者自我介绍的同时，要安慰患者，减轻病人紧张焦虑的情绪。A、B、C、E做法正确。详细介绍环境及规章制度是一般病人入院后的初步护理内容，在急诊中不妥，故D选项不妥，所以选D。

44. (A2型题) 年轻男性患者因车祸昏迷送来急诊。初步诊断颅骨骨折，骨盆骨折。医嘱开放静脉通道，急行X线检查。护士护送患者时，不妥的做法是

- A. 选用平车运送
- B. 护士站在患者头侧
- C. 护送时注意保暖
- D. 检查时护士暂时离开照像室
- E. 运送期间暂时停止输液

44. 答案：E

解析：骨折患者需采用平车运送，故A选项正确；护士需站在患者头侧，以便于观察病情，因此B正确；CD两项均正确；运送期间不能停止输液吸氧等重要的治疗，因此E选项错误，答案选E。

45. (A2型题) 患者，男性，39岁，因农药中毒急诊入院。用平车护送患者入病区时，对静脉输液管、吸氧管采取的处理措施是

- A. 暂时拔除导管
- B. 加固导管，继续治疗，维持导管通畅

- C. 加固导管，途中暂停吸氧、输液
- D. 维持输液通畅，暂时拔除吸氧管
- E. 保证吸氧，保留输液管，暂停输液治疗

45. 答案：B

解析：病人在运送途中不可停止重要的治疗如输液、吸氧等，病人的导管及引流管也不能拔出，并且要妥善固定保持通畅。因此，正确答案选B。

46. (A2型题) 患者，男性，55岁，脑出血溶栓治疗，病情危重，需要随时观察，以便进行抢救。护士观察患者病情及生命体征的周期合适的是

- A. 24小时专人护理
- B. 每1小时巡视1次
- C. 每2小时巡视1次
- D. 每日巡视6次
- E. 每日巡视4次

46. 答案：A

解析：患者病情危重，随时可能发生病情变化需要进行抢救，因此需要进行特级护理，派人24小时专人护理。因此答案选A。

47. (A1型题) 患儿，11岁，放羊时从山上跌下。入院时发现头虱，则入院卫生处

- A. 床上洗发
- B. 剃发、淋浴
- C. 乙醇拭发
- D. 清洁伤口周围的皮肤
- E. 用百部酊灭虱、灭虬

47. 答案：E

解析：住院处负责根据病人的病情和身体状况进行卫生处置，对有虱、虬者，先行灭虱处理，再进行卫生处理。因此答案选E。

48. (A2型题) 患者，女，48岁，因冠心病在内科治疗数周，病情基本稳定，近日因丈夫骨折需要照顾而要求出院，患者写下字据后，医生开了出院医嘱，这种出院方式为

- A. 同意出院
- B. 自动出院
- C. 被动出院
- D. 被迫出院
- E. 转院

48. 答案: B

解析: 患者自行要求出院, 属于自动出院, 故选 B。

49. (A2 型题) 患者, 男, 75 岁。诊断为“慢性肺心病”入院, 经积极治疗后, 患者康复出院, 下列哪项不属于出院时护士应做的工作

- A. 注销一切医嘱
- B. 填写出院通知单
- C. 撤去床头(尾)卡
- D. 填写出院患者登记本
- E. 指导患者用药常识

49. 答案: A

解析: 医嘱单不能注销, 需要存放在病历里面以供查阅。因此 A 选项错误。可以注销的为饮食卡、治疗卡等卡片。答案选 A。

50. (A2 型题) 患者, 男, 54 岁, 诊断为“慢性肾炎”入院, 下列哪项不属于护士在对其进行入院介绍和指导的内容

- A. 病区环境
- B. 病区规章制度
- C. 作息时间
- D. 床单位及设备使用方法
- E. 常规标本的留取和送检方法

50. 答案: E

解析: 常规标本的留取方法在患者需要留取的时候再做介绍, 而送检一般都是由医护人员拿去送检, 以免发生差错。因此答案选 E。

51. (A2 型题) 患者, 女性, 56 岁, 患风湿性心脏病、慢性心力衰竭。护士为患者准备的床位是

- A. 将其安排在观察室
- B. 按患者个人意愿选择病室
- C. 安排在离办公室较近的小病室
- D. 安排在患者多的病室，以便及早发现病情变化
- E. 将其安排在监护室

51. 答案：C

解析：风湿性心脏病患者不能处在人多拥挤的地方，病情极易多变，一旦发病病情十分紧急。因此需要安排在离医生办公室近的地方，方便进行及时抢救。因此答案选 C。

52. (A2 型题) 患者，男，52 岁，诊断为“心力衰竭，心功能 IV 级”入院，住院处的护士在处理此患者时首先应

- A. 进行卫生处置
- B. 介绍医院的规章制度
- C. 立即护送患者入病区
- D. 通知医生做术前准备
- E. 了解患者有何护理问题

52. 答案：C

解析：心功能四级患者体力完全丧失，即使休息时仍可存在心力衰竭症状或心绞痛，即呼吸困难和疲乏，因此需要立即护送病人进入病区。住院处的护理包括：办理入院手续、进行卫生处置、护送病人入病区；因此 BE 选项排除。危重患者可酌情免浴，因此 A 排除。故答案选 C。

53. (A2 型题) 患者，女，65 岁，诊断为白内障入院，在积极治疗后经医生同意准备出院。护士为该患者进行出院护理，下列哪项是错误的

- A. 通知患者及家属做好出院准备
- B. 整理病历，将医嘱单放在最后一页
- C. 凭医生处方领取患者出院后须服药物
- D. 介绍出院后注意事项
- E. 填写患者出院护理评估单

53. 答案：B

解析：病历的最后一页应该是体温单，答案选 B。

54. (A2 型题) 患者男，56 岁，Ⅲ度烧伤面积大于 60%，入院后的护理级别是

- A. 重症护理
- B. 特级护理
- C. 一级护理
- D. 二级护理
- E. 三级护理

54. 答案：B

解析：临床上一般将护理级别分为四级，特级护理、一级护理、二级护理、三级护理。目前患者属于大面积烧伤，应实行特级护理。答案选 B。

55. (A2 型题) 患者男，68 岁。脑出血急诊入院，医嘱一级护理，给予心电监护。接诊护士在给患者女儿作入院介绍时，遭到了家属的强烈拒绝。最可能的原因是

- A. 正在对患者进行抢救
- B. 护士着装不整齐
- C. 护士介绍不到位
- D. 护士表情不自然
- E. 病房环境较嘈杂

55. 答案：A

解析：根据患者突发脑出血来看，病情危险，BCDE 选项均不符合题意。答案选 A。

56. (A2 型题) 患者男，45 岁。上呼吸道感染未痊愈，自动要求出院，护士需做好的工作不包括

- A. 在出院医嘱上注明“自动出院”
- B. 根据出院医嘱，通知病人和家属
- C. 征求病人及家属对医院的工作意见
- D. 教会家属静脉输液技术，以便后续治疗
- E. 指导病人出院后在饮食、服药等方面的注意事项

56. 答案：D

解析：患者家属不是专业护理人员，不应告知其静脉输液的技术，应叮嘱患者家属发现病情及时送患者到医院就医，故选 D。其他选项均正确，故不选。

57. (A2 型题) 患者, 女性, 妊娠 9 个月, 宫口已开, 急诊入院, 住院处护士应首先给予的处置是

- A. 优先办理入院手续
- B. 给予孕妇心理护理
- C. 会阴部常规消毒
- D. 通知产科医生
- E. 用平车送入产科

57. 答案: E

解析: 孕妇宫口已开, 随时可能会生产, 应立即用平车送入产科。答案选 E。

58. (A2 型题) 患者女, 45 岁。慢性心力衰竭伴全身水肿。经诊疗后需要入院观察, 住院处办理入院手续的根据是

- A. 单位介绍信
- B. 门诊病历
- C. 以往病历
- D. 住院证
- E. 医保卡

58. 答案: D

解析: 病人或家属持医生签发的住院证到住院处办理入院手续。

59. (A1 型题) 防病员坠床, 最佳措施是

- A. 约束带固定肩部
- B. 约束带固定膝部
- C. 床档
- D. 约束带固定踝部
- E. 约束带固定腕部

59. 答案: C

解析: 床档主要用于预防病人坠床; 约束带主要用于保护躁动的病人。本题答案为 C。

60. (A1 型题) 进行胰胆管造影时应采取的体位是

- A. 头低足高位

- B. 头高足低位
- C. 俯卧位
- D. 侧卧位
- E. 仰卧屈膝位

60. 答案: C

解析: 俯卧位适用范围: ①腰、背部检查, 配合胰、胆管造影等。②腰、背、臀部有伤口或脊椎手术后, 病人不能平卧或侧卧。③胃肠胀气所致腹痛。原因: 可使腹腔容积增大, 以缓解胃肠胀气。故本题选 C。

61. (A2 型题) 为减轻患者疼痛, 以下做法错误的是

- A. 端坐位可减轻呼吸困难
- B. 半坐卧位可减轻腹部手术后伤口疼痛
- C. 俯卧位可减轻臀部伤口疼痛
- D. 中凹位可减轻腹部伤口疼痛
- E. 去枕仰卧位可预防腰椎腔穿刺后因颅内压降低而引起的头痛

61. 答案: D

解析: 中凹位适用于休克病人, 它不能缓解腹部伤口疼痛。半坐卧位可减少腹部张力减少疼痛。因此答案选 D。

62. (A2 型题) 颅内压增高的患者宜采取的卧位是

- A. 仰卧位
- B. 端坐位
- C. 头高足低位
- D. 半坐卧位
- E. 头低足高位

62. 答案: C

解析: 头高足低位可减轻颅内压, 防止脑水肿, 因此答案选 C。

63. (A1 型题) 侧卧位适用于

- A. 全身麻醉未清醒者
- B. 腹部检查
- C. 导尿时

- D. 休克患者
- E. 肛门检查时

63. 答案: E

解析: 侧卧位的适用范围: ①灌肠、肛门检查, 配合胃镜、肠镜检查。②臀部肌肉注射③预防压疮。因此答案选 E。

64. (A2 型题) 患者男, 38 岁, 因车祸受伤急诊入院, 目前诊断为失血性休克, 查体血压 70/50mmHg。患者最适宜的体位是

- A. 中凹卧位
- B. 头高足低位
- C. 去枕仰卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低足高位

64. 答案: A

解析: B 项头高足低位适用于颅脑手术后, 颈椎骨折病人进行牵引; C 项适用于全麻未清醒或昏迷病人, 椎管内麻醉或脊髓腔穿刺后的病人; D 项适用于预防压疮病人翻身体位或喂食时等; E 项适用于十二指肠引流, 肺部分泌物引流, 产妇胎膜早破, 和骨折时作为反牵引力。故本题选 A。

65. (A2 型题) 患者李某, 妊娠 36 周, 因阴道持续性流液 1 小时来求诊。肛查时羊水不断从阴道流出, 诊断为胎膜早破。应将其安置

- A. 平卧位
- B. 头低足高位
- C. 头高足低位
- D. 截石位
- E. 膝胸卧位

65. 答案: B

解析: 头低足高位的适用范围: ①肺部分泌物引流, 使痰易于咳出; ②十二指肠引流, 有利于胆汁引流; ③妊娠时胎膜早破, 防止脐带脱垂; ④跟骨牵引或胫骨牵引时, 利用人体重力作反牵引力, 防止下滑。故本题选 B。

66. (A2 型题) 患者女, 产前检查胎儿臀位, 为矫正胎位, 护士指导其选用的是

- A. 头低脚高位
- B. 截石位
- C. 侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 俯卧位

66. 答案: D

解析: A. 头低足高位: 适用于①肺部分泌物引流; ②十二指肠引流; ③妊娠时胎膜早破; ④跟骨牵引或胫骨牵引时。B. 截石位: 用于会阴、肛门部位的检查、治疗或手术。C. 侧卧位: 适用于灌肠、肛门检查、臀部肌肉注射、配合胃镜检查。D. 膝胸卧位: ①用于肛门、直肠、乙状结肠的检查及治疗; ②用于矫正子宫后倾及胎位不正。E. 俯卧位: 适用于①腰、背部手术或检查; ②腰、背、臀部有伤口。故本题应选 D。

67. (A2 型题) 患者, 女性, 65 岁, 尿毒症, 意识模糊。为保证输液通畅, 防止患者拔针, 护士拟采用宽绷带制动腕关节。最佳的打结方法是

- A. 环形结
- B. 双套结
- C. 八字结
- D. 单套结
- E. 平结

67. 答案: B

解析: 腕部制动常用宽绷带制成双套结。其优点是约束环不会随着手腕的活动越拉越紧,

68. (A2 型题) 患者, 女性, 57 岁, 胃癌, 胃大部切除术后第 3 天。护士为患者取半坐卧位, 并解释该卧位的主要作用是

- A. 减少腹部伤口出血
- B. 减少静脉回心血量
- C. 减轻肺部淤血
- D. 减少腹腔渗出液
- E. 减轻伤口缝合处的张力

68. 答案：E

解析：半坐卧位可减轻伤口缝合处的张力，缓解疼痛。因此选E。

69. (A2型题) 患者，女性，24岁。因宫外孕出血导致休克急诊入院，急诊护士应给患者采取的体位是

- A. 头低足高位
- B. 截石位
- C. 中凹卧位
- D. 仰卧位，头偏向一侧
- E. 端坐位

69. 答案：C

解析：休克患者应该取休克体位，仰卧中凹，病人头胸抬高 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 度角，下肢抬高 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 度角。抬高头胸部，有利于保持气道通畅，改善通气功能，从而改善缺氧；抬高下肢有利于静脉回流，增加心排出量而使休克症状得到缓解。因此答案选C。

70. (A2型题) 患者，女，89岁，因糖尿病入院，极度虚弱，自身无能力改变卧位，采用一人法为患者翻身侧卧，下列哪项是错误的

- A. 掌握节力原则
- B. 翻身时注意观察病情和皮肤受压情况
- C. 翻身时不可拖拉
- D. 翻身时为避免对患者的损伤，护士应让患者尽量远离自己
- E. 做好记录和交班

70. 答案：D

解析：翻身时护士应让患者靠近自己，既可以省力又可以避免在翻身时对患者造成损伤。因此答案选D。

71. (A2型题) 患者，男，48岁，长期酗酒，今日下午大量酗酒后，突然出现剧烈腹痛入院，患者为缓解疼痛呈俯卧位，辗转反侧。患者所处的体位属于

- A. 主动体位
- B. 被动体位
- C. 被迫体位

D. 专业体位

E. 治疗体位

71. 答案: C

解析: 卧位可分为三种: 主动卧位, 被动卧位和被迫卧位。患者意识清晰有改变卧位的能力, 由于疾病的原因被迫转换体位, 因而属于被迫体位, 答案选 C。

72. (A2 型题) 患者, 男, 27 岁, 阑尾切除术后, 患者意识清楚, 伤口疼痛, 活动受限。为减轻腹部切口缝合处的张力, 缓解疼痛, 护士可协助患者采取的体位是

A. 仰卧位

B. 半坐卧位

C. 俯卧位

D. 侧卧位

E. 头低足高位

72. 答案: B

解析: 半坐卧位可松弛腹肌, 减轻切口缝线处的张力, 缓解疼痛, 促进舒适, 有利于切口愈合。因此答案选 B。

73. (A2 型题) 患者, 女, 55 岁, 患支气管扩张症, 病变在两肺下叶前基底支, 为帮助其排出痰液, 护士应为患者安置的体位是

A. 俯卧位

B. 仰卧位

C. 左侧卧位

D. 右侧卧位

E. 头低足高位

73. 答案: E

解析: 头低足高位可利用重力作用, 促使痰液咳出。因此选 E。

74. (A2 型题) 患者, 男, 20 岁, 背部深 II 度烧伤, 烧伤面积达 15%。患者宜采取的体位是

A. 仰卧位

B. 中凹卧位

- C. 端坐位
- D. 俯卧位
- E. 头低足高位

74. 答案: D

解析: 病人背部有伤口宜采取俯卧位, 避免伤口被压, 同时方便换药。因此答案选 D。

75. (A2 型题) 患者, 男性, 36 岁, 躯干烧伤。若采用暴露疗法, 宜选用的保护具是

- A. 床档
- B. 宽绷带
- C. 支被架
- D. 肩部约束带
- E. 膝部约束带

75. 答案: C

解析: 支被架既可以避免盖被压迫肢体所致的不舒适, 也可以保暖, 适用于烧伤病人暴露疗法, 同时也适用于肢体瘫痪、极度虚弱的病人。因此答案选 C。

76. (A2 型题) 患者男, 68 岁, 体重 60kg, 胃癌术后第 2 天, 患者卧床翻身时身体滑向床尾, 护士将其移向床头, 下列做法正确的是

- A. 尽快完成, 不必向患者解释说明
- B. 移动之前应固定床轮, 松开盖被
- C. 移动之前在患者头下垫一枕头
- D. 移动时患者双手放在胸腹前
- E. 手动时, 不需要得到患者的协助

76. 答案: B

解析: 在护理手术患者时要注意将病床制动 (B 对), 向患者做好解释工作 (A 错), 视病情放平床头支架或靠背架, 将一软枕横立于床头 (C 错), 患者仰卧屈膝, 双手握住床头栏杆, 也可搭在护士肩部或抓住床沿 (D 错), 如果在清醒的情况下, 是可以让患者配合工作的 (E 才)。显然在选项中只有 B 的做法是最正确的。

77. (A2 型题) 患者, 男性, 70 岁, 慢性阻塞性肺气肿, 肺性脑病。护士为其加用床档, 并向家属说明该护理的目的是为了满足患者的

- A. 生理需要
- B. 安全的需要
- C. 自尊的需要
- D. 实现自我价值的需要
- E. 归属与爱的需要

77. 答案: B

解析: 患者患有肺性脑病, 昼睡夜醒, 加床挡可以防止夜间患者醒时乱动跌下床。因此答案选 B。

78. (A2 型题) 患者, 女, 25 岁。车祸导致面部开放性伤口。经清创缝合后, 暂时入院观察, 应采取的体位是

- A. 膝胸卧位
- B. 俯卧位
- C. 半坐卧位
- D. 侧卧位
- E. 仰卧位

78. 答案: C

解析: 面部及颈部手术后患者, 取半坐卧位可减少局部出血。因此选 C。

79. (A2 型题) 护士为乙型肝炎患者采集血标本时, 不慎将血液滴在患者的床头柜上, 此时护士对该床头柜的处理方法, 正确的是

- A. 日光曝晒
- B. 流水刷洗
- C. 卫生纸擦拭
- D. 消毒液擦拭
- E. 毛巾湿水擦拭

79. 答案: D

解析: 乙肝病毒在 65°C 10 小时煮沸 10 分钟或高压蒸气均可灭活 HBV。含氯制剂、环氧乙烷、戊二醛、过氧乙酸和碘伏等也有较好的灭活效果。故本题选 D。

80. (A1 型题) 热力消毒灭菌法的原理是

- A. 干扰细菌酶的活性
- B. 破坏细菌膜的结构
- C. 使菌体蛋白发生光解变性
- D. 抑制细菌代谢和生长
- E. 使菌体蛋白及酶变性凝固

80. 答案: E

解析: 热力消毒灭菌法主要利用微生物的蛋白质凝固变性、酶失活、细胞膜和细胞壁发生改变而导致死亡, 达到消毒灭菌的目的。辐射消毒法主要利用紫外线或臭氧的杀菌作用, 使菌体蛋白质光解、变性而致细菌死亡。电离辐射灭菌法破坏微生物的核酸、蛋白质和酶等。微波消毒法在电磁波的高频交流电场中, 物品中的极性分子发生极化进行高速运动, 并频繁改变方向, 互相摩擦, 使温度迅速上升, 达到消毒灭菌的作用。故本题答案为 E。

81. (A1 型题) 下列哪种化学消毒灭菌剂不能杀灭芽孢

- A. 环氧乙烷
- B. 过氧乙酸
- C. 戊二醛
- D. 甲醛
- E. 乙醇

81. 答案: E

解析: 芽孢对于不良环境如: 高温、低温、干燥、光线和化学药物有很强的抵抗力。在常用的化学消毒制剂中, 环氧乙烷、过氧乙酸、戊二醛、福尔马林(甲醛)、含氯消毒剂均能有效的杀灭芽孢。乙醇无法通过芽孢的厚壁, 因此不能起到杀死芽孢的作用。故本题选 E。

82. (A1 型题) 已穿无菌手术衣, 戴无菌手套, 手术未开始, 双手应置于

- A. 胸前部
- B. 腹前部
- C. 夹于腋下
- D. 双手下垂

E. 双手往后背

82. 答案: A

解析: 在手术中, 须遵循无菌的原则, 任何无菌的部位, 器械不得接触相对污染的部位。因此双手不能接触腹部、背部、下肢等部位, 应当置于同样无菌清洁并且污染可能性最小的胸前区。故本题选 A。

83. (A1 型题) 不属于物理消毒灭菌的方法是

- A. 燃烧法
- B. 臭氧灭菌灯消毒法
- C. 微波消毒灭菌法
- D. 浸泡法
- E. 生物净化法

83. 答案: D

解析: 物理消毒灭菌法包括热力消毒灭菌、辐射消毒、空气净化、超声波消毒和微波消毒等。化学消毒灭菌法包括浸泡法、擦拭法、薰蒸法、喷雾法等。故本题 A、B、C、E 均属于物理消毒灭菌法, 浸泡法属于化学方法, 故本题正确答案为 D。物理消毒灭菌法是利用物理因素如热力、辐射、电离辐射、过滤等将微生物清除或杀灭的方法。化学消毒灭菌法是采用各种化学物品来清除或杀灭微生物的方法。

84. (A1 型题) 过氧乙酸不能用于

- A. 手的消毒
- B. 空气消毒
- C. 浸泡金属器械
- D. 擦拭家具
- E. 浸泡搪瓷类物品

84. 答案: C

解析: 过氧乙酸的用途: ①0. 2%溶液用于手的消毒, 浸泡 1~2 分钟; ②0. 2%~0. 5%溶液用于物体表面的擦拭或浸泡 10 分钟; ③0. 5%溶液用于餐具消毒, 浸泡 30~60 分钟; ④1%~2%溶液用于室内空气消毒。而过氧乙酸腐蚀性强, 不适用于金属器械的浸泡, 本题应选 C。

85. (A1 型题) 使用无菌持物钳, 下列哪项是不正确的

- A. 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内
- B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
- C. 每个容器只能放一把
- D. 取钳应将钳端闭合
- E. 可用于夹取消毒的油纱布

85. 答案: E

解析: 无菌持物钳浸泡在盛有消毒液的广口罐内保存; 浸泡时消毒液应没过无菌持物钳关节轴上 2~3cm、持物镊的 1/2 处; 一个容器只浸泡一把持物器械, 以免相互碰撞而污染; 取出、放回时前端闭合, 不可触及容器口缘及液面以上的部位; 换药时, 不可用持物镊直接取油纱条或换药、消毒皮肤。故 E 选项错误。

86. (A1 型题) 取用无菌溶液, 正确的是

- A. 取用前首先检查溶液性状
- B. 手指触及瓶盖内面
- C. 倒溶液时溶液瓶口触碰无菌容器
- D. 将无菌敷料直接伸入瓶内蘸溶液
- E. 注明开瓶日期和时间并签名

86. 答案: E

解析: A 项错误, 应为取用无菌溶液时检查瓶体有无裂缝, 瓶盖有无松动, 药液有无沉淀、浑浊、变质等。B 项错误, 手指不能触及瓶盖内面。C 项错误, 倒溶液时溶液瓶口不可触碰无菌容器。D 项错误, 不可以将无菌物品或者非无菌物品伸入无菌溶液内蘸取或者直接接触瓶口倒液。E 项为正确的操作。故本题正确的选项是 E。

87. (A1 型题) 以下化学消毒剂能杀灭芽胞的是

- A. 过氧乙酸
- B. 乙醇
- C. 碘酊
- D. 聚维酮碘
- E. 氯己定

87. 答案: A

解析：过氧乙酸属于灭菌消毒剂，A 正确；乙醇属于中效消毒剂，对肝炎病毒及芽孢无效，B 错误；碘酊属于中效消毒剂，仅可杀灭分枝杆菌、细菌繁殖体、真菌、病毒等微生物，达到消毒要求的制剂，C 错误；氯己定属于低效消毒剂，E 错误。故本题选 A。

88. (A1 型题) 高压蒸汽灭菌微生物测试法使用的菌片是

- A. 表皮葡萄球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 嗜热脂肪杆菌芽孢
- E. 链球菌

88. 答案：D

解析：利用耐热的非致病性嗜热脂肪杆菌芽孢作为指示菌株，待灭菌周期结束后取出培养，指示菌片上若无细菌生长，表示灭菌合格。故本题选 D。

89. (A1 型题) 下列不符合无菌技术操作原则的是

- A. 无菌包须有标记和消毒日期
- B. 无菌操作时手臂位于腰部水平以上
- C. 无菌物品与非无菌物品分别放置
- D. 无菌持物钳可夹取所有无菌物品
- E. 一份无菌物品供一位患者使用一次

89. 答案：D

解析：不可用无菌持物钳夹取油纱布、换药或消毒皮肤，以防被污染。故 D 错误。

90. (A1 型题) 应给予保护性隔离的患儿是

- A. 肾小球肾炎婴儿
- B. 上呼吸道感染婴儿
- C. 缺铁性贫血患儿
- D. 腹泻婴儿
- E. 接受化疗的白血病患者

90. 答案：E

解析：化疗药物不仅能杀伤白血病细胞，同样也能杀伤正常细胞，在化疗期间很容易发生感染，此时应行保护性隔离。故本题选 E。

91. (A1 型题) 灭头虱常选用的药物是

- A. 过氧乙酸
- B. 30%含酸百部酊
- C. 氯己定
- D. 碘酊
- E. 乳酸钠

91. 答案：B

解析：过氧乙酸属于灭菌消毒剂，具有刺激性和腐蚀性，故不适用，A 错误；氯己定属于低效消毒剂，具有广谱抑菌、杀菌作用，多用于皮肤、黏膜消毒，C 错误；碘酊属于中效消毒剂，用于手术、注射部位的皮肤消毒，D 错误；乳酸钠多用于抑制食物中的细菌生长繁殖，E 错误。故本题选 B。

92. (A1 型题) 配制百部酊需装入加盖瓶中，浸泡的时间是

- A. 6 小时
- B. 20 小时
- C. 36 小时
- D. 48 小时
- E. 72 小时

92. 答案：D

解析：取百部酊 30g 放于瓶中，加 50%乙醇溶液或 65 度白酒 100ml，再加 100%醋酸溶液 1ml，盖严瓶盖，48 小时后制得药液，可供使用。故本题选 D。

93. (A1 型题) 护士需在洗手后再消毒的情况是

- A. 脱无菌手套后
- B. 离开普通病房前
- C. 为乙肝患者导尿前
- D. 为糖尿病患者静脉注射后
- E. 处理破伤风患者伤口后

93. 答案：E

解析：先洗手再进行卫生手消毒的情况：①接触患者的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后；②直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染病患者污染之后。故本题选 E。

94. (A1 型题) 下列应执行严密隔离的疾病是

- A. 乙型脑炎
- B. 传染性肝炎
- C. 霍乱
- D. 肺结核
- E. 破伤风

94. 答案：C

解析：乙型脑炎、传染性肝炎、肺结核、破伤风均属于乙类传染病，霍乱属于甲类传染病，应执行严密隔离。故本题选 C。

95. (A1 型题) 胃管煮沸消毒时，操作不正确的是

- A. 先将胃管刷洗干净
- B. 用纱布包裹胃管
- C. 放入冷水中
- D. 待水沸后开始计时
- E. 持续 10 分钟

95. 答案：C

解析：玻璃器皿、金属及搪瓷类物品冷水放入，消毒 10~15min；橡胶制品用纱布包好，水沸后放入，消毒 5~10min。胃管属于橡胶制品，故 C 不正确。

96. (A1 型题) 在传染病区中属于污染区的是

- A. 走廊
- B. 病室
- C. 护士站
- D. 治疗室
- E. 值班室

96. 答案：B

解析：污染区指传染病患者和疑似传染病患者接受诊疗的区域，以及被其血液、体液、分泌物、排泄物污染的物品暂存和处理的场所；走廊、护士站、治疗室属于潜在污染区，值班室属于清洁区。故本题选 B。

97. (A1 型题) 在临床护理的质量标准中，对无菌物品合格率的规定是

- A. 100%
- B. 95%
- C. 90%
- D. 85%
- E. 80%

97. 答案：A

解析：临床护理的质量标准规定：定期对医疗单位的空气、物品进行监测，各种无菌物品的灭菌合格率应达到 100%。故本题选 A。

98. (A1 型题) 物理消毒灭菌法中，效果最可靠的是

- A. 高压蒸汽灭菌法
- B. 煮沸法
- C. 日光曝晒法
- D. 烤箱烘烤
- E. 紫外线灯管消毒法

98. 答案：A

解析：高压蒸汽灭菌法是热力消毒灭菌法中效果最为可靠的一种方法，可杀灭包括芽孢在内的一切微生物，广泛应用于临床。故本题选 A。

99. (A1 型题) 不能杀灭芽胞的化学消毒剂是

- A. 环氧乙烷
- B. 碘伏
- C. 过氧乙酸
- D. 戊二醛
- E. 甲醛

99. 答案：B

解析：环氧乙烷、过氧乙酸、戊二醛、甲醛属于灭菌消毒剂，能杀灭包括细菌芽胞在内的一切微生物，碘伏属于中效消毒剂可以杀灭细菌芽胞以外的各种致病性微生物。故本题选 B。

100. (A1 型题) 在隔离病区工作护士的下列行为，正确的是

- A. 掀页撕取避污纸
- B. 把口罩挂在胸前
- C. 身着隔离衣进入治疗室
- D. 为患者翻身后用手整理口罩
- E. 护理结核患者后立即更换口罩

100. 答案：E

解析：避污纸应用手捏取，A 错误；摘口罩时，需先洗手，再取下口罩，不可将口罩挂在胸前，手勿接触口罩外面（污染面），B、D 错误；进入隔离病区应穿隔离衣，离开隔离病区，脱下隔离衣，不能身着隔离衣进入治疗室，C 错误。故本题选 E。

(三)

1. (A1 型题) 下列具有自律性的心肌细胞为

- A. 心房肌细胞
- B. 心室肌细胞
- C. 乳头肌细胞
- D. 心内膜细胞
- E. 窦房结

1. 答案：E

解析：自律性是指心肌细胞自发产生动作电位的能力，其电生理基础是四期自发性去极化活动。通常在较负的静息电位水平(-80~-90mv)开始自发去极化。窦房结、心房传导束、房室交界区和希氏、浦氏系统细胞均具有高度的自律性。在正常的情况下，心脏窦房结的自律性最高，控制着整个心脏跳动的节律，其他部位为潜在起搏点，均被抑制，并不能发挥起搏作用。当窦房结细胞的频率降低或者潜在起搏点兴奋性增高时，窦房结对其他起搏点的抑制作用被解除，潜在起搏点发挥起搏功能，产生异位心律。本题 A、B、C、D 均被排除，因此，选 E。

2. (A1 型题) 长期卧床的慢性心功能不全病人, 其水肿的分布特点是

- A. 以踝内侧明显
- B. 以胫前部明显
- C. 以颜面部明显
- D. 以腰背部、骶尾部明显
- E. 以四肢明显

2. 答案: D

解析: 心源性水肿的特点是首先出现在身体最低垂的部位, 如卧床病人的背骶部、会阴或阴囊部, 非卧床病人的足踝部、胫前。用指端加压水肿部位, 局部可出现凹陷, 称为压陷性水肿。重者可延及全身, 出现胸水、腹水。故选 D。

3. (A1 型题) 颈静脉怒张见于

- A. 胸腔积液
- B. 高血压
- C. 右心功能不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 甲状腺功能亢进症

3. 答案: C

解析: 左心功能不全表现为心浊音界扩大, 心尖区舒张期奔马律, 可并发二尖瓣关闭不全、右侧胸水等; 右心功能不全表现为心浊音界向左、右两侧增大, 颈静脉充盈, 肝肿大, 水肿, 紫绀。本题中 C 符合题意。

4. (A1 型题) 临床治疗心力衰竭时, 应用洋地黄的主要目的是

- A. 增强心肌收缩力
- B. 减慢心室率
- C. 调节心肌耗氧量
- D. 抑制心脏传导系统
- E. 提高异位起搏点的自律性

4. 答案: A

解析：洋地黄可增强心肌收缩力，抑制心脏传导系统。对迷走神经系统的直接兴奋作用是洋地黄的一个独特优点，长期应用地高辛，即使较少剂量也可对抗心衰时交感神经兴奋的不利影响。因此，本题选 A。

5. (A1 型题) 以下哪项属于心源性呼吸困难的护理措施

- A. 加强皮肤护理，预防压疮
- B. 夜间睡眠时保持半卧位
- C. 准确测量尿量和体重
- D. 加强心电监护
- E. 饮食中限制蛋白质摄入量

5. 答案：B

解析：心源性呼吸困难主要见于心力衰竭，特点是活动时出现或加重，休息时减轻或缓解；仰卧位时加重，坐位减轻。常发生阵发性夜间呼吸困难，故本题选 B。

6. (A1 型题) 心力衰竭病人饮食，下列哪项不妥

- A. 低盐
- B. 高热量
- C. 富含维生素
- D. 适量纤维素
- E. 少量，多餐

6. 答案：B

解析：心力衰竭的饮食护理：①限制钠盐摄入，以预防和减轻水肿；②限制水的摄入；③热量和蛋白质适量，限制脂肪，低热量饮食能使患者的净体重维持在正常或略低于正常水平，并能减少机体的耗氧，从而减轻心脏负荷；④补充维生素；⑤注意维持电解质平衡；⑥适当选用多纤维食物，以有利于保持大便畅通；⑦饮食不宜过饱。故本题选 B。

7. (A2 型题) 励长期卧床的心衰患者在床上做下肢活动，其目的主要是

- A. 减少回心血量
- B. 预防压疮
- C. 防止肌肉萎缩
- D. 防止下肢静脉血栓形成

E. 及早恢复体力

7. 答案：D

解析：充血性心衰是深静脉血栓形成的危险因素，心衰患者体循环淤血，长期卧床病人极易产生下肢静脉血栓。因此，鼓励长期卧床的心衰患者在床上做下肢活动，其目的主要是预防下肢静脉血栓形成。故本题选D。

8. (A1 型题) 前负荷过重见于

A. 高血压

B. 主动脉瓣狭窄

C. 二尖瓣狭窄

D. 肺动脉高压

E. 二尖瓣关闭不全

8. 答案：E

解析：前负荷是指心肌收缩之前所遇到的阻力或负荷，即在舒张末期，心室所承受的容量负荷或压力就是前负荷。瓣膜病变，如二、三尖瓣、主动脉瓣关闭不全可使容量负荷增加，二尖瓣、三尖瓣狭窄可使容量负荷降低；内外分流性疾病，如房间隔、室间隔缺损、动脉导管未闭可使容量负荷增加；全身性血容量改变，如短时间内输入大量液体、甲亢、慢性贫血等可使容量负荷增加。A. 高血压，外周血管阻力增加，导致左室后负荷增加。B. 主动脉瓣狭窄，心室射血时阻力增加，后负荷增加。C. 二尖瓣狭窄，右室后负荷增加。D. 肺动脉高压，右室后负荷增加。E. 二尖瓣关闭不全，导致反流，左室舒张容量增加，前负荷增大。故本题选E。

9. (A1 型题) 心源性水肿先出现在身体下垂部位，一般病人易出现在双下肢，其主要原因是

A. 有效循环血容量增多

B. 毛细血管血压增高

C. 组织液静水压降低

D. 组织液胶体渗透压升高

E. 静脉压降低

9. 答案：B

解析：心源性水肿发生机制是：①有效循环血量不足，肾血流量减少，肾小球滤过率降低，继发性醛固酮增多，水钠潴留；②体循环静脉压增高，毛细血管静水压增高，组织液回吸收减少；③淤血性肝硬化导致蛋白质合成减少、胃肠道淤血导致食欲下降及消化吸收功能下降，继发低蛋白血症，血浆胶体渗透压下降。故选 B。

10. (A1 型题) 心源性水肿最早出现的部位是

- A. 眼睑
- B. 上肢
- C. 全身营养不良
- D. 踝部
- E. 会阴

10. 答案：D

解析：心源性水肿的特点是下垂性，最早出现在病人的下肢。

11. (A2 型题) 长期服用呋塞米的心衰患者护士应重点关注的不良反应的是

- A. 低血钾
- B. 低血镁
- C. 低血钠
- D. 脱水
- E. 发热

11. 答案：A

解析：呋塞米是排钾利尿剂，长期服用应注意低血钾的发生。故选 A。

12. (A2 型题) 心力衰竭患者长期服用噻嗪类利尿剂，最易发生的不良反应是

- A. 低钙血症
- B. 低钾血症
- C. 高尿酸血症
- D. 低血糖
- E. 高镁血症

12. 答案：B

解析：噻嗪类利尿药最常见的不良反应是低钾血症。故选 B。

13. (A1 型题) 导致左心室压力负荷过重的病因是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 高血压
- E. 肺动脉瓣狭窄

13. 答案: D

解析: 左室压力负荷增加常见于高血压、主动脉瓣狭窄。肺动脉瓣狭窄会造成右心室压力负荷增加; A、B、C 均会导致心脏容量负荷增加。故选 D。

14. (A2 型题) 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时, 输液速度宜控制在

- A. 10~20 滴/分钟
- B. 20~30 滴/分钟
- C. 30~40 滴/分钟
- D. 40~50 滴/分钟
- E. 50~60 滴/分钟

14. 答案: B

解析: 慢性心衰患者 24 小时输液量宜控制在 1500ml 内, 输液速度 20~30 滴/分。故选 B。

15. (A1 型题) 关于心力衰竭病人的饮食护理措施, 应排除

- A. 限制钠盐摄入
- B. 高维生素
- C. 高热量
- D. 易消化
- E. 少量多餐

15. 答案: C

解析: 心衰病人的饮食要求: 低热量低盐清淡易消化饮食, 少量多餐; 食盐摄入量少于 5g/日。故选 C。

16. (A2 型题) 左心衰竭患者的呼吸困难主要是由于

- A. 肺瘀血或肺水肿所致

- B. 肺泡内张力和肺循环压力增高所致
- C. 体循环瘀血所致
- D. 肝瘀血、腹水等使呼吸运动受限所致
- E. 支气管、肺受压所致

16. 答案：A

解析：左心衰竭的表现是肺淤血和心排血量降低。故选 A。

17. (A1 型题) 心源性水肿的主要致病因素是

- A. 右心功能不全
- B. 有效循环血量增多
- C. 心律失常
- D. 醛固酮水平下降
- E. 液体自毛细血管内渗透至组织间隙的量少于回吸收的量

17. 答案：A

解析：心源性水肿最常见的病因是右心衰竭。其发生机制是有效循环血量不足，B 错误；肾小球滤过率降低，继发性醛固酮分泌增多，D 错误；体循环静脉压增高，毛细血管静水压增高，组织液回吸收减少，E 错误。故选 A。

18. (A2 型题) 患者出现洋地黄毒性反应，首要的处理措施是

- A. 补液，稀释体内药物
- B. 电击除颤
- C. 利多卡因，纠正心律失常
- D. 利尿，促进排泄
- E. 停用洋地黄药物

18. 答案：E

解析：洋地黄中毒的处理措施：①停用洋地黄；②补钾；③纠正心律失常。故首要措施是停用洋地黄。答案选 E。

19. (A1 型题) 诱发或加重心力衰竭最常见的因素是

- A. 呼吸道感染
- B. 妊娠和分娩
- C. 情绪激动

- D. 严重心律失常
- E. 药物使用不当

19. 答案: A

解析: 呼吸道感染是心衰最常见和最主要的诱因。故选 A。

20. (A1 型题) 服用以下药物时, 为预防不良反应, 应常规测量心率的是

- A. 卡托普利
- B. 地西洋
- C. 地高辛
- D. 阿司匹林
- E. 阿米卡星

20. 答案: C

解析: 地高辛属于洋地黄类药物, 使用洋地黄药物前应监测心率或脉率。故选 C。

21. (A1 型题) 右心功能不全主要临床症状出现的病理生理基础是

- A. 肺循环淤血
- B. 体循环淤血
- C. 心肌损害
- D. 心室重构
- E. 血流动力学改变

21. 答案: B

解析: 右心功能不全的主要表现是体循环淤血引起的。故选 B。

22. (A2 型题) 风心病患者, 入院时不能从事任何体力活动, 休息时也乏力、心悸、气急, 其心功能属于

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. 无法判断

22. 答案: D

解析：心功能分级：①I级：一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难、心绞痛等症状；②II级：体力活动轻度受限。休息时无自觉症状，但平时一般活动可出现上述症状，休息后很快缓解；③III级：体力活动明显受限，休息时无症状，低于平时一般活动量时即可引起上述症状，休息较长时间后症状方可缓解；④IV级：不能从事任何体力活动。休息时亦有心衰的症状，体力活动后加重。

23. (A2型题) 患者，女，62岁，护士对其进行心功能分级评估时，最主要评估下列哪项

- A. 病程长短
- B. 活动耐力
- C. 有无并发症
- D. 心脏体征
- E. 辅助检查

23. 答案：B

解析：心功能分级主要看是否出现疲乏、心悸，以及在何种情况下出现，即活动耐力的评估。故选B。

24. (A2型题) 患者，女性，61岁，因突然出现心悸、气促，咳粉红色泡沫痰急诊。查体：血压195/90mmHg，心率136次/分。护士应首先备好的药物是

- A. 毛花苷C，硝酸甘油，肾上腺素
- B. 硝普钠，毛花苷C，呋塞米
- C. 利多卡因，酚妥拉明，毛花苷C
- D. 毒毛花苷K，硝普钠，普萘洛尔
- E. 硝酸甘油，毛花苷C，多巴酚丁胺

24. 答案：B

解析：硝普钠可以快速扩张动脉和静脉，降低心脏前后负荷，缓解急性肺水肿的症状，毛花苷C可以增强心肌收缩力，减慢心率，呋塞米可以通过利尿作用降低血压。故选B。

25. (A2型题) 患者，女，50岁，因心力衰竭入院。诊断为心功能II级。患者应表现为

- A. 不能从事任何体力活动

- B. 日常活动后出现呼吸困难，休息后缓解
- C. 轻微活动后出现呼吸困难，休息后不易缓解
- D. 一般活动不引起困乏，呼吸困难
- E. 休息时即有呼吸困难

25. 答案：B

解析：心功能 II 级的表现是日常活动后出现心悸、呼吸困难，故选 B。

26. (A2 型题) 患者，男，55 岁，因心力衰竭使用洋地黄进行治疗。治疗期间的下列医嘱中，护士应对哪项提出质疑和核对

- A. 氯化钾溶液静滴
- B. 生理盐水静滴
- C. 5%葡萄糖溶液静滴
- D. 葡萄糖酸钙溶液静滴
- E. 乳酸钠溶液静滴

26. 答案：D

解析：洋地黄与葡萄糖酸钙合用会加重洋地黄的毒性反应，导致心律失常。故选 D。

27. (A1 型题) 某病人高血压病史 15 年，近 1 年来从事体力活动轻度受限，日常活动引起乏力、心悸、气急，属于

- A. 心功能 I 级
- B. 心功能 II 级
- C. 心功能 III 级
- D. 心功能 IV 级
- E. 重度心力衰竭

27. 答案：B

解析：患者从事日常活动引起心悸、气急，属于心功能 II 级的表现。选 B。

28. (A2 型题) 患者，女性，65 岁，急性左心衰竭。住院治疗心力衰竭症状有所缓解，近 2 日食欲有所改善。护士应给予正确的饮食指导是

- A. 高热量、低蛋白
- B. 低热量、低蛋白

- C. 高蛋白、低维生素
- D. 低盐、易消化
- E. 低热量、少纤维

28. 答案：D

解析：心衰患者的饮食护理：给予高蛋白、高维生素清淡易消化的饮食，少量多餐，避免过饱，限制钠盐摄入，食盐摄入少于 5g/日。故选 D。

29. (A2 型题) 患者，女性，患风湿性心脏病，妊娠 32 周，入院时体力活动重度受限，休息时亦乏力、气急、心悸。其心功能属于

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. 无法判断

29. 答案：D

解析：心功能 I 级：日常活动不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难。心功能 II 级：体力活动轻度受限制，一般活动后出现上述症状。心功能 III 级：体力活动明显受限制，低于一般活动量时出现上述症状。心功能 IV 级：不能从事任何体力活动，休息亦有心衰症状。患者在休息时也有心悸、气急等症状，为心功能 IV 级，故选 D。

30. (A2 型题) 患者男，55 岁。大面积烧伤，半小时内输入 500ml 液体后突然出现气促、呼吸困难，咳粉红色泡沫样痰，为该患者吸氧时湿化瓶内放入的液体是

- A. 乙醇溶液
- B. 温开水
- C. 蒸馏水
- D. 矿泉水
- E. 生理盐水

30. 答案：A

解析：患者咳粉红色泡沫痰，是急性肺水肿的表现，应予以高流量吸氧，氧气中加入 20%~30%乙醇湿化，以降低肺泡内泡沫的表面张力，使泡沫破裂消散。

故选 A。

31. (A2 型题) 患者，女性，74 岁，因慢性心力衰竭，心功能 IV 级入院。经治疗、护理心功能恢复至 II 级，但患者不愿下床活动，护士对其宣教长期卧床的危险，应除外

- A. 活动减少使消化功能减退
- B. 易发生便秘
- C. 易形成深静脉血栓
- D. 易发生扩张性心肌病
- E. 长期卧床，致肌肉萎缩

31. 答案：D

解析：长期卧床活动减少，消化功能减退，易发生便秘，形成深静脉血栓，肌肉萎缩等并发症，A、B、C、E 均正确。D 不是长期卧床的并发症。

32. (A1 型题) 对房颤病人主要应观察

- A. P 波的频率
- B. 病人的主诉
- C. 血压的变化
- D. 心室率的改变
- E. 脉搏的改变

32. 答案：D

解析：心房颤动主要体征是心律绝对不规则、心音强弱不等，患者脉搏次数显著少于心搏数，称为脉搏短绌。快室率房颤和极速型房颤时常致心搏出量明显降低，易导致血流动力学障碍。所以房颤病人主要应观察心室率的改变，本题 D 为正确选项。

33. (A1 型题) 心室颤动的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则

D. 慢而不规则

E. 测不到

33. 答案: E

解析: 室颤时, 病人意识丧失、抽搐、心音消失、不能触及颈动脉等大动脉搏动与脉搏、无法测到血压、呼吸不规则或停止, 以及瞳孔散大、对光反射消失, 故本题选 E。

34. (A1 型题) 窦性心动过速不发生于哪种情况

A. 发热

B. 甲状腺功能亢进症

C. 运动

D. 贫血

E. 甲状腺功能减退症

34. 答案: E

解析: 窦性心动过速的原因有: 健康人运动和情绪紧张可引起心动过速。酒、茶、咖啡和药物如异丙肾上腺素和阿托品常引起窦性心动过速。在疾病状态中常见的病因为发热、低血压、缺氧、心功能不全、贫血、甲状腺功能亢进和心肌炎。故本题答案应选 E。

35. (A1 型题) 洋地黄与钙剂应避免同时应用, 如有必要至少应间隔

A. 2 小时

B. 4 小时

C. 7 小时

D. 8 小时

E. 10 小时

35. 答案: B

解析: 强心苷类药物正性肌力作用的机制是通过抑制心肌细胞的 Na^+ , K^+ -ATP 泵促进 Ca^{2+} 的内流和细胞内积累来实现, 再额外补充钙剂会使得细胞内钙超载, 导致心律失常; 而且在高血钙的时候也容易发生强心苷类药物的不良反应, 包括快速型心律失常、房室传导

阻滞、窦性心动过缓等。洋地黄与钙剂应避免同时应用，如有必要至少应间隔 4 小时。故本题选 B。

36. (A1 型题) 下列哪种心律失常不需紧急处理

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 室性早搏 R 落在 T 上
- C. 室性早搏呈联律出现
- D. 短阵室性心动过速
- E. 心室颤动

36. 答案: A

解析: 第一度房室传导阻滞: 每个冲动都能传导至心室, 但 PR 间期超过 0.20s 临床表现第一度房室传导阻滞病人通常无症状, 听诊第一心音强度减弱。第一度或第二度 I 型房室阻滞心室率不太慢者无需特殊治疗。故选 A。其他室性早搏 R 落在 T 上、室性早搏呈联律出现、心室颤动都是比较严重的心律失常需要紧急处理的。

37. (A1 型题) 心律失常基本的症状是

- A. 胸痛
- B. 呼吸困难
- C. 晕厥
- D. 心悸
- E. 低血压

37. 答案: D

解析: 心律失常指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度与激动次序的异常。心悸是基本的症状。故选 D。心律失常可导致晕厥、出现低血压。但不是基本症状。

38. (A1 型题) 心电图表现为提前出现 QRS 波, 宽大畸形, 其前无 P 波, 代偿间歇完全的心律失常为

- A. 室性逸搏
- B. 房性逸搏
- C. 房性期前收缩

- D. 室性期前收缩
- E. 房室交界期前收缩

38. 答案: D

解析: 室性期前收缩(室早)心电图的特征:①提前发生的 QRS 波群,宽大畸形,时限通常大于 0.12s,ST 段与 T 波的方向与 QRS 主波方向相反。②室性期前收缩与其前面的窦性搏动之间期(称为配对期)恒定。③室性期前收缩后可见一完全性代偿间歇。④室性期前收缩的类型:室性期前收缩可孤立或规律出现。二联律指每个窦性搏动后跟随一个室性期前收缩;三联律指每两个窦性搏动后出现一个室性期前收缩,如此类推;连续发生两个室性期前收缩称为成对室性期前收缩;同一导联内室性期前收缩形态相同者为单形性室性期前收缩,形态不同者称多形性或多源性室性期前收缩

39. (A1 型题)有可能危及生命的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 频发单源性室性早搏

39. 答案: D

解析: 室性阵发性心动过速在发作时可严重影响心脏排血量,使心、脑、肾等重要脏器血供明显减少,造成血液动力学障碍而出现心绞痛、低血压、晕厥甚至猝死。由于室性阵发性心动过速容易发展成为心室颤动,因此,必须紧急处理,药物首选利多卡因。

40. (A1 型题)下列哪种心律失常应视为危急情况

- A. 心房颤动
- B. 窦性心动过速
- C. 室性早搏,“R”落在“T”上
- D. 室性早搏,2~4 次/分
- E. 窦性心律不齐

40. 答案: C

解析：本题中 C 选项提示病人发生了室性阵发性心动过速，室性阵发性心动过速容易发展成为心室颤动，甚至猝死。相对于其它几个选项，室性阵发性心动过速最为危急，严重威胁病人生命，必须紧急处理。

41. (A1 型题) 属于临床上最常见心律失常的是

- A. 期前收缩
- B. 窦性停搏
- C. 二度房室传导阻滞
- D. 室上性心动过速
- E. 室性心动过速

41. 答案：A

解析：室性期前收缩是一种最常见的心律失常。

42. (A1 型题) 下列不是窦性心动过速诱因的是

- A. 剧烈运动或情绪激动
- B. 缺氧
- C. 失血性贫血
- D. 高血钾
- E. 甲状腺功能亢进

42. 答案：D

解析：窦性心动过速的诱因有：吸烟、饮酒、情绪激动，缺氧、发热、甲亢、贫血等。高血钾可导致窦性心动过缓，故选 D。

43. (A1 型题) 心律失常最基本的症状是

- A. 心源性休克
- B. 气促
- C. 晕厥
- D. 心悸
- E. 急性肺水肿

43. 答案：D

解析：心源性休克、晕厥是心律失常很严重的表现，急性肺水肿是左心衰竭的表现，气促是呼吸困难的表现，心律失常最基本的症状是心悸。故选 D。

44. (A1 型题) 心源性晕厥最常见的病因是

- A. 疼痛
- B. 直立性低血压
- C. 低血糖
- D. 高血压
- E. 心律失常

44. 答案: E

解析: 心源性晕厥的常见病因包括严重心律失常(如病窦综合征、房室传导阻滞、室性心动过速)和器质性心脏病(如严重主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病、急性心肌梗死、急性主动脉夹层、心脏压塞、左房黏液瘤)。故选 E。

45. (A1 型题) 护士对心房颤动病人要注意主要观察的是

- A. P 波的形态
- B. 代偿间歇的变化
- C. 脉搏的改变
- D. 病人的主诉
- E. 心室率的改变

45. 答案: E

解析: 房颤病人的临床表现取决于心室率的快慢, 心室率不快时有心悸、胸闷, 心室率超过 150 次/分时可诱发心绞痛或心衰。当心室率快时可有脉搏短绌。故对房颤患者应主要观察心室率的改变。

46. (A2 型题) 患者女, 60 岁。因急性心肌梗死入院, 病情不稳定。该患者出现哪项心律失常时需高度警惕室颤的发生

- A. 房室传导阻滞
- B. 窦性心动过缓
- C. 室上性心动过速
- D. 房颤
- E. 室性心动过速

46. 答案: E

解析：大部分心肌梗死病人都有心律失常，多发生在起病 1~2 天，24h 内最多见，心律失常常以室性心律失常最多，尤其是室性期前收缩，如频发（每分钟 5 次以上）、多源、成对出现、短阵室速或呈 RonT 现象的室性期前收缩常为心室颤动的先兆。故本题选 E。

47. (A2 型题) 患者，女，45 岁，自诉极度疲乏、心慌、胸闷、尿少。体检：心律不齐，期前收缩 8 次/分，测血钾 7.8mmol/L。如不处理，会突然发生

- A. 昏迷
- B. 休克
- C. 心搏骤停
- D. 呼吸衰竭
- E. 心力衰竭

47. 答案：C

解析：期前收缩 > 5 个/分，称为频发性期前收缩。病人有频发性期前收缩再加上高血钾，有心搏骤停的危险。故选 C。

48. (A2 型题) 患者，男，45 岁，患有室性心动过速，医嘱胺碘酮治疗，下列哪项为其最严重的心外毒性

- A. 转氨酶升高
- B. 光过敏
- C. 角膜色素沉着
- D. 胃肠道反应
- E. 肺纤维化

48. 答案：E

解析：胺碘酮最严重的心外毒性为肺纤维化。故选 E。

49. (A2 型题) 患者，女性，54 岁，心悸 2 小时来院急诊。查体：心率 125 次/分，脉率 105 次/分，心脏听诊心音强弱及快慢不等。考虑是

- A. 窦性心动过速
- B. 频发房性期前收缩
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 阵发性快速房颤

E. 频发室性期前收缩

49. 答案: D

解析: 阵发性快速房颤的特点: 快速心室率, 心率快于脉率, 听诊心律绝对不正, 心音强弱不定。故选 D。

50. (A2 型题) 患者, 男, 42 岁。码头搬运工人。安装永久性起搏器 10 天后出院。正确的出院指导是

- A. 可以恢复正常工作
- B. 可以行磁共振检查
- C. 学会每天自测脉搏
- D. 术侧上肢只能下垂, 不能抬起
- E. 1 年内无心律失常可取出永久性起搏器

50. 答案: C

解析: 出院后教会病人每天自测脉搏 2 次, 出现脉率比设置频率低 10% 或再次出现安装起搏器前的症状应及时就医, C 正确; 告知病人应避免强磁场和高电压的场所, B 错误; 装有起搏器的一侧上肢应避免做用力过度或幅度过大的动作, 并不是不能抬起, D 错误; 刚出院患肢还没恢复, 肯定是不能正常工作的, A 错误; 术后要定期随访, E 错误。故选 C。

51. (A2 型题) 患者, 男, 17 岁, “心脏三度房室传导阻滞”安装起搏器术后, 护士应提醒患者避免

- A. 接触 X 线
- B. 接触花粉
- C. 靠近微波设备
- D. 接触化学药品
- E. 乘坐飞机

51. 答案: C

解析: 安装起搏器术后病人应避免强磁场和高电压的场所 (如磁共振、激光、变电站等), 故选 C。

52. (A2 型题) 患者, 男性, 32 岁, 体检发现心律失常, 心电图为偶发室性期前收缩, X 线胸透及超声心动图均正常。宜给予该患者的处理是

- A. 口服抗心律失常药物
- B. 不宜劳累
- C. 服糖皮质激素
- D. 卧床休息，用血管扩张药
- E. 不需常规抗心律失常治疗

52. 答案: E

解析: 偶发期前收缩不需特殊治疗。故选 E。

53. (A2 型题) 患者男, 患冠心病 10 年, 半月来频繁发作心前区不适, 含服硝酸甘油无效, 疑为急性心肌梗死, 最具诊断意义的检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 血沉
- D. 超声波
- E. 心电图

53. 答案: E

解析: 结合患者病史首先考虑心肌梗死。心肌梗死有特征性的心电图改变, 借此可明确诊断。故本题选 E。

54. (A2 型题) 患者, 女性, 63 岁, 急性前壁心肌梗死。发病第 2 天突然出现短暂意识丧失、抽搐。考虑患者最可能出现的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 房性期前收缩
- C. 房室传导阻滞
- D. 室性期前收缩
- E. 窦性心动过缓

54. 答案: D

解析: 前壁心肌梗死最易发生室性心律失常, 故选 D。

55. (A2 型题) 患者, 男性, 68 岁。心电图: P 波消失, QRS 波形态正常, R-R 间期完全不规则, 心室率极不规则, 145 次/分。其心律失常的类型为

- A. 阵发性室上性心动过速

- B. 心房扑动
- C. 窦性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 心室颤动

55. 答案: D

解析: 房颤心室率极不规则, 通常在 100~160 次/分。QRS 波群形态一般正常, R-R 间隔完全不规则。故选 D。

56. (A2 型题) 患者, 女性, 43 岁, 突发心悸。查体: 心律规则, 心率 180 次/分, 未闻及杂音, 压迫颈动脉窦后心率突然降到 72 次/分。由此判断此患者可能发生了

- A. 神经官能症
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 阵发性室性心动过速
- D. 频发房性期前收缩
- E. 频发室性期前收缩

56. 答案: B

解析: 阵发性室上性心动过速: 突发突止, 持续数秒至数小时或数天不等。发作时有心悸、胸闷、乏力、头痛等; 连续 3 次或以上快而规则的房性或交界区性期前收缩 (QRS 波群形态正常), 频率 150~250/分, P 波不易分辨。

57. (A2 型题) 患者, 女性, 62 岁。心前区剧烈疼痛 2 小时入院。患者恶心、呕吐、烦躁, 大汗淋漓, 经休息和含服硝酸甘油后疼痛未见缓解。患者病情尚不稳定, 提示可能发生室颤的心律失常是

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 室上性心动过速
- D. 偶发房性期前收缩
- E. 室性心动过速

57. 答案: E

解析：室速常发生于冠心病，尤其是心肌梗死者。尖端扭转型室速可进展为室颤护或猝死。故选 E。

58. (A2 型题) 患者，男性，56 岁，4 小时前出现持续心前区疼痛，不能缓解，诊断为急性心肌梗死，收入监护室。监护中患者出现心室颤动，护士应采取的首要措施是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 气管切开，呼吸机辅助呼吸
- C. 高流量吸氧
- D. 非同步电除颤
- E. 同步电除颤

58. 答案：D

解析：发生室颤时首要措施是进行非同步电除颤，故选 D。

59. (A2 型题) 患者男，64 岁。患心脏病多年，近来出现心悸，心率每分钟 30~40 次，律齐，首要的处理措施是

- A. 加强巡视
- B. 心电监护
- C. 安慰病人
- D. 立即报告医生
- E. 做好生活护理

59. 答案：D

解析：由题患者出现心悸，心率每分钟 30~40 次，律齐可知病人出现了窦性心动过缓，此时，应立即报告医生，并协助医生积极给予处理，可给予：①麻黄素 25mg，每日 3~4 次口服；②阿托品 0.3~0.6mg，每日 3-4 次口服；③异丙肾上腺素 5~10mg，每日 3~4 次口服。本题中 A、B、C、E 均为此病人的护理措施，但首要的护理措施应立即报告医生 (D 正确)。

60. (A2 型题) 患者男，女，67 岁，患慢性充血性心力衰竭，在治疗期间出现恶心、头痛、头晕、黄视。检查心率 46 次/分，二联律，应考虑为

- A. 硝普钠中毒
- B. 洋地黄中毒

- C. 氨茶碱中毒
- D. 酚妥拉明中毒
- E. 多巴酚酊中毒

60. 答案：B

解析：洋地黄中毒的临床表现：①胃肠道症状，厌食是最早表现，继而恶心、呕吐，属中枢性；②心脏表现：表现为各种类型的心律失常，最常见是多源性室早呈二、三联律，房性心动过速伴房室传导阻滞，以及心房颤动伴加速性交界性心律等；③神经系统症状：头痛、头晕、乏力、烦躁、失眠及黄绿视等症状。故本题选 B。

61. (A2 型题) 患者男，30 岁，触电后在心肺复苏过程中，心电图发现患者有心室纤颤，应采取的措施是

- A. 用阿托品
- B. 置心脏起搏器
- C. 除颤
- D. 用肾上腺素
- E. 用利多卡因

61. 答案：C

解析：心室纤颤全称心室纤维性颤动，简称室颤，是指患者的心肌突然丧失了整体的协调性，呈不规则的收缩，因而不能将血液泵出的临床危险状态。心室纤颤是极危险的心律失常，触电后可能发生。一旦发现，必须争分夺秒抢救，进行非同步直流电除颤复律术。故本题选 C。

62. (A1 型题) 使用洋地黄药物，下列哪项是错误的

- A. 准确计算洋地制剂剂量
- B. 用药前测心率，婴儿 80 次/分停药
- C. 观察有无恶心呕吐及心律不齐
- D. 可同时服用氯化钙
- E. 可同时服用氯化钾

62. 答案：D

解析：洋地黄过量引起中毒，应准确计算使用剂量（A 正确）。洋地黄中毒可引起：①心律失常；②胃肠道症状，厌食是最早表现，继而恶心、呕吐（B、C 正确的）；因此要注意观察有无这些症状出现。洋地黄药物的正性肌力作用的机制是通过抑制心细胞的 Na-K-ATP 泵促进 Ca 离子的内流和细胞内积累来实现的，再额外补充钙剂会使得细胞内钙超载，导致迟后除极性的心律失常，因此忌与氯化钙合用。故本题 D 选项错误，本题选 D。

63. (A1 型题) 法洛四联症患儿脑缺氧发作时，应采取的体位是

- A. 俯卧位
- B. 平卧位
- C. 半坐卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 侧卧位

63. 答案：D

解析：法洛四联症患儿脑缺氧发作时，应采取的体位是膝胸卧位。因为膝胸卧位时下肢屈曲，增加体循环阻力，使静脉回心血量减少，减轻了心脏负荷，从而右向左分流量减少，缺氧症状暂时缓解。

64. (A1 型题) 不符合右心衰竭患儿表现的是

- A. 颈静脉怒张
- B. 肝脏进行性增大
- C. 咳嗽及咳粉红色泡沫痰
- D. 食欲减退、恶心、呕吐
- E. 肝颈静脉回流征阳性

64. 答案：C

解析：右心衰竭临床出现：水肿、颈静脉征：颈静脉充盈、怒张，是右心衰竭的主要体征，肝颈静脉反流征阳性则更具特征性。肝脏体征：肝脏常因瘀血而肿大，伴压痛。消化道症状：胃肠道及肝瘀血引起腹胀、纳差、恶心、呕吐等，是右心衰竭最常见的症状。而咳嗽及咳粉红色泡沫痰是左心衰竭的临床表现，故答案选 C。

65. (A1 型题) 先天性心脏病右向左分流型最明显的外观特征是

- A. 心脏杂音
- B. 发育迟缓
- C. 持续发绀（青紫）
- D. 心前区隆起
- E. 活动耐力下降

65. 答案：C

解析：右向左分流型（青紫型）为先天性心脏病中最严重的一组，畸形的存在致右心压力增高并超过左心而使血液从右向左分流，或大动脉起源异常时，导致大量回心静脉血进入人体循环，引起全身持续性青紫。常见的有法洛三联症和大动脉错位等。因此正确答案为C。

66. (A1 型题) 下列先天性心脏病属右向左分流型的是

- A. 室间隔缺损
- B. 右位心
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 房间隔缺损

66. 答案：D

解析：根据血流动力学变化将先天性心脏病分为：①无分流型（无青紫型）：包括主动脉缩窄、肺动脉瓣狭窄、主动脉瓣狭窄以及肺动脉瓣狭窄、单纯性肺动脉扩张、原发性肺动脉高压等；②左向右分流组（潜伏青紫型）：平时血流从左向右分流而不出现青紫。当啼哭、屏气使血液自右向左分流而出现暂时性青紫。如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、主肺动脉隔缺损，以及主动脉窦动脉瘤破入右心或肺动脉等；③右向左分流组（青紫型）：包括法洛三联症、法洛三联症、右心室双出口和完全性大动脉转位、永存动脉干等。所以本题选D。

67. (A1 型题) 左向右分流型先天性心脏病最易继发

- A. 充血性心力衰竭
- B. 呼吸道感染
- C. 体格发育障碍
- D. 脑血栓形成

E. 亚急性细菌性心内膜炎

67. 答案: B

解析: 左向右分流型先天性心脏病是在左、右心间或主动脉与肺动脉之间具有异常通路, 平时不出现青紫。最常见的左向右分流型先天性心脏病有房间隔缺损、室间隔缺损和动脉导管未闭。最易并发肺炎。因此, 本题选 B。

68. (A1 型题) 先天性心脏病患儿恢复心脏功能的重要措施是

- A. 注意休息, 保证睡眠
- B. 持续吸氧, 改善缺氧
- C. 应用洋地黄, 增强心肌收缩力
- D. 应用足量利尿剂, 减少心脏负担
- E. 应用镇静剂, 减慢心率

68. 答案: A

解析: 先天性心脏病患儿尽量让孩子保持安静, 避免过分哭闹, 保证充足的睡眠。大些的孩子生活要有规律, 动静结合, 既不能在外边到处乱跑(严格禁止跑跳和剧烈运动), 也不必整天躺在床上, 晚上睡眠一定要保证, 以减轻心脏负担。因此, 本题选 A。

69. (A1 型题) 对于法洛四联症患儿护理要点中包括要保证液体入量, 避免发生脱水, 其主要原因是为了

- A. 防止血栓栓塞
- B. 防止休克
- C. 补充能量
- D. 平衡酸碱
- E. 保持渗透压平衡

69. 答案: A

解析: 法洛四联症患儿血液黏稠度高, 发热、出汗、吐泻时, 加重血液浓缩易形成血栓, 因此要注意供给充足液体。故选 A。

70. (A1 型题) 4~7 岁小儿正常心率范围是

- A. 110~130 次/分
- B. 100~120 次/分

- C. 80~100 次/分
- D. 70~90 次/分
- E. 不低于 60 次/分

70. 答案: C

解析: 4~7 岁儿童正常心率是 80~100 次/分。故选 C。

71. (A1 型题) 5 岁小儿平均血压正常的是

- A. 70/50mmHg
- B. 90/60mmHg
- C. 90/70mmHg
- D. 100/60mmHg
- E. 100/70mmHg

71. 答案: B

解析: 2 岁以后的血压正常值可用公式推算: 收缩压 (mmHg)=80+(年龄 x2), 舒张压为收缩压的 2/3。年龄 5 岁根据上述公式可计算出血压为 90/60mmHg。故选 B。

72. (A1 型题) 卵圆孔正常情况下解剖关闭多应在生后

- A. 1~3 个月
- B. 3~5 个月
- C. 5~7 个月
- D. 7~9 个月
- E. 9~12 个月

72. 答案: C

解析: 生后 5~7 个月时, 卵圆孔解剖上大多闭合。故选 C。

73. (A1 型题) 关于小儿血压测量要点, 正确的描述是

- A. 小儿血压测量与成人差别较大
- B. 袖带的宽度为上臂长度的 2/3
- C. 袖带过松测得血压偏低
- D. 学龄儿可用 4~6cm 袖带
- E. 上肢血压比下肢血压高约 20mmHg

73. 答案：B

解析：小儿血压测量与成人并无较大差别，A 错误；应根据患儿不同年龄选择不同宽度的袖带，宽度应为上臂长度的 $1/2 \sim 2/3$ ，B 正确；袖带过松，测得的血压偏高，C 错误；下肢的血压比上肢约高 20mmHg，E 错误；成人使用袖带的标准规格是宽 12cm，儿童应使用小规格，但是 4~6cm 显然太小，故选 B。

74. (A1 型题) 法洛四联症的四种病理变化中最重要的是

- A. 房间隔缺损
- B. 肺动脉狭窄
- C. 室间隔缺损
- D. 主动脉骑跨
- E. 动脉导管未闭

74. 答案：B

解析：法洛四联症是由以下 4 种畸形组成：肺动脉狭窄（最主要）；室间隔缺损；主动脉骑跨；右心室肥厚。故选 B。

75. (A1 型题) 法洛四联症患者缺氧发作时，使用普萘洛尔（心得安）进行治疗的目的是

- A. 控制惊厥
- B. 减慢心率
- C. 减少水钠潴留
- D. 抑制呼吸中枢
- E. 纠正代谢性酸中毒

75. 答案：B

解析：普萘洛尔有减慢心率、缩小脉压、减少心排血量的作用。法洛四联症患者缺氧发作时，使用普萘洛尔可以缓解缺氧症状。

76. (A1 型题) 下列收缩压或舒张压符合小儿高血压标准的是

- A. 收缩压高于标准血压 30mmHg
- B. 收缩压高于标准血压 20mmHg
- C. 舒张压高于标准血压 40mmHg
- D. 舒张压高于标准血压 20mmHg

E. 脉压差高于标准血压 20mmHg

76. 答案: B

解析: 2 岁以后小儿收缩压可按公式计算, 收缩压 (mmHg)=年龄 \times 2+80mmHg (年龄 \times 0.26+10.7kPa)。收缩压的 2/3 为舒张压。小儿收缩压高于此标准 20mmHg (2.6kPa) 为高血压, 低于此标准 20mmHg (2.6kPa) 为低血压。故选 B。

77. (A1 型题) 护理法洛四联症患儿时, 给予充足水分的主要目的是

- A. 预防形成脑血栓
- B. 预防并发肺感染
- C. 预防并发亚急性细菌性心内膜炎
- D. 预防心力衰竭
- E. 预防中枢神经系统感染

77. 答案: A

解析: 法洛四联症患儿血液黏稠度高, 发热、出汗、吐泻时, 加重血液浓缩易形成血栓, 因此要注意供给充足液体。故选 A。

78. (A1 型题) 动脉导管未闭患儿, 出生后首选的治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 吲哚美辛
- C. 卡托普利
- D. 普萘洛尔
- E. 硝酸甘油

78. 答案: B

解析: 早产儿动脉导管未闭患儿可于生后一周内用吲哚美辛以促进导管关闭。故选 B。

79. (A1 型题) 先天性心脏病患儿出院时对家长的健康宣教, 错误的是

- A. 避免患儿长时间剧烈哭闹
- B. 积极参加各种体育运动
- C. 避免受凉、防止感冒
- D. 少量多餐, 给予高蛋白、高热量、易消化的饮食
- E. 按免疫程序接种疫苗

79. 答案：B

解析：先天性心脏病患儿心功能不好，不应参加剧烈体育活动，应保持劳逸结合，B 错误；患儿长时间剧烈哭闹易造成缺氧，加重病情，A 正确；患儿应避免受凉，防止呼吸道感染，C 正确；给予少量多餐、高蛋白、高热量、易消化饮食，保证营养需要，D 正确；应按时接种疫苗，E 正确。故选 B。

80. (A1 型题) 关于先心病儿童的个性心理特征表现，错误的叙述是

- A. 性格内向
- B. 情绪不稳
- C. 依赖心理增强
- D. 明显的恐惧感
- E. 记忆力强

80. 答案：E

解析：先心病患儿常有生长发育落后，A、B、C、D 均符合本病患儿的心理特征，只有 E 记忆力强不正确。故选 E。

81. (A1 型题) 患儿，女，2 岁，诊断为“法洛四联症”，患儿平素活动时都会主动下蹲片刻，家长咨询护士其原因，护士正确的解释是

- A. 使心脑血管供血增加
- B. 缓解漏斗部痉挛
- C. 使劳累、气急缓解
- D. 使静脉回心血量增加
- E. 增加体循环阻力，减少右向左分流

81. 答案：E

解析：法洛四联症患儿蹲踞时下肢屈曲受压，体循环阻力增加，同时静脉回心血量减少，减轻了右心室负荷，使右向左分流减少，从而缺氧症状暂时得以缓解。故选 E。

82. (A1 型题) 患儿，2 岁，诊断为动脉导管未闭。对该患儿做健康指导时，不妥的是

- A. 建立合理的生活制度
- B. 充分运动，增强体质

- C. 合理营养，促进生长
- D. 预防呼吸道感染
- E. 指导定期复诊

82. 答案：B

解析：先天性心脏病患儿应该充分休息、避免劳累，故 B 不正确。合理生活制度，适当休息对先天性心脏病患儿恢复是非常重要的，A 正确。合理营养可以促进心肌的代谢和恢复，C 正确。预防呼吸道感染，注意保暖，避免到人多聚集的地方，D 正确。强调定期门诊复查，及时检测病情的变化，E 正确。

83. (A2 型题) 某患者，3 岁。出生 4 个月后发现发绀，剧烈哭闹时有抽搐史。发育比同龄儿童稍差，平时经常感冒。查体：杵状指，嘴唇发绀明显；心前区闻及 III 级收缩期喷射样杂音。X 线胸片提示肺血少，右心室增大。最可能的临床诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

83. 答案：D

解析：发绀、杵状指、右心室增大，心前区有收缩期喷射性杂音等均是法洛四联症的临床表现。故选 D。

84. (A1 型题) 患儿 5 岁，在门诊诊断为“房间隔缺损”，拟择期手术治疗。门诊护士对家属的健康教育要点，错误的是

- A. 本病为一种先天性心脏病
- B. 经过治疗，大多数情况下预后良好
- C. 治疗方案以手术为主
- D. 术前最重要的是防止皮肤破损
- E. 术前注意保暖，避免着凉、感冒

84. 答案：D

解析：房间隔缺损是一种先天性心脏病，本病预后一般较好，A、B 正确；治疗以介入治疗或手术为主，C 正确；术前最重要的是防止感染，应避免着凉、感冒，E 正确，D 错。故选 D。

85. (A1 型题) 患儿，男，6 岁，患轻度室间隔缺损，尚未治疗。现因龋齿需拔牙，医生在拔牙前给予抗生素，其目的是预防

- A. 上呼吸道感染
- B. 牙龈炎
- C. 支气管炎
- D. 充血性心力衰竭
- E. 感染性心内膜炎

85. 答案：E

解析：室间隔缺损者，为预防感染性心内膜炎，应在拔牙、做扁桃体或其他咽部手术时预防性使用抗生素。故选 E。

86. (A1 型题) 患儿，3 岁。自 1 岁时出现活动后气促、乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左缘 2~4 肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，可见杵状指，首先考虑

- A. 房间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 室间隔缺损
- E. 右位心

86. 答案：C

解析：法洛四联症的典型临床表现是青紫、缺氧发作、蹲踞症状、杵状指。患儿活动后气促、乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左缘 2~4 肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，杵状指，提示为右向左分流型（青紫型）先天性心脏病的典型症状，故首先考虑诊断为法洛四联症，本题应选 C。

87. (A1 型题) 原发性高血压最常见的死亡原因是

- A. 心律失常
- B. 尿毒症
- C. 脑血管意外

- D. 心力衰竭
- E. 高血压危象

87. 答案: C

解析: 高血压病的死亡原因取决于其并发症, 如尿毒症、脑血管意外、充血性心力衰竭等。在我国以脑血管意外为最多, 其次是心力衰竭和尿毒症。故本题选 C。

88. (A2 型题) 对原发性高血压患者做健康指导, 不正确的是

- A. 宜低盐、低脂、低胆固醇、低热量饮食
- B. I 级高血压应注意休息, 避免过劳
- C. 缓解期适当运动, 控制体重
- D. 血压高时服药, 不高时不用服药
- E. 每日定时测血压

88. 答案: D

解析: 高血压病患者的健康指导: ①饮食指导: 低脂、低盐, 高蛋白、高维生素、适量微量元素饮食, 戒烟戒酒, 控制食糖摄入; ②生活指导: 生活规律、劳逸结合、情绪乐观、适度运动; ③服药指导: 联合用药, 降压不宜过快, 不可时服时停, 忌睡前服药, 忌擅自乱用药物, 忌无症状不服药, 忌随便改变治疗方案, 另外应每日定时测血压以监测血压控制情况。故本题选 D。

89. (A1 型题) 有关高血压发病机制中最重要的

- A. 血容量过多
- B. 内分泌因素
- C. 肾功能异常
- D. 高级神经中枢功能失调
- E. 血管内皮功能失常

89. 答案: D

解析: 高血压的发病机制主要有: ①交感神经系统活性亢进; 交感神经系统活动亢进各种病因因素使大脑皮层下神经中枢功能发生变化, 各种神经递质浓度与活性异常, 导致交感神经系统活动亢进, 血浆儿茶酚胺浓度升高, 阻力小动脉收缩增强。②肾性水钠潴留; ③肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)激活; 细胞膜

离子转运异常；⑤胰岛素抵抗。其中，在高血压的形成和维持过程中交感神经活性亢进起了极及重要的作用，故本题选 D。

90. (A1 型题) 属于原发性高血压心血管风险分层根据的是

- A. 病程长短
- B. 症状轻重
- C. 血脂增高程度
- D. 器官损害情况
- E. 降压治疗效果

90. 答案: D

解析: 高血压危险度分层高血压预后与血压升高水平、有无其他心血管危险因素存在及靶器官损害程度有关, 现主张对高血压进行危险程度的分层, 将高血压病人分为低危、中危、高危和极高危, 分别表示 10 年内将发生心脑血管病事件的概率为 15%、15%~20%、20%~30%和>30%。治疗目标及预后判断也应以此为基础。具体分层标准根据血压升高水

91. (A2 型题) 原发性高血压合并支气管哮喘患者降压治疗, 不宜选用

- A. 哌唑嗪
- B. 呋塞米
- C. 硝苯地平
- D. 普萘洛尔
- E. 卡托普利

91. 答案: D

解析: 普萘洛尔是 β 受体阻滞剂, 可使支气管平滑肌收缩而增加呼吸道阻力, 故在支气管哮喘或慢性阻塞性肺疾病患者, 有时可加重或诱发哮喘的急性发作。故选 D。

92. (A1 型题) 高血压危象可首选

- A. 硝普钠
- B. 普萘洛尔
- C. 利尿剂
- D. 胍乙啶

E. 血管紧张素转化酶抑制剂

92. 答案: A

解析: 高血压危象是指短时期内(数小时或数天)血压重度升高,舒张压 $\geq 130\text{mmHg}$ 和(或)收缩压 $\geq 200\text{mmHg}$,伴有重要器官组织如心、脑、肾、眼底、大动脉的严重功能障碍或不可逆损害。迅速降低血压:常用的降压药物硝普钠:为首选药物,能同时直接扩张动脉和静脉,降低心脏前、后负荷。故选 A。

93. (A2 型题) 高血压、动脉粥样硬化老年患者的饮食不需限制

- A. 高胆固醇食物
- B. 高动物脂肪食物
- C. 高糖食物
- D. 高钠食物
- E. 高钙食物

93. 答案: E

解析: 高胆固醇食物、高动物脂肪食物、高糖食物可以加重患者动脉粥样硬化,而高钠食物可以加重高血压,因此,排除 A、B、C、D,本题的正确答案是 E。

94. (A2 型题) 护理高血压患者时,下列哪项措施不妥

- A. 协助用药尽快将血压降至较低水平
- B. 改变体位时动作应缓慢
- C. 沐浴时水温不宜过高
- D. 头晕、恶心时协助其平卧并抬高下肢
- E. 保持排便通畅

94. 答案: A

解析: 在应用降压药物时,应使普通高血压病患者的血压缓慢降低为宜,且不宜将血压降至过低,以避免减少对心、脑、肾等重要脏器的供血。可见,本题中 A 不妥,而 B、C、D、E 均为高血压患者的护理措施。故选 A。

95. (A1 型题) 高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是

- A. 头痛
- B. 乏力
- C. 心率增快

- D. 心率减慢
- E. 刺激性干咳

95. 答案: E

解析: 卡托普利属于 ACEI 类药物, 该药最常见的不良反应是刺激性干咳。故选 E。

96. (A1 型题) 硝苯地平可降低动脉血压, 该药的药理作用是

- A. 减少水钠潴留
- B. 抑制肾素释放
- C. 阻止钙离子进入心肌细胞
- D. 抑制血管紧张素 II 生产
- E. 阻滞 β 受体

96. 答案: C

解析: 硝苯地平属于钙通道阻滞剂, 该药的药理作用是阻止钙离子进入心肌细胞, 能松弛平滑肌, 舒张周围小动脉, 降低外周血管阻力, 从而使血压下降。

97. (A1 型题) 通过利尿作用达到降压效果的药物是

- A. 氯沙坦
- B. 硝苯地平
- C. 普萘洛尔
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡托普利

97. 答案: D

解析: 本题 A. 氯沙坦属于血管紧张素 II 受体拮抗剂; B. 硝苯地平属于钙通道阻滞剂; C. 普萘洛尔属于 β 受体阻滞剂; E. 卡托普利属于血管紧张素转换酶抑制剂; 只有 D. 氢氯噻嗪属于利尿剂。因此, 本题选 D。

98. (A1 型题) 关于原发性高血压最常见的死亡原因, 正确的是

- A. 心室颤动
- B. 肾衰竭
- C. 心力衰竭
- D. 脑血管意外

E. 高血压危象

98. 答案：D

解析：高血压并发症是导致高血压病人致残甚至致死的主要原因。其中脑血管并发症最常见。

99. (A1 型题) 利尿剂降低血压的主要作用机制是

- A. 减少血容量
- B. 阻断 β 受体
- C. 阻断 α 受体
- D. 阻滞钙通道
- E. 扩张小动脉

99. 答案：A

解析：利尿剂是通过利钠排水、降低细胞外高血容量、减轻外周血管阻力发挥降压作用。

100. (A1 型题) 下列血压测定的结果，可作为高血压判断标准的是

- A. 140/90mmHg
- B. 120/75mmHg
- C. 90/60mmHg
- D. 150/105mmHg
- E. 160/90mmHg

100. 答案：A

解析：高血压的诊断标准为：收缩压 $>140\text{mmHg}$ ，舒张压 $>90\text{mmHg}$ 。故选 A。

(四)

1. (A1 型题) 新生儿食管狭窄部位共有

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

1. 答案：C

解析：食管共有三处狭窄：第一处位于食道的起端；第二个处在食道入口以下7cm处；第三处是食道通过膈肌的裂孔处。

2. (A1 型题) 人体食管的长度约为

A. 25cm

B. 28cm

C. 30cm

D. 45cm

E. 50cm

2. 答案：A

解析：食管是连接咽和胃的通道，全长约25cm。食管的功能是把食物和唾液等运送到胃内。

3. (A1 型题) (2014~专业实务) 肝脏组织基本的功能单位是

A. 肝细胞

B. 肝小叶

C. 肝窦

D. 肝段

E. 门脉系统

3. 答案：B

解析：肝是人体最大的腺体器官，基本的结构和功能单位是肝小叶。

4. (A1 型题) 临床上区分直肠和肛管的解剖标志是

A. 肛瓣

B. 齿状线

C. 直肠柱

D. 肛柱

E. 肛乳头

4. 答案：B

解析：直肠与肛管交界处由肛瓣边缘与肛柱下端共同形成一条锯齿形的环行线，称齿状线。故临床上区分直肠和肛管的解剖标志是齿状线。

5. (A1 型题) 溃疡性口腔炎清洗时宜选用的漱口液是

- A. 3%过氧化氢溶液
- B. 金霉素鱼肝油
- C. 2%碳酸氢钠溶液
- D. 蒸馏水
- E. 2%利多卡因溶液

5. 答案: A

解析: 溃疡性口炎用 3%过氧化氢溶液或 0.1%利凡诺溶液清洗溃疡面, 鹅口疮患者用 2%碳酸氢钠溶液清洁口腔。疱疹性口炎局部处理局部可涂疱疹净抑制病毒, 亦可喷西瓜霜、锡类散等中药; 疼痛重者进食前在局部涂 2%利多卡因。为预防继发感染可涂 2.5%~5%金霉素鱼肝油。故正确答案为 A。

6. (A1 型题) 鹅口疮的临床表现是

- A. 口腔黏膜弥漫性充血
- B. 溃疡表面有黄白色渗出物
- C. 有发热等全身中毒症状
- D. 因疼痛出现拒乳和流涎
- E. 口腔黏膜有乳凝块样物

6. 答案: E

解析: 溃疡性口炎开始时口腔黏膜充血水肿。疱疹性口炎起病时发热, 体温达 $38^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, 浅表溃疡面覆盖黄白色纤维素性分泌物。局部疼痛、流涎、拒食、烦躁, 鹅口疮是在口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物。故正确答案为 E。

7. (A1 型题) 患儿, 6 个月。患鹅口疮 5 天, 其首优的护理诊断/问题是

- A. 疼痛, 与口腔黏膜炎症有关
- B. 营养失调, 与拒食有关
- C. 体温过高, 与感染有关
- D. 口腔黏膜改变, 与感染有关
- E. 皮肤完整性受损, 与感染有关

7. 答案: D

解析：鹅口疮为白色念珠菌感染所致，特征是口腔黏膜表面出现白色或灰白色乳凝块状物，略高于黏膜表面，粗糙无光，起初呈点状和小片状，可逐渐融合成片，形似乳凝块，不易拭去。因此护理首要问题为口腔黏膜改变，与感染有关。故选 D。

8. (A1 型题) 患儿，1 岁半。因拒食、啼哭就诊，查体：颊黏膜、牙龈、舌面处出现成簇小水疱，部分破溃成溃疡，下颌下淋巴结肿大，咽充血，诊断为疱疹性口腔炎，护士健康指导不正确的是

- A. 勤喂水
- B. 其病原体为白假丝酵母菌（白念珠菌）
- C. 饮食以微凉流质或半流质为宜
- D. 养成良好的卫生习惯
- E. 注意隔离

8. 答案：B

解析：小儿鹅口疮的病原是白色念珠菌，疱疹性口腔炎的病原是单纯疱疹病毒 I 型，溃疡性口腔炎致病菌为链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌。故 B 不正确

9. (A1 型题) 患儿女，出生后 20 天。因发热应用抗生素治疗 10 余天，查体时护士见其口腔颊黏膜有乳凝块样附着物，不易擦掉。应考虑为

- A. 疱疹性口腔炎
- B. 溃疡性口腔炎
- C. 单纯性口腔炎
- D. 鹅口疮
- E. 口角炎

9. 答案：D

解析：鹅口疮的临床表现口腔黏膜表面白色乳凝块样小点或小片状物；不痛、不流涎，不影响吃奶；颊黏膜最常见。疱疹性口腔炎表现为发热，口腔黏膜小疱疹，破溃后有黄白色纤维素性分泌物覆盖；疱疹常见于牙龈、口唇、舌。疼痛，拒食、流涎，常有颌下淋巴结肿大。溃疡性口腔炎表现为口腔黏膜充血水肿，形成糜烂或溃疡，上有灰白色假膜；疼痛、流涎、拒食，有发热，局部淋巴结肿大。根据患儿表现，应考虑为鹅口疮。

10. (A1 型题) (2015~实践能力) 患儿女, 1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

10. 答案: B

解析: 涂药后嘱患儿闭口 10 分钟后取出纱布或棉球 (2015), 并嘱患儿不可立即漱口、饮水或进食。

11. (A1 型题) 下列慢性胃炎保健指导中, 不妥的是

- A. 养成细嚼慢咽的进食习惯
- B. 戒烟忌酒
- C. 腹痛时口服阿司匹林
- D. 上腹饱胀、反酸时口服多潘立酮 (吗丁啉)
- E. 避免使用泼尼松及利血平

11. 答案: C

解析: 慢性胃炎患者指导病人加强饮食卫生和饮食营养, 养成有规律的饮食习惯; 避免过冷、过热、辛辣等刺激性食物及浓茶、咖啡等饮料; 养成细嚼慢咽的进食习惯嗜酒者应戒酒, 防止乙醇损伤胃黏膜; 注意饮食卫生。避免使用对胃黏膜有刺激的药物, 最常引起胃黏膜炎症的药物是非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等, 其机制可能是通过抑制胃黏膜生理性前列腺素的合成, 削弱其对胃黏膜的保护作用。故答案为 C。

12. (A1 型题) 慢性胃炎临床表现一般不包括

- A. 食欲不振
- B. 餐后腹胀
- C. 恶心呕吐
- D. 反酸暖气
- E. 规律性上腹痛

12. 答案: E

解析: 慢性胃炎无规律性上腹痛。慢性胃炎病程迁延, 进展缓慢, 缺乏特异性症状。大多无明显症状, 部分表现为反复或持续性上腹不适、饱胀、钝、烧灼痛, 无明显节律性, 一般进食后较重, 其次为食欲下降、嗝气、反酸、恶心等消化不良症状。这些症状用抗酸剂及解痉剂不能缓解。有部分患者无临床症状。所以, 慢性胃炎的疼痛不具规律性, 故选 E。

13. (A2 型题) 慢性胃炎患者应避免口服

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 泼尼松
- D. 多潘立酮 (吗丁啉)
- E. 甲氧氯普胺 (胃复安)

13. 答案: C

解析: 链霉素、庆大霉素损害听力。多潘立酮是胃肠动力药加速胃排空。甲氧氯普胺可止吐, 主要副反应为镇静作用, 可有倦怠、嗜睡、头晕等。其他有便秘、腹泻、皮疹及溢乳、男子乳房发育等。泼尼松长期大量服用引起柯兴氏征, 诱发神经精神症状以及消化系统溃疡、骨质疏松、生长发育受抑制、并发和加重感染, 故答案为 C。

14. (A1 型题) 慢性胃炎用多潘立酮最佳时间是

- A. 晨起时
- B. 饭前
- C. 饭后
- D. 饭中
- E. 睡前

14. 答案: B

解析: 对胃黏膜有刺激的药物或助消化药宜在饭后服用。促进睡眠的如安定等在睡前服用, 利尿药物宜晨起服用。胃肠动力药如多潘立酮, 加速胃排空, 应在饭前服。故正确答案为 B。

15. (A1 型题) 自身免疫性胃炎的病变部位多见于

- A. 胃窦部
- B. 胃体部
- C. 胃底部
- D. 胃大弯
- E. 胃小弯

15. 答案: B

解析: 自身免疫所致胃炎以富含壁细胞的胃体黏膜萎缩为主。

16. (A1 型题) 血清中抗内因子抗体阳性提示

- A. 胃泌素瘤
- B. 浅表性胃炎
- C. 多灶性萎缩性胃炎
- D. 自身免疫性胃炎
- E. 消化性溃疡

16. 答案: D

解析: 自身免疫性胃炎时, 抗壁细胞抗体和抗内因子抗体可呈阳性, 血清促胃液素水平明显升高。多灶萎缩性胃炎时, 血清促胃液素水平正常或偏低。

17. (A1 型题) 确诊慢性胃炎最可靠的依据是

- A. 胃液分析
- B. 消化道症状
- C. 胃脱落细胞检查
- D. 纤维胃镜检查
- E. 胃肠钡餐 X 线检查

17. 答案: D

解析: 胃镜及胃黏膜活组织检查是最可靠的诊断方法。通过胃镜在直视下观察黏膜病损。慢性浅表性胃炎可见红斑(点、片状或条状)、黏膜粗糙不平、出血点/斑; 慢性萎缩性胃炎可见黏膜呈颗粒状、黏膜血管显露、色泽灰暗、皱襞细小。故正确答案为 D。X 线钡餐检查对消化性溃疡诊断有确诊价值。

18. (A2 型题) 患者男, 38 岁。因上腹部胀痛、饭后暖气及反酸明显来诊。胃镜报告示慢性胃炎。下列食物适合患者食用的有

- A. 浓茶
- B. 咖啡
- C. 纯牛奶
- D. 面条
- E. 油条

18. 答案: D

解析: 慢性胃炎患者给予高热量、高维生素、及易消化的饮食。故排除 A、B、E 答案, 纯牛奶中的钙质可使刺激胃酸分泌, 不宜多饮, 故排除 C 答案。故选 D。

19. (A2 型题) 患者, 女, 34 岁, 反复中上腹饱胀不适 6 年, 无黑便和贫血。胃镜检查提示慢性胃窦胃炎伴糜烂。询问护士为明确诊断还需做哪项检查, 正确的是

- A. 大便潜血试验
- B. 幽门螺杆菌检查
- C. 胃液检查
- D. 内因子抗体检查
- E. 壁细胞抗体检查

19. 答案: B

解析: 幽门螺杆菌感染是慢性胃炎主要的病因。胃镜提示慢性胃窦胃炎伴糜烂, 再进行幽门螺杆菌检查可确定致病菌。

20. (A1 型题) 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 十二指肠球部
- B. 十二指肠降部
- C. 十二指肠乳头处
- D. 十二指肠水平部
- E. 十二指肠升部

20. 答案: A

解析: 十二指肠溃疡是消化道的常见病, 一般认为是由于大脑皮质接受外界的不良刺激后, 导致胃和十二指肠壁血管和肌肉发生痉挛, 使胃肠壁细胞营养发生障碍和胃肠粘膜的抵抗力降低, 致使胃肠粘膜易受胃液消化而形成溃疡。典型的十

十二指肠溃疡发生在十二指肠球部（A 正确），十二指肠溃疡一般不发生恶变。十二指肠溃疡发生在球部远端是很少见的，因此 B、C、D、E 均不正确。

21.（A1 型题）以下哪项是胃溃疡的特点

- A. 发病年龄多见于老年人
- B. 好发于胃大弯
- C. 上腹压痛点常在上腹偏右
- D. 疼痛多在饭后 3~4 小时发生
- E. X 线钡餐检查龛影

21. 答案：E

解析：胃溃疡多见于中老年人，A 不正确。胃溃疡多发于胃小弯和胃角，B 不正确。胃溃疡压痛点多位于中上腹偏高处，或剑突下和剑突下偏左处，C 不正确。疼痛多在餐后 1 小时内发生，经 1~2 小时后缓解，D 不正确。X 线钡餐检查龛影是胃溃疡的特点，故选 E。

22.（A2 型题）消化性溃疡患者服用制酸剂宜在

- A. 饭前 1~2 小时
- B. 饭后 1~2 小时
- C. 两餐之间
- D. 每日清晨一次
- E. 进餐时与食物同服

22. 答案：B

解析：制酸剂如氢氧化铝凝胶等，应在饭后 1h 和睡前服用。服用片剂时应嚼服故正确答案为 B。药物应在餐中或餐后即刻服用 H₂受体拮抗剂。硫糖铝片宜在进餐前 1h 服用。

23.（A1 型题）以下因素中对消化性溃疡起决定性作用的是

- A. 胃酸、胃蛋白酶增高
- B. 吸烟
- C. 饮食不当
- D. O 型血型者
- E. 全身性疾病

23. 答案：A

解析：溃疡的形成是胃壁或十二指肠壁组织被胃酸和胃蛋白酶消化的结果。这种自我消化过程是溃疡形成的直接原因。故选 A。

24. (A1 型题) 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

24. 答案：C

解析：现已公认幽门螺杆菌感染为消化性溃疡的一个重要发病原因。Hp 感染破坏了胃的粘膜屏障，使氢离子和胃蛋白酶渗入粘膜，发生自身消化作用，形成溃疡。因此，本题的正确答案是 C。

25. (A1 型题) 毕 II 式胃大部切除术，与残胃吻合的器官是

- A. 空肠近端
- B. 空肠远端
- C. 十二指肠
- D. 回肠远端
- E. 结肠远端

25. 答案：A

解析：胃空肠吻合术有两种：其一是毕 II 式胃大部切除术，即切除远端胃后缝闭十二指肠残端，残胃和空肠上段吻合。故本题选 A。

26. (A1 型题) 关于消化性溃疡的发病因素，应除外

- A. 胃酸和胃蛋白酶
- B. 非甾体类消炎药
- C. 遗传因素
- D. 持久或过度精神紧张
- E. 前列腺素

26. 答案：E

解析：消化性溃疡的发病因素：①幽门螺杆菌感染：主要病因；②非甾体类抗炎药如阿司匹林、吲哚美辛等；③胃酸和胃蛋白酶：胃酸在其中起决定性作用，是溃疡形成的直接原因；④其他因素：吸烟、遗传、胃十二指肠运动异常、应激如长期精神紧张、焦虑或情绪容易波动。故本题选 E。

27. (A1 型题) 消化性溃疡最主要的发病因素是

- A. 十二指肠肠壁薄弱
- B. 习惯性便秘
- C. 先天畸形
- D. 黏膜萎缩
- E. 幽门螺杆菌感染

27. 答案：E

解析：消化性溃疡最主要的发病因素是幽门螺杆菌感染。因此在治疗中要抑制其感染。故本题选 E。

28. (A1 型题) 胃、十二指肠溃疡急性大出血的主要表现是

- A. 剧烈上腹痛
- B. 上腹部反跳痛
- C. 大量呕血或黑便
- D. 肠鸣音活跃
- E. 血细胞比容下降

28. 答案：C

解析：胃十二指肠溃疡大出血时，可表现为大量呕血与黑粪，并有周围循环衰竭表现。故本题选 C。

29. (A2 型题) 消化道手术后，提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A. 听诊有肠鸣音
- B. 肛门排气
- C. 患者有饥饿感
- D. 患者有便意
- E. 胃管的引流量较前减少

29. 答案：B

解析：在伴有消化道的手术时，肛门排气及肠鸣音正常时提示肠蠕动恢复。可以开始进食水和流质食物。故本题选 B。

30. (A1 型题) 消化性溃疡特征性的临床表现是

- A. 黄疸
- B. 食欲下降
- C. 食欲下降
- D. 反酸、暖气
- E. 节律性和周期性上腹痛

30. 答案：E

解析：消化性溃疡以慢性病程、周期性发作、节律性上腹痛为特点。故本题选 E。

31. (A2 型题) 消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失，常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

31. 答案：D

解析：ABCE 均加重疼痛，如果疼痛失去了上述规律性，变为不定时发作，或成为持续性隐痛，或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变，则应警惕为癌变的先兆。故本题选 D。

32. (A1 型题) 关于消化性溃疡用药的叙述，不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕，用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

32. 答案：E

解析：氢氧化铝凝胶等应在餐后 1 小时或睡前服用，A 正确；西咪替丁不良反应引起头晕皮疹，B 正确；硫糖铝在酸性环境下起作用，应在餐前 1 小时给药，C 正确；奥美拉唑可引起头晕，特别是用药初期，因此初次服用应减少活动，D 正确。甲硝唑饭后半小时服用，故本题选 E。

33. (A1 型题) 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

33. 答案：D

解析：服用硫糖铝后，抑制肠道运动增加水分吸收，引起便秘，故本题选 D。

34. (A2 型题) 执行慢性胃炎患者的医嘱时，使用前应着重与医生进行沟通的药物是

- A. 消胆胺
- B. 山莨菪碱
- C. 雷尼替丁
- D. 强的松
- E. 多潘立酮

34. 答案：D

解析：强的松片最主要的副作用是降低免疫力，其次是对胃肠道有刺激，容易造成上消化道出血、大剂量易引起糖尿病。故本题选 D。

35. (A1 型题) 下列不是外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证的是

- A. 并发急性穿孔
- B. 并发急性大出血
- C. 胃溃疡恶变
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 并发瘢痕性幽门梗阻

35. 答案：D

解析：外科治疗胃十二指肠溃疡的适应证：①胃溃疡经过短期（4~6周）内科治疗无效或愈合后复发者，应在第二次复发前手术；②年龄已超过45岁的胃溃疡患者；③经X线或胃镜证实为较大溃疡（直径2.5cm以上）或高位溃疡；④不能排除或已证实有恶变者。⑤以往有一次急性穿孔或大出血病史者。所以选项D是错误的。

36. (A1型题) 消化性溃疡病在何种条件下疼痛节律会改变或消失

- A. 疲劳时
- B. 饮酒时
- C. 受凉时
- D. 焦虑时
- E. 癌变时

36. 答案：E

解析：消化性溃疡在癌变时疼痛节律会改变或消失，疼痛常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、饮酒、药物影响、气候变化等因素诱发或加重；因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。而溃疡疼痛节律性改变或消失可能是癌变的征兆，故选E。

37. (A2型题) 胃溃疡合并幽门梗阻患者的术前准备，下列哪项可减轻胃黏膜水肿

- A. 术前数日每晚用温等渗盐水洗胃
- B. 纠正脱水
- C. 纠正碱中毒
- D. 术前给予流质饮食
- E. 术前晚灌肠

37. 答案：A

解析：合并幽门梗阻病人的护理：非完全性梗阻者可进无渣半流质，输液、输血，纠正营养不良及低氯、低钾性碱中毒。持续性胃肠减压和温生理盐水洗胃有助于减轻胃组织水肿，利于术后愈合。故本题A是正确的。

38. (A2型题) 消化性溃疡患者，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。此时最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

38. 答案：A

解析：幽门梗阻使胃排空延迟，病人可感上腹饱胀不适，疼痛于餐后力重，且有反复大量呕吐，呕吐物为酸腐味的宿食，大量呕吐后疼痛可暂缓解。故正确答案为A。

39. (A2型题) 患者，男，34岁，饮酒后中上腹部闷痛不适，排柏油样大便1次。为进一步明确病情，宜选择哪项检查

- A. 血常规检查
- B. 大便常规和隐血试验
- C. 钡餐X线检查
- D. 急诊胃镜检查
- E. 插胃管，取胃液检查

39. 答案：D

解析：患者上腹不适，且排柏油样便，提示有上消化道出血。而胃镜检查是上消化道出血定位、定性诊断的首选检查方法。故本题选D。

40. (A2型题) 患者男，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑

- A. 氢氧化铝凝胶
- B. 口服补液盐
- C. 奥美拉唑
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 克拉霉素

40. 答案：B

解析：氢氧化铝是碱性药物，可中和胃酸，A正确；奥美拉唑是质子泵抑制剂，C正确；枸橼酸铋剂可保护黏膜，D正确，克拉霉素是抗生素，E正确；口服补

液盐是世界卫生组织推荐的治疗急性腹泻脱水的药物，而幽门梗阻者应禁食，输血、输液、胃肠减压。故本题选 B。

41. (A2 型题) 患者男，36 岁。胃溃疡 5 年，规律用药但依然反复发作。护士在收集资料时发现患者饮食极不规律，常暴饮暴食，每日饮酒量约 500ml。在进行健康指导时应着重给患者讲解的是

- A. 药物的不良反应
- B. 胃溃疡的并发症
- C. 合理饮食的重要性
- D. 胃溃疡的发病机制
- E. 保持情绪稳定的重要性

41. 答案: C

解析: 刺激性饮料，烈性酒除直接损伤黏膜外，还能促进胃酸过度分泌。对嗜烟酒者，劝其戒除，但应注意突然戒断烟酒可引起焦虑、烦躁，反过来也会刺激胃酸分泌，故应与病人共同制定切实可行的戒烟酒计划，并督促其执行。故本题选 C。

42. (A2 型题) 患者，男，35 岁。十二指肠溃疡病史 3 年余，急性发作 2 天。今中午饱餐后突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。该患者最可能并发了

- A. 急性胃扩张
- B. 幽门梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性穿孔
- E. 大出血

42. 答案: D

解析: 急性胃扩张主要引起反复呕吐，A 错误；幽门梗阻引起胃痛渐加重，暖气、反胃等，B 错误；急性胰腺炎腹痛，恶心，呕吐，发热，血胰酶增高等，C 错误；十二指肠溃疡易造成穿孔，突感上腹剧烈疼痛，伴肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。故本题选 D。

43. (A2 型题) 患者男, 58 岁。行动不便。3 天来反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 伴反酸暖气。电话咨询社区护士其应进行哪项检查, 社区护士的建议是

- A. 腹部平片
- B. B 超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

43. 答案: D

解析: 病人反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 考虑可能为胃溃疡, 确诊消化性溃疡的首选检查方法是胃镜。故本题选 D。

44. (A2 型题) 患者, 女, 47 岁, 因十二指肠溃疡发作急诊入院, 经治疗后症状好转出院, 对该患者进行出院健康教育, 下列哪项是错误的

- A. 养成良好的饮食习惯和卫生习惯
- B. 保持清洁、均衡饮食
- C. 腹痛发作应立即服止痛药缓解
- D. 定时服药
- E. 避免剧烈运动

44. 答案: C

解析: 腹痛发作未明确诊断前不应使用止痛药物, 可能会掩盖患者的真实病情。故本题选 C。

45. (A2 型题) 患者女, 50 岁, 确认为胃溃疡活动期, 其最可能的腹痛特点是

- A. 夜间腹痛明显
- B. 空腹时腹痛明显
- C. 餐后 1/2~1 小时腹痛明显
- D. 餐后即刻腹痛明显
- E. 进餐时腹痛明显

45. 答案: C

解析: 胃溃疡疼痛多于餐后半小时至 2 小时出现, 持续 1~2 小时, 在下次进餐前疼痛已消失, 即所谓“餐后痛”, 本题选 C。而十二指肠溃疡疼痛多于餐后 3~

4 小时出现，持续至下次进餐，进食后疼痛可减轻或缓解，故叫“空腹痛”，有的也可在夜间出现疼痛，又叫“夜间痛。”

46. (A2 型题) 患者男，22 岁，消化性溃疡患者，给予胶体次枸橼酸铋+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便，担心病情加重，行粪便隐血试验，报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋不良反应

46. 答案：E

解析：选项 A、B 化验便隐血试验结果是阳性，但本患者粪便隐血试验阴性，排除 A、B；而 C、D 是不会影响大便的颜色的，选项 E 在服用期间会出现大便颜色呈灰褐色便，一般停药后会恢复正常的，故本题选 E。

47. (A2 型题) 患者女，63 岁。胃穿孔修补术后，为预防发生粘连性肠梗阻，应指导患者

- A. 早期取半卧位
- B. 早期离床活动
- C. 早期进食
- D. 保持排便通畅
- E. 多饮水

47. 答案：B

解析：肠道手术后鼓励患者早期下床活动，促进肠蠕动恢复，防止肠粘连，也可预防下肢静脉血栓的形成。故本题选 B。

48. (A2 型题) 患者，女性，56 岁，胃窦部多发溃疡，今日患者在硬膜外麻醉下行胃大部切除术，术后安返病房。病区护士在术后的 12 小时内，应注意观察的并发症是

- A. 吻合口瘘
- B. 吻合口炎症

- C. 吻合口出血
- D. 近侧空肠段梗阻
- E. 十二指肠残端瘘

48. 答案: C

解析: 胃大部切除术的术后并发症包括吻合口出血、十二指肠残端破裂、吻合口破裂或吻合口瘘、胃排空障碍、术后梗阻、倾倒综合征等, 但 12 小时内会出现的并发症多是吻合口出血, 短期内从胃管不断引流出新鲜血液, 甚至出现呕血和黑便。故本题选 C。

49. (A2 型题) 患者, 女性, 47 岁, 胃十二指肠溃疡, 手术后第 7 天护士发现患者出现高热、寒战, 右上腹疼痛, 伴有呃逆, 该护士首先考虑患者并发了

- A. 膈下脓肿
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 吻合口瘘
- E. 切口感染

49. 答案: A

解析: 上述的术后并发症虽然都会出现高热、寒战等表现, 但伴有呃逆是膈下脓肿所特有的表现, 因此考虑并发膈下脓肿。故本题选 A。

50. (A2 型题) 患者, 男性, 42 岁, 十二指肠溃疡病 10 年。近 2 个月来, 上腹胀满不适, 伴反复呕吐酸臭味宿食。术前诊断最可靠的检查是

- A. X 线钡剂造影
- B. 血培养
- C. MRI
- D. 纤维胃镜
- E. 腹部 CT

50. 答案: D

解析: 胃镜检查是确诊消化性溃疡的首选检查方法。胃镜检查可直接观察溃疡部位、病变大小、性质。同时, 患者反复呕吐酸臭味宿食, 可能并发幽门梗阻, 胃镜检查可见胃内大量潴留的胃液和食物残渣。故本题选 D。

51. (A2 型题) 患者, 男性, 47 岁, 胃大部切除术后 4 天。观察发现: 患者体温 38.6℃, 切口红肿、疼痛。该患者最可能出现的情况是

- A. 切口裂开
- B. 切口感染
- C. 膈下脓肿
- D. 肺部感染
- E. 吻合口破裂

51. 答案: B

解析: 患者体温升高, 局部红肿、疼痛皆属于感染症状, 由于是在切口处发生红肿、疼痛, 考虑为切口感染。故本题选 B。

52. (A2 型题) 患者男, 患消化性溃疡 10 余年, 饮酒 30 分钟后出现剧烈上腹部疼痛。诊断为急性胃穿孔, 首要护理措施为

- A. 立即应用镇痛剂
- B. 立即输血
- C. 禁食和胃肠减压
- D. 安慰并陪伴病人
- E. 立即补液

52. 答案: C

解析: 消化道溃疡并发穿孔时, 应立即禁食并予以胃肠减压, 以减少对胃的刺激。急性穿孔是消化性溃疡最严重的并发症之一, 溃疡深达浆膜层时, 可突然穿透而发生急性穿孔, 以胃窦小弯及十二指肠球部前壁溃疡多见。故选 C。

53. (A2 型题) 患者, 女性, 37 岁, 胃大部切除术后第 3 天, 肠蠕动未恢复, 护士查体发现患者腹胀仍非常明显, 该护士给予患者最有效的护理措施是

- A. 增加床上活动
- B. 胃肠减压
- C. 腹部热敷
- D. 肛管排气
- E. 环行按摩腹部

53. 答案: B

解析：术后患者肠蠕动尚未恢复，出现腹胀，首先进行胃肠减压，将胃肠道内的气体和液体吸出，可有效减轻腹胀、降低肠腔内压力。故本题选 B。

54. (A2 型题) 患者，男性，53 岁，患有胃溃疡出血，经治疗出血停止，病情缓解，粪便隐血试验阴性。如果患者再次发生呕血时，护士应为其采取的体位是

- A. 平卧位，头偏向一侧
- B. 头低足高位
- C. 截石位
- D. 平卧屈膝位
- E. 半坐卧位

54. 答案：A

解析：发生呕血时，应嘱患者平卧位，头偏一侧，防止窒息或误吸，同时，要清除气道内的异物，保持呼吸道通畅。故本题选 A。

55. (A2 型题) 患者，女性，48 岁，毕 II 式胃大部切除术后 36 小时，突发右上腹剧烈疼痛伴腹膜刺激征。外科护士应首先考虑

- A. 术后胃出血
- B. 输入襻梗阻
- C. 低血糖综合征
- D. 碱性反流性胃炎
- E. 十二指肠残端破裂

55. 答案：E。

解析：十二指肠残端破裂多发生在术后 24~48 小时，临床表现为突发性上腹部剧痛、发热和腹膜刺激征，该患者的临床表现符合十二指肠残端破裂。故本题选 E。

56. (A2 型题) 患者，女，50 岁，胃大部切除术后 2 周。进食 10~20 分钟后出现上腹饱胀、恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发了

- A. 吻合口炎症
- B. 吻合口梗阻
- C. 倾倒综合征
- D. 低钾血症

E. 代谢性酸中毒

56. 答案: C

解析: 倾倒综合征是指在胃部手术后病人有时会在饭后 10~30 分钟出现上腹部胀痛, 恶心, 呕吐, 肠鸣, 有排便感, 腹泻, 病人可同时出现眩晕、头昏、大量出汗, 面色潮红或苍白, 极度软弱, 心动过速, 甚至血压下降。多出现于术后 1~3 周, 多在病人进食半流质饮食时出现, 特别是进食加糖的牛奶时更易出现, 症状多持续 1 小时, 然后自行缓解。与患者的症状符合, 所以选择 C。

57. (A2 型题) 患者, 男性, 34 岁, 因十二指肠溃疡行毕氏 II 式手术。术后 8 天进食, 进食后出现上腹部饱胀感, 后出现呕吐, 呕吐物为食物和胆汁。护士根据患者的情况, 考虑其出现了

- A. 幽门梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输入段梗阻
- D. 输出段梗阻
- E. 十二指肠溃疡复发

57. 答案: D

解析: 胃大部切除术术后梗阻包括输入段梗阻、输出段梗阻和吻合口梗阻, 前两者常见于毕氏 II 式手术。输入段梗阻呕吐物不含胆汁; 吻合口梗阻呕吐物为食物, 不含胆汁; 输出段梗阻呕吐食物和胆汁。故本题选 D。

58. (A2 型题) 患者, 男性, 60 岁, 2 年前无明显诱因出现柏油样便, 伴头晕、乏力, 给予奥美拉唑治疗, 每次发作时伴有上腹胀痛, 多在餐后半小时发生, 近 3 个月来食欲较差, 体重下降, 上腹痛时轻时重, 疼痛逐渐加重, 不易缓解, 可考虑

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡伴出血
- C. 胃溃疡癌变
- D. 胰腺癌
- E. 胃穿孔

58. 答案: C

解析：上腹胀痛多在餐后半小时发生，可考虑为胃溃疡，现患者体重下降，食欲较差，且疼痛不已缓解，符合进展期胃癌的表现。故本题选 C。

59. (A2 型题) 患者男，35 岁。胃肠道术后第 1 天尚未排气，但患者感觉饥饿要求进食，护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 告知其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

59. 答案：C

解析：胃肠道术后尚未排气不可进食，但应告知患者其原因。排气是肠蠕动恢复的标志，排气之后可拔除胃管，饮少量水或米汤。肠蠕动未恢复前进食会加重病情。故本题选 C。

60. (A1 型题) 溃疡性结肠炎最常见的临床表现为

- A. 腹痛
- B. 腹泻
- C. 腹水
- D. 腹胀
- E. 发热

60. 答案：B

解析：溃疡性结肠炎起病缓慢，腹泻是最常见症状、便血是溃疡性结肠炎最初的主要症状之一。腹痛，轻型和缓解期患者可无此症状，慢性反复发作的患者常有腹痛。伴食欲不振与恶心呕吐，可有腹部体征。故本题答案为 B。

61. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的好发部位

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 乙状结肠
- E. 盲肠

61. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎病变呈连续非节段性分布，主要位于直肠和乙状结肠。故本题选 D。

62. (A1 型题) 溃疡性结肠炎病变常见的累及部位是

- A. 直肠和结肠
- B. 回盲部
- C. 盲肠
- D. 结肠
- E. 升结肠

62. 答案：A

解析：溃疡性结肠炎病变主要累及直肠和乙状结肠，可扩展至降结肠、横结肠，少数可累及全结肠。故本题选 A。

63. (A1 型题) 溃疡性结肠炎的临床表现应除外

- A. 腹痛-便意-便后缓解
- B. 左下腹有压痛
- C. 易形成肠腔狭窄
- D. 易形成肠瘘
- E. 少数可癌变

63. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎腹痛位于左下腹或下腹，B 正确。有疼痛-便意-排便后缓解的规律；A 正确。病变一般仅局限于黏膜和黏膜下层，溃疡愈合形成瘢痕，结肠变形缩短、结肠袋消失，甚至结肠变窄；C 正确。少数病例可有结肠癌变，以恶性程度高的未分化型多见。E 正确。克罗恩病易形成肠瘘，故本题选 D。

64. (A2 型题) 患者，男，49 岁，溃疡性结肠炎病史 11 年余，近 1 周来腹痛加剧，每天排便 20 余次，呈血水样。下列饮食指导哪项正确

- A. 多喝牛奶
- B. 多吃新鲜水果
- C. 多吃含纤维素蔬菜
- D. 暂禁食

E. 多喝果汁

64. 答案：D

解析：溃疡性结肠炎急性发作期病人，应进流质或半流质饮食，病情严重者应禁食，按患者每天排便 20 余次，呈血水样，属重型溃疡性结肠炎，病情严重应暂禁食。故本题选 D。

65. (A2 型题) 患者，男，30 岁，黏液脓血便伴里急后重 2 年，诊断为溃疡性结肠炎。近 1 周腹痛加重伴发热入院治疗。护士遵医嘱为患者保留灌肠治疗，患者应采取的体位是

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位
- E. 半卧位

65. 答案：B

解析：因溃疡性结肠炎病变部位一般为直肠和乙状结肠，所以选择左侧卧位，更有利于疾病的治疗，灌肠治疗时全身不良反应较少。故本题选 B。

66. (A2 型题) 患者，女，40 岁，反复排黏液便 2 年，曾确诊溃疡性结肠炎，不规则治疗，症状间断出现。近 1 个月再发，日排便 2~3 次，入院时体温 36.5℃，脉搏 72 次/分，腹软，左下腹轻压痛。血沉 15mm/h，血红蛋白 98g/L。根据病程经过，本患者分型属于

- A. 初发型
- B. 慢性复发型
- C. 慢性持续型
- D. 急性暴发型
- E. 急性复发型

66. 答案：B

解析：慢性复发型症状较轻，临床上最多见，发作期与缓解期交替。患者反复排黏液便 2 年，不规则治疗，症状间断出现，近 1 月再发，排便 2~3 次，故判断为慢性复发型。故本题选 B。

67. (A2 型题) 患者女, 32 岁。患溃疡性结肠炎 3 年, 急性加重 2 周入院。入院后护士评估患者的粪便形态最可能发现的是

- A. 米泔水样便
- B. 柏油便
- C. 粘液脓血便
- D. 白陶土样便
- E. 黄色软便

67. 答案: C

解析: 粘液脓性或脓血便常见于溃疡性结肠炎的病人, 故 C 正确。米泔水样便常见于霍乱, 故 A 不正确。柏油便常见于各种原因导致的上消化道出血, 如消化性溃疡、肝硬化等, 故 B 不正确。白陶土样便常见于梗阻性黄疸的病人, 故 D 不正确。黄色软便是正常粪便, 故不选 E。

68. (A1 型题) 婴儿腹泻的病因, 下列哪项是错误的

- A. 肠道内感染
- B. 喂养不当
- C. 消化系统发育不成熟
- D. 血液中 IgG 偏低
- E. 肠道外感染

68. 答案: D

解析: 小儿腹泻的病因包括: ①婴幼儿消化系统发育尚未成熟, 不能适应食物量和量的较大变化, 容易发生消化道功能紊乱 (C 正确); ②生长发育快, 胃肠道负担重; ③机体防御功能差: a. 婴儿胃酸偏低, 胃排空较快, 对进入胃内的细菌杀灭能力较弱; b. 血清免疫球蛋白 (尤其是 IgM、IgA) 和胃肠道分泌型 IgA 均较低 (D 错误); ④肠道菌群失调: 新生儿生后尚未建立正常肠道菌群时, 改变饮食使肠道内环境改变时、或滥用广谱抗生素时, 均可使肠道正常菌群的平衡失调, 而患肠道感染 (A 正确); ⑤人工喂养不当 (B 正确)。故本题 A、B、C、E 均正确, 错误的是 D。

69. (A1 型题) 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是

- A. 空肠弯曲菌

- B. 大肠埃希菌
- C. 埃可病毒
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

69. 答案: D

解析: 病毒感染。寒冷季节的婴幼儿腹泻 80% 由病毒感染引起。小儿病毒性肠炎的主要病原是引起秋季腹泻的轮状病毒, 其次有诺沃克病毒、腺病毒等。因此, 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是轮状病毒。

70. (A1 型题) 区别轻、重型婴儿腹泻的主要指标是

- A. 病程长短
- B. 热度高低
- C. 排便次数
- D. 呕吐次数
- E. 有无水、电解质紊乱

70. 答案: E

解析: 重型腹泻多为肠道内感染所致。起病常比较急, 也可由轻型逐渐加重而致。除有较重的胃肠道症状外, 还有明显的脱水、电解质紊乱及全身中毒症状, 如发热、烦躁、精神萎靡、嗜睡甚至昏迷、休克。故正确答案为 E。

71. (A1 型题) 下列哪项符合婴儿腹泻中度脱水的临床表现

- A. 昏睡或昏迷
- B. 眼窝凹陷
- C. 皮肤弹性极差
- D. 四肢厥冷, 无尿
- E. 体重下降 10% 以上

71. 答案: B

解析: 昏睡或昏迷、皮肤弹性极差、四肢厥冷, 无尿、体重下降 10% 以上属于重度脱水的临床表现; 符合婴儿腹泻中度脱水的是烦躁或萎靡、眼窝凹陷、皮肤弹性差、尿量少、体重下降 5%~10%。故本题选 B。

72. (A1 型题) 轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点不包括

- A. 多发生在秋、冬季
- B. 常伴上呼吸道感染症状
- C. 常伴腹痛、里急后重
- D. 全身感染中毒症状不明显
- E. 大便无腥臭味

72. 答案: C

解析: 轮状病毒肠炎又称秋季腹泻, 其临床特点是常伴有上呼吸道感染症状, 全身中毒症状不明显, 大便黄色水样或蛋花汤样, 无腥臭味。腹痛、里急后重不属于轮状病毒肠炎临床特点, 故选 C。其余答案均属于轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点。

73. (A1 型题) 10 月龄患儿患病毒性肠炎入院, 不宜进食的食物有

- A. 母乳
- B. 纯牛乳
- C. 发酵乳
- D. 去乳糖配方乳
- E. 豆制代乳品

73. 答案: B

解析: 病毒性肠炎多继发双糖酶(主要为乳糖酶)缺乏不宜用蔗糖, 应暂停乳类喂养, 改为豆制代乳品、去乳糖配方奶或发酵奶喂养。故本题选 B。

74. (A1 型题) 护士为腹泻小儿采取的饮食疗法, 不包括

- A. 脱水患儿需禁食 2 天
- B. 严重呕吐者暂禁食 4~6 小时, 不禁水
- C. 停喂不消化和脂肪类食物
- D. 人工喂养者可喂米汤、酸奶等
- E. 病毒性肠炎者以豆制代乳品, 可减轻腹泻

74. 答案: A

解析: 小儿腹泻应控制腹泻次数, 预防继续失水; 调整饮食、继续进食是必要的治疗与护理措施。不需要禁食, 故本题选 A。

75. (A1 型题) 小儿腹泻伴严重脱水的主要表现是

- A. 发热
- B. 水样便
- C. 频繁呕吐
- D. 大便次数明显增多
- E. 有水、电解质紊乱

75. 答案: E

解析: 小儿腹泻典型表现为大便次数增多, 大便性状改变, 但伴严重脱水, 水电解质紊乱是其主要表现, 故本题选 E。

76. (A1 型题) 疝修补术后病人护理错误的是

- A. 及时处理粪便秘结
- B. 切口部位压沙袋
- C. 咳嗽时注意保护切口
- D. 术后 3 个月内避免重体力劳动
- E. 鼓励病人早期下床活动

76. 答案: E

解析: 疝修补术后病人护理: 体位与活动: 平卧 3 日, 膝下垫一软枕, 使髋关节微屈, 减少腹壁张力。一般于术后 3~5 天可考虑离床活动。防止剧烈咳嗽: 术后剧烈咳嗽可引起腹内压升高, 不利于愈合。因此术后需注意保暖, 防止受凉而引起咳嗽; 指导病人在咳嗽时用手掌按压、保护切口, 以免缝线撕脱造成手术失败。保持排便通畅: 给予便秘者通便药物, 嘱病人避免用力排便。积极处理尿潴留。病人出院后逐渐增加活动量, 3 个月内应避免重体力劳动或提举重物。故答案为 E。

77. (A1 型题) 对于小儿脱水补液的正确方法应除外

- A. 轻、中度脱水可口服补液
- B. 中、重度脱水应选静脉补液
- C. 重度伴休克者先扩容
- D. 补充累积丢失量, 滴速为 $5\text{ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$
- E. 继续损失量和生理需要量在 12~16 小时滴完

77. 答案: D

解析：补充累计损失量补液的速度取决于脱水的程度，原则上先快后慢。累计损失量应在 8~12 小时内补足，滴速约为每小时 8~10ml/kg。故本题选 D。

78. (A1 型题) 小儿补钾时每日补钾总量静脉滴注时间不应短于

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时
- E. 12 小时

78. 答案：C

解析：重症患儿需静脉补钾，每日剂量 4~6mmol/kg，浓度 ≤40mmol/L，静脉补钾时间不少于 8 小时，见尿补钾。故本题选 C。

79. (A1 型题) 小儿低渗性脱水多见于

- A. 饮水不足
- B. 腹泻伴高热
- C. 腹泻时口服大量盐水
- D. 输入电解质溶液过多
- E. 营养不良伴长期腹泻者

79. 答案：E

解析：低渗性脱水，电解质的丢失大于水的丢失，血浆渗透压低于正常，营养不良伴慢性腹泻、腹泻时补充非电解质溶液过多等情况时容易发生。故本题选 E。

80. (A1 型题) 属于 1/2 张的液体是

- A. 1: 1 溶液
- B. 1: 2 溶液
- C. 1: 2: 3 溶液
- D. ORS 溶液
- E. 9%氯化钠溶液

80. 答案：A

解析：1 份生理盐水和 1 份 5%~10%的葡萄糖混合液的张力为 1/2，应用于轻中度的等渗性脱水。故本题选 A。

81. (A1 型题) 小儿高渗性脱水发生惊厥的原因是

- A. 休克
- B. 脑水肿
- C. 循环衰竭
- D. 细胞内脱水
- E. 细胞外脱水

81. 答案: D

解析: 高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失, 血浆渗透压高于正常, 细胞外液渗透压高, 水从细胞内进入细胞外, 细胞内缺水, 表现为剧烈口渴、高热、烦躁不安、肌张力增高, 甚至发生惊厥。故本题选 D。

82. (A1 型题) 下列哪项不是生理性腹泻的临床特点

- A. 多见于出生 6 个月以内婴儿
- B. 大便次数增多
- C. 添加辅食后大便多逐渐转为正常
- D. 生长发育低于正常
- E. 小儿虚胖, 常伴湿疹

82. 答案: D

解析: 生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿, 外观虚胖, 常伴湿疹, 生后不久即出现腹泻。一般无其他症状, 食欲好, 生长发育正常, 添加辅食后, 大便即逐渐转为正常。不符合生理性腹泻的是生长发育低于正常, 故本题选 D。

83. (A1 型题) 以下哪项不是小儿低血钾的临床表现

- A. 腹胀
- B. 全身乏力
- C. 心率减慢
- D. 心音低钝
- E. 肠鸣音减弱

83. 答案: C

解析: 低血钾表现: 精神萎靡、全身无力、腱反射减弱或消失、腹胀、肠鸣音减弱或消失、心肌收缩无力、心音低钝、血压降低、肾脏损害。故本题选 C。

84. (A1 型题) 高渗性脱水血清钠的浓度为

- A. 90mmol/L
- B. 100mmol/L
- C. 110mmol/L
- D. 120mmol/L
- E. 150mmol/L

84. 答案: E

解析: 高渗性脱水水丢失的比例大于电解质的丢失, 血清钠的浓度 150mmol/L, 血浆渗透压高于正常。故本题选 E。

85. (A1 型题) 对于腹泻并伴脱水的患儿, 首选的检查项目是

- A. B 超
- B. 血常规
- C. 心电图
- D. 血电解质
- E. 胸部 X 线检查

85. 答案: D

解析: 小儿腹泻并伴脱水, 应重点查血电解质, 进行血液生化检查, 血钠测定可提示脱水的性质, 血钾测定可反应体内缺钾的程度, 碳酸氢盐测定可了解酸碱失衡性质和程度。故首选的检查项目为血电解质。故本题选 D。

86. (A1 型题) 护理腹泻患儿时, 哪项措施不正确

- A. 详细记录出入量
- B. 加强臀部护理
- C. 腹胀时应注意有无低钾血症
- D. 急性腹泻早期应使用止泻剂
- E. 呕吐频繁者应禁食、补液

86. 答案: D

解析: 腹泻患儿由于腹泻、呕吐和摄入不足导致体液不足, 因详细记录出入量, 呕吐频繁者禁食, 进行补液。低血钾可引起胃肠道蠕动缓慢, 出现腹胀。腹泻患儿应加强臀部皮肤的护理。约 70% 的患儿表现为病毒及非侵袭性细菌所致的水

样便腹泻，一般不用抗生素，应合理使用液体疗法，选用微生态制剂和粘膜保护剂；另外约占 30% 的患儿为侵袭性细菌感染所致的粘液、脓血便患者，应根据临床特点，结合大便细菌培养和药敏试验结果选用针对病原菌的抗生素，并随时进行调整。避免用止泻剂。故答案为 D。

87. (A1 型题) 腹泻患儿“有皮肤完整性受损的危险”，其下列护理哪项不妥

- A. 会阴皱褶处不能经常清洗
- B. 便后用温水清洗臀部并拭干
- C. 选用柔软、清洁的尿布
- D. 更换尿布时动作轻柔
- E. 避免使用塑料布包裹

87. 答案：A

解析：腹泻患儿排便次数明显增多，会阴部污染也明显加重，腹泻时排出的粪便对皮肤刺激较大，若皮肤完整性受损则更易导致微生物进入体内引发感染危险。因此，要经常清洗会阴皱褶处。故本题 A 错误，其余选项均为正确的护理原则，本题选 A。

88. (A1 型题) 重型腹泻患儿呕吐频繁时，禁食的时间一般为

- A. 6 小时
- B. 8 小时
- C. 10 小时
- D. 12 小时
- E. 14 小时

88. 答案：B

解析：限制饮食过严或禁食过久常造成营养不良，并发酸中毒，造成病情迁延不愈而影响生长发育，故脱水患儿除严重呕吐者暂禁食 8 小时（不禁水）外均应继续进食。因此禁食时间为 8 小时，本题应选 B。

89. (A1 型题) 需配置 1:1 液 200ml，其配制方法为 5% 葡萄糖液 100ml 中应加入生理盐水多少毫升

- A. 50ml
- B. 100ml

- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 250ml

89. 答案: B

解析: 1:1 含钠液的配置方法是一份 5%或 10%葡萄糖中加入一份 0.9%氯化钠, 因此 200ml 的 1:1 液 200ml 应在 100ml 15%葡萄糖液中应加入生理盐水 100ml。故本题正确答案为 B。

90. (A1 型题) 患儿, 女, 15 个月, 发热、腹泻 1 天, 尿少半天, 院外补液治疗, 护士对患儿家长的用药指导正确的是服用

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 葡萄糖溶液
- D. 口服补液盐
- E. 2:1 等张含钠液

90. 答案: D

解析: 口服补液盐是 WHO 推荐用以治疗急性腹泻合并脱水的口服液, 适用于轻、中度脱水的患儿。由本题知, 患儿腹泻 1 天, 尿少, 患儿属于轻、中度腹泻, 故本题选 D。

91. (A1 型题) 某 9 个月男婴, 腹泻 2 天, 大便每日 15~16 次, 蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括

- A. 精神状态
- B. 尿量
- C. 肠鸣音
- D. 皮肤弹性
- E. 前囟

91. 答案: C

解析: 脱水程度一般从神志, 眼窝及前囟, 皮肤弹性, 尿量, 口腔黏膜, 休克症状, 失水量占体重比例等几个方面进行评估, 不包括肠鸣音。故本题选 C。

92. (A1 型题) 患儿女, 3 个月, 轻型腹泻, 家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的

- A. 体温
- B. 呼吸
- C. 尿量
- D. 肛周皮肤
- E. 每日大便次数

92. 答案: D

解析: 患儿轻型腹泻, 应指导家长保持患儿臀部的清洁干燥, 勤换尿布, 每次便后用温水清洗臀部及会阴部并吸干; 评估患儿的皮肤情况, 观察皮肤的颜色及表皮有无破损。故本题选 D。

93. (A1 型题) 患儿女, 3 岁。半年来“感冒”反复发作, 家长多次自行给予“阿司匹林”、“头孢拉定”、“阿莫西林”、“罗红霉素”等药物治疗。5 天前患金黄色葡萄球菌肠炎入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调

- A. 合理喂养
- B. 注意饮食卫生
- C. 多进行户外活动
- D. 注意儿童个人卫生
- E. 滥用抗生素的严重后果

93. 答案: E。

解析: 滥用抗生素在杀死有害细菌的同时, 也会杀死人体内的有益菌群, 最终导致菌群失调、二重感染或者真菌感染, 患者出现腹泻。故选 E。

94. (A1 型题) 患儿, 男, 7 个月, 诊断“婴儿腹泻”, 在脱水酸中毒纠正后, 出现手足抽搐, 遵医嘱首选下列哪种药物治疗

- A. 生理盐水
- B. 地塞米松
- C. 10%氯化钾
- D. 静脉给地西洋
- E. 10%葡萄糖酸钙

94. 答案：E

解析：患儿在纠正脱水酸中毒的同时应注意补钾、补钙。在脱水、酸中毒时，由于血液浓缩和钙离子增加，可不出现低钙表现；在脱水、酸中毒纠正后，离子钙减少，出现低钙症状，表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

95. (A1 型题) 患儿，女，4 个月。出生后不久开始腹泻，大便每天 5~6 次，神志清楚，营养中等，面部见湿疹，大便常规正常。患儿最可能发生了

- A. 婴儿腹泻
- B. 迁延性肠炎
- C. 病毒性肠炎
- D. 生理性腹泻
- E. 真菌性肠炎

95. 答案：D

解析：生理性腹泻多见于出生 6 个月以内的婴儿，患儿外观虚胖，常伴湿疹，出生后不久开始腹泻，食欲好，生长发育正常。本题患儿表现符合生理性腹泻的表现，故本题选 D。

96. (A1 型题) 患儿，1 岁，因小儿腹泻，中度脱水入院。经 2 日的补液治疗后脱水得到纠正，今日突然出现惊厥，护士首先应考虑的原因是

- A. 脑炎
- B. 低血糖
- C. 低钠血症
- D. 维生素 D 缺乏
- E. 低钙血症

96. 答案：E

解析：在脱水、酸中毒时，由于血液浓缩和钙离子增加，可不出现低钙表现；在脱水、酸中毒纠正后，离子钙减少，出现低钙症状，表现为抽搐或惊厥。故本题选 E。

97. (A1 型题) 患儿，男，4 岁，因腹泻，呕吐 2 天入院。经 6 小时补液后，护士发现患儿眼睑水肿明显，判断可能的原因是

- A. 酸中毒未改善

- B. 碱中毒未改善
- C. 补液量不足
- D. 输入葡萄糖注射液过多
- E. 输入电解质溶液过多

97. 答案: E

解析: 补液后若患儿出现眼睑水肿, 可能是电解质溶液比例过高, 应及时通知医生调整补液。故本题选 E。

98. (A1 型题) 单纯性机械性肠梗阻的临床特点是

- A. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进
- B. 持续性绞痛, 频繁呕吐
- C. 持续性剧痛, 腹胀不对称
- D. 持续性胀痛, 肠鸣音消失
- E. 腹胀明显, 肛门停止排气

98. 答案: A

解析: 单纯性机械性肠梗阻指各种机械性原因引起的肠腔变窄, 肠内容物通过受阻。因此单纯性机械性肠梗阻的临床表现主要为阵发性绞痛, 体检出现肠型与蠕动波, 压痛, 无腹膜刺激征, 肠鸣音亢进, 出现气过水声或金属声。故本题对于单纯性机械性肠梗阻的临床特点应选择 A。

99. (A1 型题) 肠梗阻时, 胃肠减压的液体为血性时, 首先考虑

- A. 肝破裂
- B. 肠管绞窄坏死
- C. 并发胆道出血
- D. 胃肠减压管刺破胃黏膜
- E. 凝血机制的障碍

99. 答案: B

解析: 胃肠减压: 清除肠腔内积气、积液, 有效缓解腹胀、腹痛。胃肠减压期间应注意保持负压吸引通畅, 密切观察并记录引流液的性状及量, 若抽出血性液体, 应高度怀疑绞窄性肠梗阻。故正确答案为 B。

100. (A1 型题) 肠梗阻的表现不包括

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 停止排气、排便
- D. 腹泻
- E. 呕吐

100. 答案: D

解析: 肠梗阻的共性表现有: 腹痛、呕吐、腹胀及停止排便排气。因此答案为 D。

(五)

1. (A1 型题) 慢性阻塞性肺气肿的病理改变不包括

- A. 肺过度膨胀
- B. 外观苍白或灰白
- C. 镜检可见肺大泡
- D. 肺血供增多
- E. 弹力纤维网破坏

1. 答案: D

解析: COPD 的病理改变主要为慢性支气管炎和肺气肿的病理改变。肺气肿的病理改变可见肺过度膨胀, 弹性减退。外观灰白或苍白。镜检见肺泡壁变薄, 肺泡腔扩大、破裂或形成大疱, 血液供应减少, 弹力纤维网破坏。故本题选 D。

2. (A1 型题) 静脉注射氨茶碱速度要慢, 否则可出现

- A. 皮肤潮红、头痛、恶心
- B. 心律失常、血压下降
- C. 四肢麻木、腰酸背痛
- D. 支气管痉挛, 喉头水肿
- E. 耳鸣和高血压

2. 答案: B

解析: 氨茶碱的有效剂量和中毒剂量比较接近, 因此静脉注射时一定要缓慢, 否则可能会出现中毒症状, 如烦躁、呕吐、定向力差、心率失常、血压下降等, 严重的甚至会死亡。故本题选 B。

3. (A1 型题) 应用氨茶碱时, 以下哪项是错误的

- A. 饭后口服可减轻胃肠道反应
- B. 不宜肌内注射
- C. 静脉注射浓度不宜过高
- D. 注射时间不宜超过 10 分钟
- E. 急性心肌梗死者禁用

3. 答案：D

解析：氨茶碱饭后服用可以减轻胃肠道反应。氨茶碱的有效剂量与中毒剂量接近，故静脉注射时一定要缓慢，浓度不宜过高，注射时间不得短于 10 分钟。肌内注射氨茶碱会引起局部药物的蓄积，可能发生中毒现象。而有心律失常、严重心脏病、充血性心力衰竭、肝肾疾病、高血压、甲亢、严重低氧血症、活动性消化道溃疡、癫痫病等症状的患者禁用氨茶碱。故本题选 D。

4. (A1 型题) 遵医嘱应用氨基糖苷类抗生素治疗，应监测的实验室指标是

- A. 血清钾
- B. 血清钙
- C. 肝功能
- D. 肾功能
- E. 白细胞计数

4. 答案：D

解析：氨基糖苷类抗生素有肾、耳毒性，老年人或肾功能减退者应特别注意有无耳鸣、头晕、唇舌发麻等不良反应。故本题选 D。

5. (A1 型题) 闭式胸膜腔引流的护理，不正确的是

- A. 注意无菌操作
- B. 确保管道密封
- C. 妥善固定
- D. 注意水柱波动
- E. 搬运病人时水封瓶应高于胸腔引流口

5. 答案：E

解析：搬动病人时，应注意保持引流瓶低于胸膜腔，以免瓶内液体倒流，导致感染；对有气体逸出的病人，需始终保持引流管通畅，绝不可随意夹管。故选 E。

6. (A1 型题) 如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带, 下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断

- A. 心脏移位
- B. 左心缘透亮度增高, 左膈压低
- C. 肺大疱
- D. 两肺透亮度增高
- E. 肋间隙增宽

6. 答案: A

解析: 闭合性气胸、开放性气胸、张力性气胸皆有气管向健侧移位, 同时开放性气胸会出现纵隔扑动, 出现心脏的移位。故本题选 A。

7. (A1 型题) 小儿支气管肺炎最主要的病理生理改变是

- A. 低氧血症
- B. 心力衰竭
- C. 代谢性酸中毒
- D. 二氧化碳潴留
- E. 病原体毒素作用

7. 答案: A

解析: 病原体侵入肺部后, 引起支气管黏膜水肿, 管腔狭窄; 肺泡壁充血、水肿, 肺泡腔内充满炎性渗出物, 从而影响肺通气和肺换气。通气不足引起低氧血症及高碳酸血症; 换气功能障碍则主要引起低氧血症。由于低氧血症, 患儿出现呼吸与心率增快; 为增加呼吸深度, 呼吸辅助肌也参与活动, 出现鼻翼扇动和三凹征。故本题选 A。

8. (A1 型题) 改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是

- A. 持续高流量吸氧
- B. 按时使用有效抗生素
- C. 呼气终末正压通气
- D. 避免输液过量过快
- E. 鼓励深呼吸和排痰

8. 答案: C

解析：成人急性呼吸窘迫综合征最佳的呼吸治疗为呼气终末正压通气，其目的在于使肺泡在整个呼吸周期保持开放，使塌陷的肺泡重新通气，将水肿液从肺泡内移向间质。故本题选择 C。

9. (A1 型题) 护士对肺炎患儿采取的护理措施应除外

- A. 鼓励患儿多饮水，防止痰液黏稠不易咳出
- B. 密切观察患儿体温
- C. 尽量避免患儿哭闹，减少氧的消耗
- D. 喘憋较重时镇静平卧
- E. 严密观察病情，及时发现并发症

9. 答案：D

解析：喘憋严重时不能使用镇静药，会无力排出痰液从而加重呼吸困难，同时，患儿呼吸困难时，应取半坐卧位，是膈肌下移来改善呼吸。故本题选 D。

10. (A1 型题) 急性呼吸衰竭患儿低氧血症的表现哪一项除外

- A. 发绀
- B. 食欲不振
- C. 心律失常
- D. 皮肤苍白
- E. 肾衰竭

10. 答案：D

解析：低氧血症表现：发绀；神经系统：烦躁、易激惹，神志模糊、嗜睡；循环系统：血压升高、心率增快、心律不齐；肾功能障碍：少尿或无尿，尿中可有蛋白、红细胞、白细胞、管型，甚至发生肾功能衰竭；消化系统：可有食欲减退、恶心等胃肠道表现，严重时可能出现消化道出血。故本题选 D。

11. (A1 型题) II 型呼吸衰竭血气分析正确的是

- A. $PaO_2 \leq 50\text{mmHg}$, $PaCO_2$ 正常
- B. PaO_2 正常, $PaCO_2 \geq 50\text{mmHg}$
- C. $PaO_2 \leq 60\text{mmHg}$, $PaCO_2 \geq 50\text{mmHg}$
- D. $PaO_2 \geq 50\text{mmHg}$, $PaCO_2 \leq 50\text{mmHg}$
- E. $PaO_2 \geq 50\text{mmHg}$, $PaCO_2 \geq 50\text{mmHg}$

11. 答案: C

解析: 动脉血气分析是判断呼吸衰竭的客观指标, II型呼吸衰竭血气分析为 $\text{PaO}_2 \leq 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 \geq 50\text{mmHg}$ 。故选 C。

12. (A1 型题) 急性感染性喉炎患儿烦躁不安时最好选用

- A. 异丙嗪
- B. 氯丙嗪
- C. 地西洋
- D. 鲁米那(苯巴比妥)
- E. 水合氯醛

12. 答案: A

解析: 对于喉炎患儿烦躁不安者可用异丙嗪镇静, 其不仅有镇静催眠作用, 还可能拮抗组胺对胃肠道、气管、支气管或细支气管平滑肌的收缩或挛缩, 解除组胺对支气管平滑肌的致痉和充血作用。故本题选 A。

13. (A1 型题) 为防止哮喘病人痰液黏稠不易咳出, 应采取

- A. 体位引流
- B. 低盐饮食
- C. 多饮水
- D. 持续吸氧
- E. 翻身、拍背

13. 答案: C

解析: 多饮水可以稀释痰液, 使痰液易于排出。故选 C。

14. (A1 型题) 下列对阻塞性肺气肿的诊断、最有价值的是

- A. 肺活量低于正常
- B. 中性粒细胞增高
- C. PaO_2 下降
- D. PaCO_2 升高
- E. 第一秒用力呼气量占用力肺活量比值减少

14. 答案: E

解析：肺功能检查是判断气流受限的主要客观指标，对 COPD 诊断、严重程度评价、疾病进展、预后及治疗反应等有重要意义。包括第一秒用力呼气量占用力肺活量比值减少，残气容积增加，残气容积占肺总量百分比增加。故本题选 E。

15. (A1 型题) 哮喘病人的痰液的性质为

- A. 巧克力色痰
- B. 铁锈痰
- C. 粉红色泡沫痰
- D. 白色泡沫痰
- E. 胶冻样痰

15. 答案：D

解析：肺脓肿时咳痰为典型的巧克力色；大叶性肺炎咳铁锈色痰；肺水肿咳粉红色泡沫痰；胶冻样痰提示细菌感染；哮喘病人咳白色泡沫样痰。故选 D。

16. (A1 型题) 能改善早期肺气肿症状的措施是

- A. 预防呼吸道感染
- B. 合理氧疗
- C. 进行康复治疗
- D. 呼吸功能锻炼
- E. 控制咳嗽和痰液的生成

16. 答案：D

解析：肺气肿时膈肌下降，运动幅度减弱，肺组织弹性回缩减退，胸廓经常处于吸气状态，造成呼吸幅度浅而频速，增加呼吸功能的障碍，可做腹式呼吸锻炼，加强膈肌活动，提高其运动幅度，使呼吸由浅速变为深缓，增加有效通气量，从而达到改善肺功能的目的，故加强呼吸运动锻炼，从而可以改善早期肺气肿患者的症状，故本题选 D。

17. (A1 型题) 某慢性肺源性心脏病病人，喘憋明显，略有烦躁。在治疗过程中应慎用镇静剂，以避免

- A. 洋地黄中毒
- B. 双重感染
- C. 脱水、低血钾

- D. 诱发肺性脑病
- E. 加重心力衰竭

17. 答案: D

解析: 肺心病护理应慎用镇静剂, 病人烦躁不安时要警惕呼吸衰竭、电解质紊乱等, 禁用麻醉剂及影响呼吸中枢功能的镇静剂, 引起二氧化碳潴留和缺氧所引起肺性脑病。故选 D。

18. (A1 型题) 慢性阻塞性肺气肿病人出现肺性脑病前最主要的临床表现

- A. 瞳孔不等大
- B. 心律加快, 血压上升
- C. 呼吸深而快
- D. 神志与精神改变
- E. 尿量减少

18. 答案: D

解析: 肺性脑病又称肺气肿脑病、二氧化碳麻醉或高碳酸血症, 临床特征为原有的呼吸衰竭症状加重并出现神经精神症状如神志恍惚、嗜睡或谵妄、四肢抽搐甚至昏迷等。慢性阻塞性肺气肿病人出现肺性脑病前突出临床表现为神志、精神改变。故本题选 D。

19. (A1 型题) 慢性肺炎是指病程超过

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 5 个月
- D. 6 个月
- E. 12 个月

19. 答案: B

解析: 肺炎按病程分类: ①急性肺炎(病程在 1 个月内); ②迁延性肺炎(病程 1~3 个月); ③慢性肺炎(病程在 3 个月以上)。故本题选 B。

20. (A1 型题) 患儿, 2 岁, 因肺炎入院。经治疗后症状好转, 又突然高热, 呼吸困难, 右肺叩诊浊音。该患儿可能并发了

- A. 急性心力衰竭

- B. 呼吸衰竭
- C. 中毒性脑病
- D. 中毒性心肌炎
- E. 脓胸

20. 答案: E

解析: 肺炎经抗生素治疗后体温能转为正常, 若体温持续不降或好转又高热, 呼吸困难伴右肺叩诊浊音, 首先考虑肺炎并发脓胸。因此本题答案为 E。

21. (A1 型题) 咳铁锈色痰见于

- A. 病毒感染
- B. 化脓菌感染
- C. 厌氧菌感染
- D. 肺炎球菌感染
- E. 肺癌患者

21. 答案: D

解析: 肺炎链球菌感染典型表现为起病急骤、畏寒或寒战、高热, 体温可在数小时内达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$, 呈稽留热, 或高峰在下午或傍晚。全身肌肉酸痛, 患侧胸痛明显, 可放射至肩部, 深呼吸或咳嗽时加剧, 病人常取患侧卧位。开始痰少, 可带血丝, 24~48h 后可呈铁锈色, 与肺泡内浆液渗出和红细胞、白细胞渗出有关。故选 D。

22. (A1 型题) 肺炎球菌肺炎高热病人降温不宜采用

- A. 温水擦身
- B. 乙醇擦浴
- C. 退热药
- D. 大血管区放置冰袋
- E. 多饮水

22. 答案: C

解析: 肺炎球菌肺炎高热病人降温主要运用物理降温, 如温水擦身、乙醇擦浴、大血管区放置冰袋等, 还应鼓励饮水每日 1~2L, 失水严重者可输液。但不用阿

司匹林或其他退热剂，以免大量出汗、脱水等虚脱表现，且干扰真实热型，引起临床误诊，故本题选 C。

23. (A1 型题) 肺炎球菌肺炎病人出现哪种表现提示有并发症发生

- A. 咳铁锈色痰
- B. 胸痛
- C. 寒战、高热
- D. 体温退后复升
- E. 口唇疱疹

23. 答案：D

解析：肺炎球菌肺炎患者可表现为，咳铁锈色痰，胸痛，高热、寒战，肺实变体征，口唇和鼻周可出现单纯性疱疹。在应用抗生素后，高热一般在 24 小时内消退，或数日内逐渐下降；体温退后再升或数天后仍不退者，应考虑肺炎球菌的肺外感染，如脓胸、心包炎等。故本题选 D。

24. (A1 型题) 不属于肺炎球菌肺炎的病理分期是

- A. 充血期
- B. 红色肝变期
- C. 溃疡期
- D. 灰色肝变期
- E. 消散期

24. 答案：C

解析：肺炎球菌性肺炎根据其病理改变可分为四期：充血期、红色肝变期、灰色肝变期、消散期，各期无明确分界，故本题选 C。

25. (A1 型题) 患儿，女，8 个月，因“发热、咳嗽伴气促”就诊，以“肺炎”入院。为防止患儿发生并发症，护士应重点观察

- A. 睡眠状况
- B. 进食量
- C. 大小便次数
- D. 心率、呼吸的变化
- E. 咳嗽频率及轻重

25. 答案：D

解析：肺炎严重的并发症是心力衰竭，是导致死亡的主要原因之一，护理时应重点观察患儿呼吸频率及心率变化，当呼吸变快 60 次/分，心率 180 次/分时即为肺炎心衰，应立即抢救，故本题选 D。

26. (A1 型题) 患儿，男，8 岁，1 周来发热、咳嗽，2 天来加重，曾用青霉素 3 天无效。查体：体温 38℃，右后下肺呼吸音减低，胸片发现左上肺小片状淡薄云絮状阴影。该患儿应考虑为

- A. 呼吸道合胞体病毒肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 大叶性肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 腺病毒肺炎

26. 答案：B

解析：肺炎支原体肺炎：起病缓慢，潜伏期 2~3 周；咳嗽一般于病后 2~3 天开始，初为干咳，后转为顽固性剧咳，常有黏稠痰液，可持续 1~4 周；肺部体征多不明显，甚至全无；X 线可呈支气管肺炎的改变，常为单侧性，以右肺中下肺野多见；红霉素治疗有效。结合患儿特点，故诊断为 B。

27. (A1 型题) 慢性肺源性心脏病的形态改变主要是

- A. 左心室肥厚
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉扩大
- E. 右心室扩大

27. 答案：E

解析：肺源性心脏病肺循环阻力增加时，右心发挥代偿作用，在克服肺动脉压升高的阻力时发生右心室肥厚。随着病情进展，肺动脉压持续升高，右心失代偿而致右心衰竭。故本题选 E。

28. (A1 型题) 患儿 7 岁。发热、咳嗽 6 天，T38℃，呼吸 24 次/分。肺部有少细湿啰音。痰液黏稠，不易咳出。该患儿的主要护理措施是

- A. 立即物理降温
- B. 给予适量止咳药
- C. 室内湿度应保持 40%
- D. 嘱患儿勿进食过饱
- E. 定时雾化吸入、排痰

28. 答案: E

解析: 该患儿可初步诊断为支气管肺炎, 对于痰液黏稠不易咳出的患儿应协助其咳痰, 雾化吸入可稀释痰液, 促进痰液排出。故该患儿的主要护理措施是定时雾化吸入、排痰, 本题正确选项为 E。

29. (A1 型题) 大咯血是指 24h 咯血量超过

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

29. 答案: E

解析: 咯血根据两多多少可以分为: 少量咯血, 指的是每日咯血量少于 100ml; 中等量咯血, 每日咯血量在 100~500ml; 大咯血, 每日血量在 500ml 以上, 故本题选 E。

30. (A1 型题) 对大量咯血的病人, 护理措施不妥的是

- A. 护士应守护在床旁
- B. 烦躁不安者可用地西洋
- C. 心理安慰
- D. 屏气以止血
- E. 保持呼吸道通畅

30. 答案: D

解析: 咯血时轻轻拍击健侧背部, 嘱病人不要屏气, 以免诱发喉头痉挛, 使血液引流不畅形成血块, 导致窒息。故本题选 D。

31. (A1 型题) 患儿女, 3 岁。因上呼吸道感染入院。目前出现高热、声音嘶哑、犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣。为迅速缓解症状, 首选的处理方法是

- A. 地塞米松雾化吸入
- B. 静点抗生素
- C. 静点强的松
- D. 口服化痰药
- E. 以呼吸机行机械通气

31. 答案: A

解析: 根据患儿的症状可以判断患儿为小儿急性喉炎, 可使用地塞米松雾化吸入, 可控制炎症扩散, 缓解呼吸困难, 且效果明显。故本题选 A。

32. (A1 型题) 急性呼吸衰竭患儿护理措施正确的除外

- A. 密切观察病情变化
- B. 遵医嘱给予吸氧
- C. 让患儿取半卧位或坐卧位
- D. 不断吸痰以保持呼吸道通畅
- E. 给予心电监护

32. 答案: D

解析: 观察监测呼吸频率、节律、心率、心律、血压和意识变化, 发现异常及时报告医师; 遵医嘱吸氧, 协助排痰, 鼓励清醒患儿用力咳痰, 对咳痰无力的患儿每 2 小时翻身 1 次, 经常轻拍背部, 边拍背边鼓励患儿咳嗽, 使痰易于排出。咳嗽无力、昏迷、气管插管或气管切开的患儿, 及时给予吸痰; 呼吸衰竭患者取半卧位或坐位, 趴伏在床桌上, 增加呼吸肌的效能。故本题选 D。

33. (A1 型题) 患儿男, 2 岁。被诊断为“急性感染性喉炎”, 患儿出现喉鸣和吸气性呼吸困难、烦躁不安、口唇发绀, 双眼圆睁, 头面出汗, 肺部呼吸音明显减弱, 心音低钝, 此患儿的喉梗阻程度为

- A. I 度
- B. II 度
- C. III 度
- D. IV 度

E. V 度

33. 答案: C

解析: 喉梗阻分为四度, I 度安静时无呼吸困难, 活动后或哭闹时有; II 度安静时也会有呼吸困难, 胸廓周围软组织凹陷, 但无烦躁不安等缺氧症状; III 度喉鸣和吸气性呼吸困难, 烦躁不安、口唇及指趾端发钳, 双眼圆睁; IV 度渐现衰竭, 昏睡状态。故本题选 C。

34. (A1 型题) 可有发作性呼气性呼吸困难的疾病是

- A. 肺气肿
- B. 胸膜粘连
- C. 支气管扩张
- D. COPD
- E. 支气管哮喘

34. 答案: E

解析: 呼气性呼吸困难疾病常见于支气管哮喘和阻塞性肺炎。吸气性呼吸困难疾病常见于喉、气管狭窄, 如炎症、水肿、异物和肿瘤等。混合性呼吸困难见于肺炎、肺纤维化、大量胸腔积液、气胸等。故本题选 E。

35. (A1 型题) ARDS 的典型症状是

- A. 进行性呼吸困难
- B. 发绀
- C. 低氧血症
- D. X 线检查肺内有阴影
- E. 肺听诊可闻及

35. 答案: A

解析: 呼吸窘迫综合征其临床主要表现极度呼吸困难、青紫、心率增速, X 线透视肺部呈弥漫性浸润阴影。故选 A。

36. (A1 型题) 呼吸衰竭最早出现的症状是

- A. 发绀
- B. 呼吸困难
- C. 精神反常

- D. 心率减慢
- E. 消化道出血

36. 答案: B

解析: 呼吸困难是呼吸衰竭最早出现的症状。可表现为频率、节律和幅度的改变。较早表现为呼吸频率增快, 病情加重时出现呼吸困难, 辅助呼吸肌活动加强, 如三凹征。故选 B。

37. (A1 型题) 呼吸衰竭发生时, 最早因缺氧发生损害的组织器官是

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肝脏
- D. 肾脏
- E. 肺脏

37. 答案: A

解析: 呼吸衰竭发生时, 中枢神经系统皮质神经元细胞对缺氧最敏感。缺氧、二氧化碳潴留及酸中毒可造成脑组织水肿, 甚至颅内压增高造成脑疝, 最早发生损害的组织器官是大脑, A 正确。

38. (A1 型题) 患儿, 男, 8 个月, 因重症肺炎入院。治疗过程中突然出现烦躁不安, 呼吸困难加重, 心率 190 次/分, 肝脏较入院时增大 2cm, 考虑合并急性心力衰竭, 下列最重要的处理措施是

- A. 应用强力利尿剂
- B. 应用肾上腺皮质激素
- C. 应用血管扩张剂
- D. 立即更换体位、拍背促进痰液排出
- E. 镇静、吸氧、应用快速洋地黄制剂

38. 答案: E

解析: 患儿出现急性心力衰竭, 且病人烦躁不安, 呼吸困难加重, 应镇静、吸氧, 减少患儿需氧, 缓解呼吸困难, 同时应用强心剂。

39. (A1 型题) 护理急性呼吸衰竭患儿, 下列哪项操作是错误的

- A. 立即将患儿送入监护室

- B. 患儿取半卧位或抬高床头
- C. 立即给氧
- D. 立即行气管切开术
- E. 保持呼吸道通畅

39. 答案: D

解析: 急性呼吸衰竭患儿的护理要点: 维持呼吸道通畅 (E 正确), 改善呼吸功能; 正确安排患儿休息: ①立即将患儿送入抢救监护室 (A 正确); ②取半卧位或坐位休息, 以利于膈活动, 使肺活量增加 (B 正确); ③患儿衣服应宽松, 被褥要松软、轻、暖, 以减轻对呼吸运动的限制, 增加舒适感; ④随时清除呼吸道分泌物; ⑤合理用氧 (C 正确)。当人工通气病情不能改善情况, 特别是当吸氧的浓度达 60%, 而 $PaO_2 \leq 8.0kPa$ 时, 才考虑行气管切开, 而不是立即行气管切开术, 因此选项 D 错误。

40. (A1 型题) 急性支气管炎, 胸部 X 线片表现为

- A. 大小不等的片状阴影
- B. 常伴有肺气肿和支气管周围炎
- C. 有均匀的大片状密实影
- D. 肺纹理增粗, 肺门阴影加深
- E. 肺透明度增加或肺不张

40. 答案: D

解析: 急性气管-支气管炎是指感染、物理、化学、过敏等因素引起的气管-支气管黏膜的急性炎症。胸部 X 线表现为肺纹理增粗, 肺门阴影加深。故选 D。

41. (A1 型题) 肺炎引起化脓性合并症最常见的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 支原体
- E. 衣原体

41. 答案: A

解析：金葡菌能产生多种毒素与酶，使肺部发生广泛性出血、坏死和多发性小脓肿，金黄色葡萄球菌肺炎容易并发肺脓肿、脓胸、脓气胸、肺大疱等。故本题选A。

42. (A1 型题) 在冬季天气变化剧烈的时候，预防肺炎发生的重点关注人群是

- A. 有骨折史的患者
- B. 有冠心病史的患者
- C. 有慢性阻塞肺疾病史的患者
- D. 有高血压病史的患者
- E. 有胃溃疡史的患者

42. 答案：C

解析：进行肺炎患者健康评估时应重点询问患者是否有慢性阻塞肺疾病慢性病史。C 正确。A、B、D、E 均不是能引起肺炎的重要因素，故排除不选。本题选 C。

43. (A1 型题) 开放性气胸的主要病理生理变化是

- A. 反常呼吸运动
- B. 纵隔摆动
- C. 进行性伤侧肺压缩
- D. 呼吸无效腔增加
- E. 血氧分压下降

43. 答案：B

解析：开放性气胸伤侧胸腔压力等于大气压，肺受压萎陷，萎陷的程度取决于肺顺应性和胸膜有无粘连。健侧胸膜腔仍为负压，低于伤侧，使纵隔向健侧移位，健侧肺亦有一定程度的萎陷。同时由于健侧胸腔压力仍可随呼吸周期而增减，从而引起纵隔摆动（或扑动）和残气对流（或摆动气），导致严重的通气、换气功能障碍。纵隔摆动引起心脏大血管来回扭曲以及胸腔负压受损，使静脉血回流受阻，心排出量减少。故选 B。

44. (A1 型题) 关于叩背的描述，不正确的是

- A. 促使呼吸道或肺泡的痰液松动，有利咳出
- B. 叩击时宜使用单层薄布保护胸廓部位
- C. 护士站在患者背侧

- D. 叩击力度应轻柔
- E. 保证足够的水分摄入，以便稀释痰液

44. 答案：D

解析：叩击力度应适中，可听见空洞声，患者应无疼痛感觉。故本题选D。

45. (A1 型题) 慢性肺心病最常见的病因是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 脊柱侧弯

45. 答案：A

解析：慢性肺心病病因以慢支并发阻塞性肺气肿引起的慢性阻塞性肺疾病(COPD)最为常见，约占80%~90%，由此可见，COPD是慢性肺心病最主要的病因。故选A。

46. (A1 型题) 慢性肺心病发生的关键环节是

- A. 肺动脉高压
- B. 右心室肥厚
- C. 右心室扩大
- D. 肺动脉瓣关闭不全
- E. 心功能不全

46. 答案：A

解析：慢性肺源性心脏病是由于支气管-肺组织或肺动脉血管病变所致肺动脉高压引起的右心室扩张和(或)肥大，伴或不伴右心功能衰竭的心脏病，其关键环节应该为肺动脉高压的形成，故本题选A。

47. (A1 型题) 慢性肺源性心脏病的症状加重主要由于

- A. 呼吸道感染
- B. 过度劳累
- C. 摄入钠盐过多
- D. 心律失常

E. 停用洋地黄类制剂

47. 答案: A

解析: 慢性肺源性心脏病是指慢性肺胸疾病或肺血管慢性病变, 逐渐引起肺动脉高压, 进而造成右心室肥大, 最后发生心力衰竭的一类心脏病。其原发病以慢性支气管炎、肺气肿最常见。急性发作以冬春季多见。常因呼吸道感染而诱发肺、心功能不全。故本题选 A。

48. (A1 型题) 慢性呼吸衰竭缺氧的典型表现是

- A. 呼吸频率变慢
- B. 三凹征
- C. 发绀
- D. 头痛
- E. 肺性脑病

48. 答案: C

解析: 慢性呼吸衰竭是各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍, 以致在静息状态下亦不能维持足够的气体交换, 导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留, 从而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。临床表现为呼吸困难、发绀等。

49. (A1 型题) 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A. 肺纤维化
- B. 支气管扩张
- C. 肺尘埃沉着症
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

49. 答案: E

解析: 慢性阻塞性肺气肿病因: 吸烟、职业性粉尘和化学物质、空气污染、感染、其蛋白酶-抗蛋白酶失衡等。但是最常见的病因是慢性支气管炎。故选 E。

50. (A1 型题) 最能提示慢支并发阻塞性肺气肿的表现是

- A. 咳嗽、咳痰加剧
- B. 胸痛不适明显
- C. 呼吸困难逐渐加重

- D. 焦虑、烦躁不安
- E. 厌食、恶心、呕吐

50. 答案: C

解析: 慢性阻塞性肺气肿临床表现: ①慢性咳嗽; ②咳痰; ③气短或呼吸困难早期仅在体力劳动或上楼等活动时出现, 随着病情发展逐渐加重, 常活动甚至休息时也感到气短, 是 COPD 的标志性症状; ④喘息和胸闷: 重度病人或急性加重时出现喘息; ⑤其他晚期病人有体重下降, 食欲减退等全身症状。故选 C。

51. (A1 型题) 多系统器官功能衰竭, 多数情况下, 首先受累的器官是

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑

51. 答案: C

解析: 目前较公认的多器官功能衰竭的发病机制为全身炎症反应综合征(SIRS), 由于炎症细胞在肺间质大量沉积并激活, 肺首先受累, 使得病人出现呼吸急促, 窘迫等症。故本题选择 C。

52. (A1 型题) 护理一个 1 岁患金黄色葡萄球菌肺炎患儿时, 发现他突然出现呼吸困难加重, 经吸痰和给予氧气吸入后无明显缓解, 应考虑有哪种变化

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 合并心力衰竭
- C. 高热所致
- D. 并发脓气胸
- E. 肺部炎症加重

52. 答案: D

解析: 脓胸、脓气胸、肺大泡等并发症多见于延误诊断或病原体致病力强者, 如金黄色葡萄球菌肺炎和某些革兰阴性杆菌肺炎。该患儿突发症状, 且经吸痰、给氧后无缓解, 结合金黄色葡萄球菌感染, 应考虑并发脓气胸, 故本题答案为 D。

53. (A1 型题) 休克型肺炎的突出表现是

- A. T40℃
- B. 气急、发绀
- C. 血压降至 80/50mmHg
- D. 谵妄
- E. 咳铁锈色痰

53. 答案: C

解析: 强调休克型肺炎与其他肺炎临表的区别, 休克型肺炎的临床表现主要有肺部感染和休克的表现: 多数患者有咳嗽、咳痰、全身不适; 肺部体征多不典型, 休克常突然发生, 表现为: 血压下降、面色苍白、四肢厥冷、冷汗淋漓、脉搏细速、口唇及肢体皮肤紫绀、尿少或无尿、表情淡漠、意识模糊不清、烦躁不安、或嗜睡甚至昏迷

54. (A1 型题) 护理重症哮喘病人哪项不正确

- A. 取坐位或半卧位
- B. 勿使勉强进食
- C. 限制水、钠摄入
- D. 给予低流量吸氧
- E. 痰多黏稠者采用雾化吸入

54. 答案: C

解析: 取坐位或半卧位, 可使胸廓辅助呼吸肌易于运动, 并使膈肌下降, 使肺的换气量增加, 减轻肺功能不全的症状; 勿使勉强进食, 以免发生呛咳; 重症哮喘患者应根据失水及心脏情况静脉补液, 纠正脱水; 给予低流量吸氧, 以纠正缺氧; 痰多黏稠者采用雾化吸入, 以湿化呼吸道, 帮助排痰。故本题选 C。

55. (A1 型题) 缺氧伴二氧化碳潴留的呼吸衰竭病人宜采用

- A. 高压给氧
- B. 乙醇湿化给氧
- C. 间歇给氧
- D. 高浓度持续给氧
- E. 低浓度持续给氧

55. 答案: E

解析：缺氧伴二氧化碳潴留的呼吸衰竭属于Ⅱ型呼吸衰竭，给氧原则为低浓度（25%~29%）、低流量（1~2L/min）持续吸氧，由于高浓度给氧解除了缺氧对外周化学感受器的刺激，反而引起呼吸中枢抑制。故本题选E。

56.（A1型题）肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是

- A. 缺氧
- B. 血容量增加
- C. 血液黏稠度增加
- D. 继发性红细胞增多
- E. 肺部毛细血管微小栓子形成

56. 答案：A

解析：缺氧是形成肺动脉高压的最重要因素，缺氧可使肺组织中血管活性物质的含量发生变化，收缩血管物质的作用占优势，使血管收缩；缺氧还可直接使肺血管平滑肌细胞膜对 Ca^{2+} 的通透性增加，使肺血管平滑肌收缩。故本题选A。

57.（A1型题）患儿，男，9个月，因发热、咳嗽3天入院。3天前患儿面部一疔肿挑破后，当晚即发热，次日体温 $40^{\circ}C$ ，并咳嗽、呼吸困难。查体：体温 $39.8^{\circ}C$ ，营养欠佳，重病容，鼻翼扇动，唇发绀，全身皮肤可见猩红热样皮疹，双肺满布中细湿啰音。患儿最可能的原因是

- A. 腺病毒肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

57. 答案：E

解析：上述选项中，只有金黄色葡萄球菌肺炎时皮肤可见猩红热样皮疹或荨麻疹样皮疹，故本题选E。

58.（A1型题）糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道炎症反应

- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

58. 答案: B

解析: 糖皮质激素可以有效抑制炎症细胞的迁移和活化, 抑制气道炎症反应, 从而舒缓平滑肌。故本题选 B。

59. (A1 型题) 某呼吸衰竭病人, 在应用人工呼吸器和呼吸兴奋剂过程中出现恶心、呕吐、烦躁、颜面潮红、肌肉颤动等现象。应考虑为

- A. 继发感染
- B. 通气量不足
- C. 呼吸兴奋剂过量
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 痰液阻塞

59. 答案: C

解析: 题中所述符合呼吸兴奋剂过量的表现。呼吸兴奋剂的毒性小, 不良反应较少, 较大剂量可出现多汗、恶心、打嚏呛咳、面部潮红以及全身瘙痒; 血压升高, 脉搏快, 甚至心律失常; 用量过大可出现癫痫样惊厥大发作。剂量过大时血压升高、心悸、出汗、咳嗽、恶心、呕吐、肌肉震颤、肌僵直。极大剂量可致惊厥。故选 C。

60. (A1 型题) 小儿肺炎合并心力衰竭的主要原因是

- A. 代谢性酸中毒
- B. 电解质紊乱
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 肺动脉高压和中毒性心肌炎
- E. 缺氧、二氧化碳潴留

60. 答案: D

解析: 统病原体 and 毒素作用于心肌可引起中毒性心肌炎、低氧血症和 CO₂ 潴留, 可引起肺小动脉反射性收缩, 使肺循环的阻力增高, 形成肺动脉高压, 右心的负担加重。肺动脉高压和中毒性心肌炎是诱发心力衰竭的主要原因。故本题选 D。

61. (A1 型题) 吸气性呼吸困难的发生机制是

- A. 上呼吸道狭窄
- B. 细小支气管狭窄
- C. 肺组织弹性减弱
- D. 麻醉药抑制呼吸中枢
- E. 呼吸面积减少

61. 答案: A

解析: 吸气性呼吸困难见于各种原因引起的喉、气管、大支气管的狭窄与梗阻, 是由上呼吸道狭窄所致, 故本题选 A。

62. (A1 型题) 目前推荐长期抗炎治疗哮喘的最常用方法是

- A. 吸入法
- B. 口服法
- C. 肌内注射法
- D. 静脉推注法
- E. 静脉输液法

62. 答案: A

解析: 吸入治疗: 主要用于长期抗炎治疗哮喘。口服剂: 用于吸入糖皮质激素无效或需要短期加强的患者。静脉用药: 主要用于严重哮喘发作时。故本题选 A。

63. (A1 型题) 患儿, 1 岁, 喘憋, 发绀, 高热, 被诊断为肺炎, 经多种抗生素治疗无效。该患儿属哪种细菌感染

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 腺病毒
- D. 大肠埃希菌
- E. 流感嗜血杆菌

63. 答案: C

解析: 腺病毒肺炎约占儿童期肺炎的 10%, 多由腺病毒 3、7 型引起。目前对腺病毒感染的治疗仍无有效药物。本病例因经多种抗生素治疗无效。故选 C。

64. (A1 型题) 急性喉炎中小儿比成年人病情更重的主要原因是

- A. 解剖结构的差异
- B. 免疫系统发育不全
- C. 细菌毒力强
- D. 治疗不及时
- E. 诊断困难

64. 答案: A

解析: 小儿急性喉炎症状多重于成人, 主要和解剖特点有关, 小儿喉腔较小, 喉内粘膜松弛, 肿胀时易致声门阻塞, 故本题选 A。

65. (A1 型题) 提示哮喘发作病情可能加重的表现为

- A. 烦躁不安
- B. 哮鸣音减弱或消失
- C. 明显发绀
- D. 呼吸困难
- E. 喘气费力

65. 答案: B

解析: 哮喘发作的症状是: 喘息、气促、胸闷、咳嗽等, 多数有广泛的呼气相为主的哮鸣音, 呼气延长。但当呼吸肌疲劳, 呼吸动力减弱以及气道有严重阻塞时, 哮鸣音可明显降低甚至消失。故本题选 B。

66. (A1 型题) 哮喘持续状态的错误处理是

- A. 去除诱因
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 高流量吸氧
- D. 纠正脱水
- E. 控制感染

66. 答案: C

解析: 哮喘发作时应以低流量、低浓度持续给氧为宜。慢性缺氧病人长期二氧化碳分压高, 其呼吸主要靠缺氧刺激颈动脉体和主动脉弓化学感受器, 沿神经上传至呼吸中枢, 反射性地引起呼吸。若高流量高浓度给氧, 则缺氧反射性刺激呼吸

的作用消失，导致呼吸抑制，二氧化碳滞留更严重，可发生二氧化碳麻醉，甚至呼吸停止。故掌握吸氧浓度至关重要。

67. (A1 型题) 护士指导肺炎患儿家长体位引流的方法，其拍背的顺序

- A. 由下向上、由外向内
- B. 由上向下、由外向内
- C. 由下向上、由内向外
- D. 由下向上、由左向右
- E. 由上向下、由右向左

67. 答案：A

解析：胸部叩击时，叩击者两手手指弯曲并拢，使掌侧呈杯状，以手腕力量，从肺底自下而上、由外向内、迅速而有节律地叩击胸壁。故本题选 A。

68. (A1 型题) 支气管扩张病人并发厌氧菌感染的依据是

- A. 痰液有臭味
- B. 痰液出现分层现象
- C. 咳痰伴咯血
- D. 咳嗽伴大量脓痰
- E. 慢性咳嗽大量脓痰，伴咯血

68. 答案：A

解析：厌氧菌感染的脓液具有特殊的腐臭味。所以支气管扩张病人并发厌氧菌感染的依据是痰液有臭味，故选 A。

69. (A1 型题) 为缓解哮喘患儿的呼吸困难，护士安置患儿体位正确的是

- A. 平卧位
- B. 侧卧位
- C. 去枕平卧位
- D. 头高脚低位
- E. 坐位或半坐卧位

69. 答案：E

解析：因为坐位或半坐位可使膈肌下降，胸腔容量加大，且腹腔内脏器对心、肺的压力减轻，肺活量增加，有利于患儿呼吸，故本题选 E。

70. (A1 型题) 诱发肺心病心功能失代偿的最常见原因是

- A. 过度劳累
- B. 补液过快
- C. 呼吸道感染
- D. 摄盐过多
- E. 心律失常

70. 答案: C

解析: 引起慢性肺心病失代偿的最常见诱因是急性呼吸道感染。主要表现为: ①呼吸衰竭: 一般先出现。为 II 型呼吸衰竭表现, 病重者出现肺性脑病, 发生呼吸衰竭。②心力衰竭: 以右心衰竭表现为主, 也可出现急性肺水肿、全心衰竭及心律失常。故选 C。

71. (A1 型题) 支气管肺炎最常见的致病菌是

- A. 衣原体
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎支原体
- D. 肺炎链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

71. 答案: D

解析: 引起支气管肺炎常见的病原体为病毒和细菌。病毒以呼吸道合胞病毒最常见, 其次是腺病毒、流感病毒、副流感病毒等; 细菌以肺炎链球菌多见, 其他有链球菌、葡萄球菌、革兰阴性杆菌及厌氧菌等。故本题选 D。

72. (A1 型题) 婴儿肺炎合并心力衰竭时的呼吸和心率分别是

- A. 呼吸 40 次/分, 心率 140 次/分
- B. 呼吸 40 次/分, 心率 150 次/分
- C. 呼吸 50 次/分, 心率 160 次/分
- D. 呼吸 60 次/分, 心率 180 次/分
- E. 呼吸 60 次/分, 心率 200 次/分

72. 答案: D

解析：婴儿肺炎合并心衰的主要临床表现有：①呼吸困难加重，呼吸 >60 次/分。②心率 >180 次/分。③心音低钝，奔马律。④骤发极度烦躁不安，面色苍白或发灰。⑤肝脏迅速增大。⑥少尿或无尿。故本题选D。

73. (A1型题) 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 毛细支气管炎

73. 答案：B

解析：婴幼儿肺炎按病理累及的部位分为：大叶性肺炎、支气管肺炎和间质性肺炎。年长儿多表现为大叶性肺炎，而婴幼儿则表现为支气管肺炎。故本题正确答案为B。

74. (A1型题) 纠正呼吸性酸中毒的主要措施为

- A. 增加通气
- B. 静滴碱性药物
- C. 控制感染
- D. 使用激素
- E. 提高吸氧浓度

74. 答案：A

解析：由于气道狭窄堵塞，病人通气不足，引起二氧化碳潴留，导致呼吸性酸中毒。因此，改善通气、增加通气量、减少二氧化碳潴留，是纠正呼吸性酸中毒的主要措施。故本题选A。

75. (A1型题) 小儿急性喉炎引起呼吸困难的原因，应除外

- A. 小儿喉腔较小
- B. 小儿喉内黏膜松弛，黏膜与黏膜下层附着疏松
- C. 喉黏膜下淋巴组织及腺样体不丰富，抵抗力弱
- D. 小儿咳嗽反射差，分泌物不易排除
- E. 小儿神经系统不稳定，易发生喉痉挛

75. 答案: C

解析: 由于小儿喉腔狭小, 软骨柔软, 黏膜血管和淋巴较为丰富, 结缔组织松弛, 炎症时易充血、水肿, 同时由于小儿神经系统不稳定, 受刺激易发生喉痉挛而出现不同程度的喉梗阻。故本题选 C。

76. (A1 型题) 肺心病的预防不包括

- A. 提倡戒烟
- B. 增强免疫力
- C. 减少有害物质的吸入
- D. 预防感染
- E. 多睡少动

76. 答案: E

解析: 预防肺心病应戒烟, 减少有害物质的吸入, 排除 AC; 积极防治原发病的诱发因素, 如呼吸道感染、各种过敏原, 排除 D; 选择合适的锻炼项目, 提高免疫力, 排除 B。多睡少动, 缺少锻炼, 不利于疾病的预防。故本题选 E。

77. (A1 型题) 以下与张力性气胸有关的是

- A. 反常呼吸运动
- B. 纵隔气肿
- C. 纵隔扑动
- D. 静脉压力增高, 动脉压降低
- E. 胸腔引流出血液 200ml/h, 持续 3h

77. 答案: B

解析: 张力性气胸病人极度呼吸困难, 端坐呼吸。缺氧严重者, 发绀、烦躁不安、昏迷, 甚至窒息。体格检查, 可见伤侧胸部饱胀, 肋间隙增宽, 呼吸幅度减低, 可有皮下气肿。叩诊呈高度鼓音。听诊呼吸音消失。故选 B。

78. (A1 型题) 患儿, 男, 6 个月, 因肺炎合并心力衰竭, 1 小时来惊厥 2 次, 血钙 1.5mmol/L, 刚注射过毛花苷丙, 遵医嘱下一步首选下列哪项治疗措施

- A. 口服钙片
- B. 静滴 20% 甘露醇
- C. 即刻肌注维生素 D330 万单位

- D. 即刻静滴 10%葡萄糖
- E. 4 小时后静滴 10%葡萄糖酸钙

78. 答案: E

解析: 正常血钙浓度是 2.25~2.75mmol/L, 可知该患儿是由于血钙浓度低而引起惊厥, 除了强心药, 应给予补充钙, 首选的途径是静脉滴注 10%葡萄糖酸钙, 但由于输液会加重患儿心衰, 影响毛花苷丙的药效, 应避免同时用药, 故本题选 E。

79. (A1 型题) 关于小儿肺炎的护理, 以下哪项不正确

- A. 体位采用头高位半卧位
- B. 经常翻身更换体位以减轻肺部淤血
- C. 及时注意吸痰以保持呼吸道畅通
- D. 尽量少喂奶、少喂食, 以防呛咳及引起窒息
- E. 输液时严格控制量和速度, 以防肺水肿

79. 答案: D

解析: 支气管肺炎的护理要求: ①改善通气状况: 置患儿于有利于肺扩张的体位, 如半卧位或抬高床头 30°~60° (A 正确), 经常帮助患儿翻身更换体位或抱起患儿, 以利分泌物排出, 减轻肺部淤血和防止肺不张 (B 正确); ②保持呼吸道通畅: 及时藉助患儿排出痰液 (C 正确); ③预防并发症: 预防发生心力衰竭, 输液时滴速应控制在每小时 5ml/kg (E 正确); ④饮食护理: 旨导合理喂养, 鼓励患儿多饮水; 婴儿提倡母乳喂养; 年长儿选择营养丰富、易消化的饮食, 喂养时要注意体位、食量 (D 错误)。故本题 A、B、C、E 选项正确, 错误选项为 D。

80. (A1 型题) 支气管肺炎患儿宜采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 去枕仰卧位
- C. 头低足高位
- D. 头胸抬高位
- E. 左侧卧位

80. 答案: D

解析：支气管肺炎患儿采取头胸抬高位，可以避免因咳痰导致窒息，保持呼吸道通畅，故 D 正确。去枕仰卧位适用于昏迷麻醉未清醒的病人，故不选 B。头低足高位适用于肺部引流、胎膜早破等，故不选 C。左侧卧位适用于灌肠、肛门检查及肌肉注射等，故不选 E。

81. (A1 型题) 支气管肺炎患儿停用抗生素的时间是抗生素用至体温正常后

- A. 1~2 天
- B. 3~4 天
- C. 5~7 天
- D. 8~10 天
- E. 10~15 天

81. 答案：C

解析：支气管肺炎抗生素一般用至体温正常后的 5~7 天，临床症状、体征消失后 3 天。葡萄球菌性肺炎易复发及产生并发症，体温正常后继续用药 2 周，总疗程 6 周。支原体肺炎至少用药 2~3 周。故本题选 C。

82. (A1 型题) 给肺炎患儿家长做健康指导喂养时的原则是

- A. 少食多餐，避免呛咳
- B. 少量饮水，以免咳嗽
- C. 禁食禁水输液
- D. 停奶改喂辅食
- E. 继续母乳喂养

82. 答案：A

解析：支气管肺炎起病急，有不规则发烧、咳嗽，开始干咳，以后有痰，呼吸增快，喘憋，亦可有食欲不振，腹泻，呕吐等，再重可高烧不退，口周发青，口唇青紫，有明显的缺氧和中毒症状，甚至可造成呼吸衰竭，心力衰竭，烦躁不安等。所以家长喂养的原则是少食多餐，避免呛咳。

83. (A1 型题) 支气管扩张病人痰液的特点是

- A. 只有少量黏痰
- B. 草绿色
- C. 红棕色胶冻状

- D. 灰黑色
- E. 痰液分层现象

83. 答案: E

解析: 支气管扩张病人痰液分层。感染时痰液静置后出现分层的特征: 上层为泡沫, 下悬脓性成分; 中层为混浊黏液; 下层为坏死组织沉淀物。厌氧菌感染时痰有臭味。故选 E。

84. (A1 型题) 支气管扩张病人咳嗽、咳痰加重的时间常为

- A. 早晨起床和晚上卧床时
- B. 白天
- C. 傍晚
- D. 深夜
- E. 进餐时

84. 答案: A

解析: 支气管扩张患者咳嗽、咳痰常在晨起及夜间卧床时加重。这是因为支气管扩张感染后, 管壁黏膜被破坏, 丧失了清除分泌物的功能, 引起分泌物的积滞, 当体位改变时, 分泌物接触到正常黏膜产生刺激, 引起咳嗽并可咳出大量脓痰。故选 A。

85. (A1 型题) 支气管扩张的早期病理改变是

- A. 柱状扩张
- B. 气管扭曲
- C. 气管坏死
- D. 气管穿孔
- E. 空洞形成

85. 答案: A

解析: 支气管扩张症是由于呼吸道感染和支气管阻塞后, 反复发生支气管炎、致使支气管壁结构破坏, 引起的支气管异常和扩张。支气管扩张症的早期病理改变为气管柱状扩张。故本题选 A。

86. (A1 型题) 支气管哮喘的主要临床表现是

- A. 吸气性呼吸困难伴“三凹征”

- B. 发作性呼吸困难伴窒息感
- C. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D. 带哮鸣音的混合性呼吸困难
- E. 呼吸困难伴哮鸣音

86. 答案: C

解析: 支气管哮喘的主要临床表现有: 反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽; 发作时在双肺可闻及散在弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音, 呼气相延长, 严重者可被迫采取坐位或呈端坐呼吸; 上述症状可经治疗缓解或自行缓解。故本题正确选项为 C。

87. (A1 型题) 哮喘发生的本质是

- A. 交感神经兴奋
- B. 迷走神经兴奋
- C. 气道反应性降低
- D. 免疫介导气道慢性炎症
- E. β -肾上腺素受体功能低下

87. 答案: D

解析: 支气管哮喘是由多种细胞 (如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 淋巴细胞等) 和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病。其发病与遗传因素、神经因素、免疫因素密切相关, 哮喘的炎症反应是由多种炎症细胞、介质和细胞因子参与的相互作用的结果。故本题选 D。

88. (A1 型题) 支气管哮喘长期反复发作容易导致

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 呼吸衰竭
- D. 支气管炎
- E. 阻塞性肺气肿

88. 答案: E

解析：支气管哮喘长期反复发作，会致使支气管及细支气管平滑肌肥大增殖，细支气管形成器质性狭窄，腺体分泌大量粘稠物质，阻塞细支气管，使肺泡内气体聚积而膨胀；长期气体聚积，形成阻塞性肺气肿。故选 E。

89. (A1 型题) 支气管炎的典型症状是

- A. 喘息
- B. 反复咳嗽、咳痰
- C. 逐渐加重的呼吸困难
- D. 发热
- E. 胸闷、气急

89. 答案：B

解析：支气管炎主要表现为反复咳嗽、咳痰，气喘、反复感染、发热，其中反复咳嗽、咳痰是其典型症状，故本题选 B。

90. (A1 型题) 重症肺炎因二氧化碳潴留导致酸碱平衡紊乱，可发生

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸中毒

90. 答案：B

解析：重症肺炎患儿缺氧时体内有氧代谢发生障碍，酸性代谢产物发生堆积，常伴有代谢性酸中毒。此外二氧化碳潴留，从而导致呼吸性酸中毒。少数患儿早期因呼吸增快，通气过度，可能出现呼吸性碱中毒。重症肺炎时，常出现混合性酸中毒。本题题为因二氧化碳潴留导致的酸碱平衡紊乱，可产生呼吸性酸中毒，故选 B。

91. (A1 型题) 重症肺炎患儿发生腹胀大多因为

- A. 低钠血症
- B. 中毒性肠麻痹
- C. 消化不良
- D. 低钾血症

E. 低钙血症

91. 答案: B

解析: 重症肺炎由于严重的缺氧及毒血症, 除呼吸系统改变外, 可发生循环、神经和消化系统功能障碍。在消化系统可发生中毒性肠麻痹, 一旦发生表现为严重腹胀、膈肌升高, 加重了呼吸困难。因此本题答案为 B。

92. (A1 型题) 可能发生呼吸肌无力引起呼吸衰竭的疾病是

A. 慢性阻塞性肺疾病

B. 重症支气管疾病

C. 重症肺炎

D. 肺栓塞

E. 重症肌无力

92. 答案: E

解析: 重症肌无力患者肌无力症状突然加重时, 会出现呼吸肌、吞咽肌进行性无力或麻痹等现象, 12%~16%的重症肌无力患者可发生呼吸衰竭。故本题选 E。

93. (A1 型题) 某重症哮喘病人, 男性。于今日突然出现胸痛、极度呼吸困难、发绀、大汗、四肢厥冷, 左侧肺部哮鸣音消失。此时考虑并发

A. 休克

B. 呼吸衰竭

C. 心力衰竭

D. 自发性气胸

E. 肺不张

93. 答案: D

解析: 重症哮喘的临床表现有: 发绀、大汗、哮鸣音消失。而“胸痛”、“极度呼吸困难”、“四肢厥冷”这些都是自发性气胸的临床表现。“发绀”、“大汗”是重症哮喘和自发性气胸都可发生的临床表现。故选 D。

94. (A1 型题) 自发性气胸最早症状是

A. 呕吐

B. 心悸

C. 发热

D. 胸痛

E. 咳嗽

94. 答案: D

解析: 自发性气胸是指因肺部疾病使肺组织和脏层胸膜破裂, 或靠近肺表面的细微气肿泡破裂, 肺和支气管内空气逸入胸膜腔。最早出现的症状是胸痛, D 正确。

95. (A2 型题) 患者, 男, 37 岁。因感染性休克入院。护士在观察病情时, 下列哪项症状提示其发生急性呼吸窘迫综合征的可能

A. 呼吸音减弱

B. 肺部湿

C. 躁动不安

D. 动脉氧分压下降

E. 呼吸困难迅速加重

95. 答案: E

解析: ARDS 常在受到发病因素攻击后 12~48 小时内突然出现进行性呼吸困难、发绀, 常伴有烦躁、焦虑、出汗。故本题选 E。

96. (A2 型题) 患者, 男性, 40 岁, 支气管哮喘史 22 年, 近来反复发作性的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状。在应用氨茶碱治疗中不正确的是

A. 缓慢静脉推注

B. 快速静脉推注

C. 稀释后缓慢静脉滴注

D. 与沙丁胺醇、舒喘灵合用

E. 血药浓度监测

96. 答案: B

解析: 氨茶碱的有效剂量与中毒剂量比较接近, 故要稀释后缓慢静脉注射或者推注, 快速静脉推注可能可能导致中毒反应。故本题选 B。

97. (A2 型题) 患者, 女, 78 岁, 患有慢性肺心病, 因肺部感染住院。给予持续低流量氧气、头孢美唑钠、沐舒坦、氨茶碱等治疗。氨茶碱的药理作用为

A. 松弛支气管平滑肌

B. 减少支气管分泌物

- C. 稀释痰液
- D. 控制细菌感染
- E. 降低体温

97. 答案: A

解析: 氨茶碱可松弛支气管平滑肌, 也能松弛肠道、胆道等多种平滑肌, 对支气管粘膜的充血、水肿也有缓解作用。故本题选 A。

98. (A2 型题) 患者, 男, 22 岁, 右胸刺伤 2 小时, 胸膜腔与外界相通, 极度呼吸困难, 此时应首先采取的措施是

- A. 立即加压包扎、封闭胸壁伤口
- B. 胸腔闭式引流
- C. 输血、输液
- D. 立即排气减压
- E. 立即手术

98. 答案: A

解析: 本病例诊断为开放性气胸, 开放性气胸易于诊断, 一经发现, 必须立刻急救。根据病人当时所处现场的条件, 自救或互救, 尽快封闭胸壁创口, 变开放性气胸为闭合性气胸。故选 A。

99. (A2 型题) 患者, 男, 开胸手术后行闭式胸膜腔引流已 48 小时。水封瓶长玻璃管内的水柱波动消失, 嘱病人咳嗽时水柱有波动出现, 提示

- A. 肺膨胀良好
- B. 引流管有堵塞
- C. 患侧肺不张
- D. 呼吸道不通畅
- E. 并发支气管胸膜瘘

99. 答案: A

解析: 闭式胸膜腔引流以重力引流为原理, 是开胸术后重建、维持胸腔负压、引流胸腔内积气、积液, 促进肺扩张的重要措施。其目的是为更好地改善胸腔负压, 使气、血、液从胸膜腔内排出, 并预防其反流, 促进肺复张, 胸膜腔闭合; 平衡

压力，预防纵隔移位及肺受压。水封瓶长玻璃管内的水柱波动消失，嘱病人咳嗽时水柱有波动出现，提示肺膨胀良好。故选 A。

100. (A2 型题) 患者女，69 岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病，经治疗后，病情好转予以出院，出院时，护理人员指导患者进行缩唇腹式呼吸训练，正确的是

- A. 深呼缓吸
- B. 取俯卧屈膝位
- C. 用鼻吸气用口呼气
- D. 吸气时尽力收腹
- E. 呼气时尽力挺腹

100. 答案：C

解析：病人闭嘴经鼻吸气，然后通过缩唇（吹口哨样）缓慢呼气，同时收缩腹部。吸气与呼气时间比为 1:2 或 1:3。缩唇的程度与呼气流量：以能使距口唇 15~20cm 处、与口唇等高水平的蜡烛火焰随气流倾斜又不至于熄灭为宜。故本题选 C。