

1. 引起慢性萎缩性胃炎的主要病原菌是 ()
 - A. 大肠杆菌
 - B. 粪链球菌
 - C. 幽门螺杆菌
 - D. 沙门菌
 - E. 痢疾杆菌
2. 中华护理学会是我国的 ()
 - A. 群众性卫生组织
 - B. 卫生行政组织
 - C. 医学研究机构
 - D. 卫生事业组织
 - E. 卫生专业机构
3. 治疗肺炎球菌肺炎，抗生素治疗有效指标为体温正常后 ()
 - A. 3 天
 - B. 5 天
 - C. 7 天
 - D. 10 天
 - E. 14 天
4. 诊断有机磷农药中毒最重要的指标是 ()
 - A. 农药接触史
 - B. 阿托品试验阳性
 - C. 呕吐物有大蒜味
 - D. 毒蕈碱样和烟碱样症状
 - E. 全血胆碱酯酶活力降低
5. 在诊疗过程中，医生以医嘱形式对患者给予健康生活方式指导，此教育属于 ()
 - A. 住院教育
 - B. 候诊教育
 - C. 查询教育
 - D. 随诊教育
 - E. 健康教育处方

6. 在我国，引起慢性肾功能不全的最常见病因是（）
- A. 慢性肾盂肾炎
 - B. 肾结核
 - C. 肾结石
 - D. 慢性肾小球肾炎
 - E. 慢性间质性肾炎
7. 在社区糖尿病健康知识的小组讲座中，参加小组讨论的人数为
- A. 2~5 人
 - B. 6~10 人
 - C. 11~15 人
 - D. 16~20 人
 - E. 21~25 人
8. 在健康数量评价过程中，由于偶然因素，个别被测试对象的某特征水平过高或过低。但在以后的测试中又恢复到原来的实际水平的现象被称为（）
- A. 时间测量
 - B. 测试因素
 - C. 回归因素
 - D. 选择因素
 - E. 失访
9. 孕妇，妊娠 36 周。因近日胎动减少就诊。行无应激试验发现胎心基线 110 次/分，胎心基线变异 < 5 次/分，20 分钟内仅 1 次胎动，无胎心加速，并连续出现晚期减速。该监测结果提示胎儿（）
- A. 脐带绕颈
 - B. 脐带受压
 - C. 胎头受压
 - D. 宫内缺氧
 - E. 先天性心脏病
10. 孕妇，30 岁。孕 2 产 1，第一胎为剖宫产分娩。妊娠 40+3 周行常规产前检查来院就诊。产科检查：胎心 132 次/分，先露臀部，无宫缩，无阴道流血，未破膜。骨盆测量：提示漏斗骨

盆。产科 B 超：双顶径 10.3cm, 股骨长 7.8cm。孕妇遵医生建议住院行剖宫产术，术后回病房。为防止孕妇产后出血的发生，护士应密切观察（）

- A. 术后 4 小时内阴道出血情况
- B. 术后 4 小时内血压、脉搏情况
- C. 术后 2 小时内子宫收缩情况
- D. 术后 2 小时内有无尿频或肛门坠胀感
- E. 术后 4 小时内子宫收缩情况

11. 原发性肝癌的主要致病因素是（）

- A. 幽门螺杆菌
- B. 黄曲霉素
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 结核分枝杆菌

12. 幼儿时期最常见的肺炎类型是（）

- A. 支气管肺炎
- B. 间质性肺炎
- C. 吸入性肺炎
- D. 霉菌性肺炎
- E. 大叶性肺炎

13. 幼儿对微生物易感性高的主要原因是（）

- A. 细菌容易发生定植与移位
- B. 免疫系统发育不成熟
- C. 正常菌群容易失调,
- D. 自我保护能力低
- E. 缺乏生物屏障

14. 引起小儿高热惊厥最常见的疾病是（）

- A. 急性上呼吸道感染
- B. 消化道感染
- C. 中毒性菌痢
- D. 急性泌尿道感染

E. 败血症

15. 易引起机体水、电解质失衡的因素是 ()

A. 留置尿管

B. 膀胱造瘘

C. 腹腔引流

D. 胃肠减压

E. 鼻饲饮食

16. 一般认为心脏骤停后脑组织对缺氧的耐受时限是 ()

A. 1 分钟

B. 6 分钟

C. 36 分钟

D. 72 分钟

E. 120 分钟

17. 一般情况下, 任职 10 年的护士长的影响力较刚上任的护士长要大, 是因为 ()

A. 传统因素

B. 资历因素

C. 职位因素

D. 品格因素

E. 感情因素

18. 胸腔闭式引流的目的不包括 ()

A. 引流胸膜腔内的液体、气体

B. 重建胸膜腔负压

C. 维持纵隔的正常位置

D. 促进肺复张

E. 预防肺部感染

19. 心力衰竭最重要的诱因是 ()

A. 摄入钠盐过多

B. 静脉输液过快

C. 情绪激动

D. 过度劳累

E. 感染

20. 小儿预防接种活疫苗时，局部使用的消毒液是（）

- A. 0.5%碘附
- B. 2%碘酊及 75%乙醇
- C. 2%安尔碘
- D. 0.5%碘附及 75%乙醇
- E. 75%乙醇

21. 小儿前囟闭合的时间为（）

- A. 出生后 6~8 周
- B. 出生后 3~4 个月
- C. 1~1.5 岁
- D. 2 岁
- E. 2~2.5 岁

22. 下肢深静脉血栓脱落容易引起栓塞的部位是（）

- A. 肾
- B. 脑
- C. 肝
- D. 肺
- E. 心

23. 细菌性痢疾的重要依据是（）

- A. 脓血便
- B. 腹泻
- C. 白细胞总数增高
- D. 血培养阳性
- E. 粪便细菌培养阳性

24. 戊型肝炎病毒的传播途径是（）

- A. 粪-口传播
- B. 接触传播
- C. 蚊虫叮咬传播
- D. 体液传播

E. 呼吸道传播

25. 胃壁细胞可分泌 ()

A. 胃液

B. 碱性黏液

C. 促胃液素

D. 胃蛋白酶原

E. 盐酸和内因子

26. 为颅内压增高患者做腰穿测压力, 取脑脊液做检查时可能出现

A. 血压急剧下降

B. 小脑幕切迹疝

C. 枕骨大孔疝

D. 颅内压过低

E. 呼吸困难

27. 通过编排小品来传播健康知识是迎合了受者的哪一项心理特点 ()

A. 求真

B. 求新

C. 求短

D. 求快

E. 求近

28. 说服教育对象转变不正确的健康态度、信念和行为习惯, 这种人际传播形式是 ()

A. 咨询

B. 交谈

C. 教育

D. 劝服

E. 指导

29. 术前预防性使用抗生素的最佳时机是 ()

A. 术前 10 天

B. 术前 7 天

C. 术前 3 天

D. 术前 1 天

E. 术前 0.5~1 小时

30. 属于左向右分流型的先心病是 ()

- A. 右位心
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 大动脉错位
- E. 法洛三联症

31. 首先提出目标管理的是 ()

- A. 孔茨
- B. 德鲁克
- C. 巴纳德
- D. 西蒙
- E. 马斯洛

32. 肾移植术后患者超急性排斥反应一般发生于术后 ()

- A. 24 小时内
- B. 36 小时内
- C. 48 小时内
- D. 72 小时内
- E. 96 小时内

33. 容易引起颅内感染的骨折是 ()

- A. 颅盖骨折
- B. 颅底骨折
- C. 线性骨折
- D. 闭合性骨折
- E. 颅顶骨折

34. 人体主要的内分泌腺不包括 ()

- A. 下丘脑
- B. 垂体
- C. 甲状腺
- D. 肾上腺

E. 肝脏

35. 确诊流行性乙型脑炎常检查的抗体是 ()

- A. 特异性 IgM 抗体
- B. 血凝抑制抗体
- C. 血凝素抗体
- D. 中和抗体
- E. 补体结合抗体

36. 缺铁性贫血最常见的原因是 ()

- A. 生长发育快
- B. 慢性失血
- C. 摄入量不足
- D. 内因子缺乏
- E. 维生素 B12 缺乏

37. 女性性功能成熟的标志是 ()

- A. 月经初潮
- B. 规律月经
- C. 子宫增大
- D. 乳房丰满
- E. 阴毛出现

38. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的感染途径主要是 ()

- A. 污染的手导致人与人之间的传播
- B. 病房的清扫工具
- C. 一次性医疗用品
- D. 探视人员从外界带来给患者
- E. 空气传播

39. 目前认为与子宫肌瘤的发生最可能的相关因素是 ()

- A. 晚婚、晚育
- B. 早婚、早孕
- C. 多个性伴侣
- D. 高血压、肥胖

E. 雌激素的长期刺激

40. 面部危险三角区的部位是 ()

- A. 双眼、鼻及口唇
- B. 双脸颊及鼻梁部
- C. 前额及鼻部
- D. 两侧唇边缘至鼻根
- E. 眼眶和鼻部

41. 迷走神经兴奋可引起 ()

- A. 心率减慢
- B. 兴奋传导加快
- C. 心肌收缩力增强
- D. 血压升高
- E. 周围血管收缩

42. 慢性支气管炎自主神经功能紊乱的特点是 ()

- A. 交感神经功能低下
- B. 交感神经功能亢进
- C. 副交感神经功能低下
- D. 副交感神经功能亢进
- E. 迷走神经功能低下

43. 开放性肺结核应采取 ()

- A. 严密隔离
- B. 体液隔离
- C. 接触隔离
- D. 消化道隔离
- E. 呼吸道隔离

44. 健康教育的主要措施是 ()

- A. 教育者充分利用卫生资源
- B. 向教育对象传播健康信息
- C. 充分挖掘社区的保健潜力
- D. 改善教育对象的健康相关行为

E. 提供合理的健康、预防服务

45. 健康促进领域不包括 ()

- A. 制订促进健康的公共政策
- B. 创造支持性环境
- C. 加强社区行动
- D. 发展个人技能
- E. 协调人类与环境的战略

46. 健康传播的特点不包括 ()

- A. 传递的是健康信息
- B. 具有明确的目的性
- C. 具有一定的营利性
- D. 传播者属于专门的技术人才
- E. 以健康为中心

47. 加重慢性肾小球肾炎患者肾功能损害的因素不包括 ()

- A. 感染
- B. 劳累
- C. 持续低蛋白饮食
- D. 血压控制不佳
- E. 使用氨基糖普类抗生素

48. 急性乳腺炎的正确预防措施是 ()

- A. 预防性应用抗生素
- B. 尽量不喂乳
- C. 乳头破损时, 边治疗边喂乳
- D. 纠正乳头内陷
- E. 乳管不通畅无需处理

49. 急性感染性多发性神经根神经炎的发病高峰是 ()

- A. 1~2 月
- B. 3~4 月
- C. 5~6 月
- D. 7~9 月

E. 9~12月

50. 患者手部急性化脓性感染，拟在指神经阻滞麻醉下行手术切开引流。为预防局部麻醉药物不良反应，应采取的护理措施不包括（）

- A. 局部麻醉药物限量使用
- B. 局部麻醉药物浓度不能过高
- C. 麻醉前无需用药
- D. 麻醉加入少量肾上腺素
- E. 防止局部麻醉药物注入血管

51. 患者，女，59岁。肝硬化腹水15年，多次因为腹水住院治疗。今晨患者呕出鲜红色血液约1000ml，排黑便1次，急送医院。查体：血压80/50mmHg，神志不清，呼之不应，腱反射减弱，考虑患者出现肝性脑病。最可能的诱发因素是（）

- A. 大量放腹水
- B. 饮食不慎
- C. 下消化道出血
- D. 上消化道出血
- E. 血容量不足

52. 患者，女，58岁。独居，室内用煤炭取暖。邻居发现其大汗，神志不清，面色潮红，口唇呈樱桃红色。对诊断有价值的检查是（）

- A. 胆碱酯酶活性测定
- B. 碳氧血红蛋白测定
- C. 心肌酶血测定
- D. CO₂结合力测定
- E. 碱性磷酸酶测定

53. 患者，女，38岁。身体消瘦，近2周咳嗽、咳痰、低热、盗汗，偶尔痰中带血，应用抗生素静滴7天，效果不明显。X线胸片显示右上肺有一不典型片状阴影。首先考虑的诊断是（）

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 病毒性肺炎
- D. 胸腔积液

E. 肺脓肿

54. 患者，女，36岁。主因宫内妊娠36+2周，双下肢水肿1月多，头晕、头痛、事物不清6天就诊。查体：T 36℃，P 102次/分，R 22次/分，BP 148/100mmHg，下肢浮肿（++），尿蛋白（+）。产科检查：胎心138次/分，先露胎头，无宫缩，无阴道出血，未破膜。根据患者情况，应采取的护理措施是（）

- A. 提高活动量，增强体质
- B. 饮食应严格限制食盐摄入量
- C. 给予间断吸氧
- D. 每日监测孕妇体重及血压
- E. 定期监测胎儿发育状况及胎盘功能

55. 患者，女，35岁。因车祸脾破裂，现出现面色苍白、四肢冰冷。查体：T 38℃，P 120次/分，BP 86/66mmHg，CVP 4cmH₂O，左下胸压痛明显，左小腿有3cm×1.5cm伤口，有脓性分泌物，最可能发生了（）

- A. 感染性休克
- B. 心源性休克
- C. 神经源性休克
- D. 低血容量性休克
- E. 痛性休克

56. 患者，女，34岁。近1周来间断咳痰且痰中带血，5分钟前突然开始咯血。应立即采取的处理措施是（）

- A. 使用镇咳药
- B. 静脉滴注止血药
- C. 保持呼吸道畅通
- D. 吸氧
- E. 使用呼吸兴奋剂

57. 患者，女，28岁。外伤后便有膀胱损伤，有助于诊断的检查是

- A. 导尿试验
- B. 饮水试验
- C. 尿常规
- D. 排泄性尿道造影

E. 腹腔穿刺

58. 患者, 女, 28 岁。妊娠期糖尿病, 宫内妊娠 40 周分娩。婴儿出生后容易发生 ()

A. 低血糖

B. 低血压

C. 体温低于正常

D. 高血糖

E. 体温高于正常

59. 患者, 女, 25 岁。已婚未育, 阴道有脱出物, 拟诊为子宫脱垂二度轻型。导致该患者发生子宫脱垂最可能的原因是

A. 分娩损伤

B. 手术损伤

C. 腹压增加

D. 盆底组织发育不良

E. 盆底组织退行性变

60. 患者, 女, 23 岁。月经周期规律, 32 天一个周期, 那么她下一次周期大约在 ()

A. 月经周期的第 7 天

B. 月经周期的第 10 天

C. 月经周期的第 14 天

D. 月经周期的第 18 天

E. 月经周期的第 24 天

61. 患者, 男, 65 岁。高血压病史 20 余年, 突然发生言语不清伴左面部麻木, 一个月发生过 3 次, 每次持续 3~5 分钟。查体: 无神经系统异常。脑 CT 无异常, 该患者最可能的诊断是 ()

A. 脑出血

B. 硬脑膜下血肿

C. 短暂性脑缺血发作

D. 脑膜炎

E. 蛛网膜下腔出血

62. 患者, 男, 58 岁。高血压病史多年, 平素有胸前区不适, 持续 3~5 分钟, 含服硝酸甘油可缓解。今晨患者出现胸前区疼痛, 持续 2 小时不缓解。为明确诊断, 首选的检查是 ()

A. 心电图+心肌酶学

- B. X 线胸片
- C. 运动试验
- D. 动态心动图 (Holter)
- E. 超声心动图

63. 患者, 男, 53 岁。右上腹持续钝痛 3 月余。当地医院诊断为原发性肝癌, 1 天前腹痛、腹胀加剧, 腹部膨隆, 全身出冷汗。查体: 移动性浊音; 血常规: Hb76g/L, PLT 80×10^9 , WBC 3.5×10^9 /L, 最可能的诊断是 ()

- A. 肝性脑病
- B. 消化道出血
- C. 肝癌破裂出血
- D. 败血症
- E. 腹腔感染

64. 患者, 男, 48 岁。吞咽哽噎感半年, 目前仅能进半流质食物。查体: 稍消瘦, 锁骨上窝未触及肿大淋巴结。食管吞钡 X 线检查示食管中下段 4cm 有局限性管壁僵硬, 黏膜部分中断, 钡剂尚能通过。为明确诊断, 应进行的检查是 ()

- A. 食管造影
- B. 食管镜
- C. 核素扫描
- D. 食管拉网细胞学
- E. B 超

65. 患者, 男, 40 岁。行经尿道膀胱造瘘肿瘤电切术后 3 天。护理措施不正确的是 ()

- A. 加强心理护理
- B. 注意导尿管护理
- C. 进行饮食指导
- D. 减少饮水量, 避免刺激
- E. 加强基础护理

66. 患者, 男, 35 岁。有静脉吸毒史 10 年, 病毒感染检测阳性, 导致感染最可能的途径是 ()

- A. 蚊虫叮咬
- B. 性生活不洁
- C. 肝癌破裂出血

D. 血液传播

E. 呼吸道传染

67. 患儿，男，8岁。3天前出现前体温 39.5°C ，左侧面颊肿大并伴有周围组织水肿、灼热、疼痛，可从患儿的体液中分离出病原体的是（）

A. 唾液

B. 胃液

C. 尿液

D. 血液

E. 脑脊液

68. 患儿，男，5岁。发热2天，体温高达 39°C ，伴头痛、咽痛。病后第2天从头部及躯干开始出现皮疹，呈向心性分布，确诊为水痘。对患儿的护理措施不正确的是（）

A. 卧床休息

B. 保持皮肤清洁，衣着宽松

C. 给予酒精清洁

D. 给予高热量、高维生素、高蛋白、易消化的流质或半流质饮食

E. 做好口腔护理

69. 护士在医疗过程中发现不良事件，正确的做法是（）

A. 报告不良事件

B. 若当事人不是自己，可报可不报

C. 若无不良后果，可报可不报

D. 报告同事不良事件，是“小人”做法

E. 如果别人不知道，尽量化解

70. 护理人员的做法符合护理道德原则的是（）

A. 按照法律要求，给患者提供适度的信息供其选择

B. 发扬尊老爱幼道德风尚，优先护理年老及儿童患者

C. 满足患者要求，对其言听计从，以保证患者利益

D. 向患者及家属隐瞒病情以保证工作不受干扰

E. 护理患者时从实际出发，重点考虑医疗效率及经济利益

71. 关于重症胰腺炎的病因，正确的是（）

A. 以细菌感染为主，与胆道疾病无关

- B. 某些感染性疾病也可诱发
- C. 一般不会由药物诱发
- D. 可能与低脂血症有关
- E. 可能与低钙血症有关

72. 关于小儿特异性免疫的特征，正确的是（）

- A. 补体系统功能差
- B. 黏膜屏障作用不成熟
- C. 皮肤屏障作用不成熟
- D. T 淋巴细胞免疫功能不健全
- E. 中性粒细胞吞噬作用弱

73. 关于上尿路结石引起的疼痛，错误的是（）

- A. 疼痛一般与活动无关
- B. 易活动的结石表现为肾绞痛
- C. 较大的结石表现为钝痛
- D. 当结石嵌顿时可引起剧烈的肾绞痛
- E. 疼痛位于腰部或上腹部，沿输尿管放射至同侧下腹部及会阴

74. 关于护士的行为规范，叙述错误的是（）

- A. 尊重、关心、爱护患者
- B. 为患者提供优质服务
- C. 密切观察病情变化
- D. 没有对医嘱审查的责任
- E. 工作严谨、慎独、对执业行为负责

75. 关于隔离室的设置，不正确的是（）

- A. 房间内应具备有独立通风系统
- B. 空气传播疾病患者的房间应为负压
- C. 保护性隔离患者的房间应为正压
- D. 应在隔离病室内为医务人员准备洗手设备
- E. 具有缓冲房间

76. 关于肺和支气管的解剖与生理特点，错误的是（）

- A. 左右肺均分上、下两叶

- B. 气管约在平胸骨角部位分左右支气管
- C. 右支气管较左支气管“垂直”
- D. 右支气管管腔较左支气管管腔大
- E. 肺的主要生理功能是通气和换气

77. 根据标准预防概念，不具有传染性的物质是（）

- A. 血液
- B. 粪便
- C. 分泌物
- D. 尿液
- E. 汗液

78. 隔离的目的不包括

- A. 切断传播途径
- B. 治疗疾病
- C. 保护易感染者
- D. 控制感染源
- E. 消灭感染源

79. 高渗性脱水的病理生理特点是（）

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾>失水
- E. 失钠>失钾

80. 感觉疼痛的中枢位于（）

- A. 大脑皮层感觉区
- B. 脊髓前角灰质
- C. 脊髓后角白质
- D. 大脑边缘系统
- E. 视丘

81. 腹外疝最重要的发病因素是（）

- A. 慢性咳嗽

B. 长期便秘

C. 排尿困难

D. 腹壁有薄弱点或缺损

E. 重体力劳动

82. 腹部手术后肠胀气的主要原因是 ()

A. 肠内细菌代谢产生的气体过多

B. 血液内的气体弥散到肠腔内

C. 胃肠功能受抑制

D. 肠内容物代谢产生的气体

E. 经口吞咽气体过多

83. 风湿性心脏瓣膜病最常侵犯 ()

A. 主动脉瓣

B. 肺动脉瓣

C. 二尖瓣

D. 三尖瓣

E. 人工瓣膜

84. 多器官功能障碍综合征最常累及的器官是 ()

A. 心

B. 脑

C. 肺

D. 肝

E. 肾

85. 钝性暴力造成的损伤一般为 ()

A. 穿透伤

B. 裂伤

C. 火器伤

D. 挫伤

E. 擦伤

86. 对门诊患者进行健康教育的侧重点是 ()

A. 心理问题教育

- B. 常见病的防治教育
- C. 家庭保健指导
- D. 医院规章制度的介绍
- E. 康复指导

87. 对被血源性传播疾病病原体污染的病床及床旁桌进行消毒处理时，可使用（）

- A. 0.5%含氯消毒剂
- B. 70%乙醇
- C. 2%碘酊
- D. 2%戊二醛
- E. 95%乙醇

88. 断肢再植属于（）

- A. 自体移植
- B. 同种移植
- C. 异质移植
- D. 结构移植
- E. 异体移植

89. 导致二尖瓣狭窄患者死亡的最常见原因是（）

- A. 呼吸道感染
- B. 心律失常
- C. 充血性心力衰竭
- D. 感染性心内膜炎
- E. 心脏骤停

90. 胆道疾病首选的检查是（）

- A. B超
- B. 腹部平片
- C. 经皮肝穿刺胆管造影
- D. 胆道镜
- E. 内镜逆行胰胆管造影

91. 大面积烧伤早期发生的休克多为（）

- A. 神经源性休克

- B. 心源性休克
- C. 低血容量性休克
- D. 感染性休克
- E. 过敏性休克

92. 大量蛋白尿是指 24 小时尿蛋白定量超过 ()

- A. 1.5g
- B. 2.5g
- C. 3.5g
- D. 4.5g
- E. 5.5g

93. 处理针刺伤的首要步骤是 ()

- A. 挤出污血
- B. 挤压伤口
- C. 用清水清洗伤口
- D. 用肥皂液清洗伤口
- E. 用 0.5% 碘附消毒伤口

94. 肠内营养的供给途径不包括 ()

- A. 经鼻肾管
- B. 经鼻肠管
- C. 经口摄入
- D. 经空肠造瘘
- E. 经中心静脉

95. 肠结核最常见的好发部位是 ()

- A. 回盲部
- B. 升结肠
- C. 横结肠
- D. 降结肠
- E. 乙状结肠

96. 产褥感染最常见的致病菌是 ()

- A. 厌氧性链球菌

B. 溶血性链球菌

C. 葡萄球菌

D. 大肠杆菌

E. 肺炎球菌

97. 产妇分娩时，新生儿感染性肺炎的病因常为（）

A. 胎膜早破

B. 母孕期感染

C. 脐带感染

D. 上呼吸道下行感染

E. 经胎盘感染

98. 不属于日常健康行为的是（）

A. 规律作息

B. 合理营养

C. 充分睡眠

D. 适量运动

E. 定期检查

99. 不会诱发甲状腺危象的是（）

A. 感染

B. 严重精神创伤

C. 准备不够充分的甲状腺次全切手术

D. 非甲状腺的大手术

E. 应用受体阻滞剂

100. 表现为持续性腹痛的疾病是（）

A. 胃、十二指肠溃疡穿孔

B. 胆石症

C. 输尿管结石

D. 机械性肠梗阻

E. 胆道蛔虫病

1. 答案:C

解析:慢性萎缩性胃炎是慢性胃炎分类中的一种,其特征是胃黏膜已发生了萎缩性改变。幽门螺杆菌感染是慢性胃炎最主要的病因,其机制与幽门螺杆菌具有鞭毛结构、黏附素以及它所分泌的尿素酶对胃黏膜的损伤有关。

2. 答案:A

解析:中华护理学会是中国共产党领导下的护理科技工作者的学术性群众团体。

3. 答案:A

解析:肺炎链球菌肺炎抗生素治疗有效时,24-72 小时后体温即可恢复正常,抗生素疗程一般为 7 天,或退热后 3 天即可停药,改为口服用药,维持数天。

4. 答案:E

解析:胆碱酯酶活性测定是有机磷农药中毒的特异性标志酶的诊断指标,但酶的活性下降程度与病情及预后不完全一致。有机磷农药进入体内后迅速与体内的胆碱酯酶结合,生成磷酰化胆碱酯酶,使胆碱酯酶丧失水解乙酰胆碱的能力,导致胆碱能神经递质大量积聚且作用于胆碱受体,产生严重的神经功能紊乱,特别是呼吸功能障碍,从而影响生命活动。

5. 答案:E

解析:门诊教育包括以下几点。①候诊教育:指患者在候诊期间,针对候诊知识及该科的常见性疾病的防治所进行的健康教育;②随诊教育:指在诊疗过程中,医护人员根据病情对患者进行的口头教育和指导;③咨询教育:指医护人员对门诊患者或其他人员提出的有关疾病与健康问题进行解答;④健康教育处方:指在诊疗过程中,医生以医嘱的形式对患者的行为和生活方式给予指导。

6. 答案:D

解析:慢性肾功能不全是各种进展性肾病的最终结局,导致慢性肾功能不全发生的病因有很多,如慢性肾小球肾炎、代谢异常所致的肾脏损害、血管性肾病变、遗传性肾病等。在我国,以慢性肾小球肾炎最常见。

7. 答案:B

解析:群体传播中,根据讨论的主体,选择相关的人员组成小组,小组讨论的人数一般以 6~10 人为宜。

8. 答案:C

解析:①回归因素:指由于偶然因素,个别测试对象的某特征水平过高或过低,但在以后的测试中可能有恢复到原有的实际水平的现象。②时间因素(又称历史因素):是指在健康教育计划执行过程中发生的重大的、可能对目标人群产生影响的事件,如与健康相关的公共政

策的颁布、重大生活条件的改变、自然灾害或社会灾害等。③测量因素：指在评价过程中，测试者本身的态度、工作人员对有关知识和技能的熟练程度、测量工具的有效性和准确性及目标人群的成熟性对评价结果的正确性均有影响。测量者的态度和行为使目标人群受到暗示，并按照测量者的希望进行表现。④选择因素：指在评价阶段，如果干预组和对照组选择不均衡，可引起选择偏倚，从而影响观察结果的正确性。⑤失访：指在实验过程中，研究对象可能迁走或因与本病无关的其他原因死亡等。

9. 答案:D

解析:为预防胎死宫内，妊娠 28 周以后，指导孕妇掌握自我监护胎动的方法，若 12 小时胎动次数小于 10 次或胎动次数减少超过原胎动计数的 50%而不能恢复者，则表示胎儿宫内缺氧，应及时就诊，进一步诊断并处理。

10. 答案:C

解析:产后出血是分娩期的严重并发症，80%的产后出血发生在产后 2 小时内，所以产后 2 小时产妇应当留在产房接受监护。而子宫收缩乏力是产后出血最常见的原因，因此，应密切观察术后 2 小时内子宫收缩情况。

11. 答案:B

解析:原发性肝癌是指在肝细胞或肝内胆管细胞发生的癌，为我国常见恶性肿瘤之一。流行病学调查发现在粮油、食品受黄曲霉素 B1 污染严重的地区，肝癌发病率较高，提示黄曲霉素与肝癌的发生有关。有研究表明，黄曲霉素 B1 的摄入量与肝癌的死亡率呈正相关。

12. 答案:A

解析:支气管肺炎为儿童时期最常见的肺炎，以 2 岁内小儿最多见。该病起病急，四季均可发病，以冬、春季节多见。婴幼儿机体的免疫功能不健全，加上呼吸系统的解剖、生理特点，使得婴幼儿容易发生肺炎。该病一旦发生，大多病情严重。

13. 答案:B

解析:免疫系统是幼儿最主要的保护因素，幼儿的免疫系统发育不完善，对于微生物的抵抗力不强，易感性高，其他选项为次要因素，故应选 B 项。

14. 答案:A

解析:高热惊厥是儿童时期最常见的惊厥性疾病，其发作均与发热性疾病中体温骤然升高有关。多发于上呼吸道感染的初期，当体温骤升至 39℃ 左右时，突然发生惊厥。

15. 答案:D

解析:水和电解质广泛分布在细胞内外,参与体内许多重要的功能和代谢活动,对正常生命活动的维持起着非常重要的作用。胃肠减压期间应禁食、禁饮,一般应停药。如需胃内注药,注意注药后应夹管并暂停减压 0.5-1 小时。胃肠减压易造成水、电解质失衡,应当补液、加强营养,以维持水、电解质的平衡。

16. 答案:B

解析:患者脑完全缺血、缺氧 4~6 分钟将出现不可逆的脑细胞死亡,心跳骤停的抢救宜在患者出现脑细胞死亡前尽快介入,因此,抢救的黄金时间为 4~6 分钟。

17. 答案:B

解析:权力性影响力的主要因素包括以下几点。①传统因素:是建立在人们对领导者传统认识基础上的历史观念。②职位因素:是建立在人们对领导者在组织中的职务及地位相关、以法定权力为基础的力量。实际生活中,职位因素的影响是很深刻的,是行使权力的有利条件。③资历因素:资历的深浅在一定程度上决定着权利性影响力。人们往往尊重资历较深的领导者。任职 10 年的护士长的影响力较刚上任的护士长要大是由于其资历的影响力。

18. 答案:E

解析:胸腔闭式引流的目的是引流胸膜腔内积气、血液和渗液,重建胸膜腔负压,保持纵隔的正常位置,促进肺复张。不包括预防肺部感染,故此题应选 E 项

19. 答案:E

解析:心力衰竭是由于各种心脏结构或功能异常导致心室充盈和射血能力低下而引起的一组临床综合征。有基础心脏病的患者,其心力衰竭症状常由某些加重原发疾病或增加心脏负荷的因素所诱发。呼吸道感染是其最常见、最重要的诱因。

20. 答案:E

解析:小儿预防接种需严格无菌操作,接种活疫苗时,用 70%-75%乙醇消毒。接种后剩余活疫苗应烧毁。

21. 答案:C

解析:前囟为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙,其对边中点连线长度在出生时为 1.5~2.0cm,后随颅骨发育而增大,6 个月后逐渐骨化而变小,1-1.5 岁时闭合,最迟不超过 2 岁。

22. 答案:D

解析:下肢深静脉血栓是指血液在下肢深静脉内不正常的凝结并阻塞管腔,导致血液回流障碍的一种疾病。在急性阶段由于血栓脱落所引发的肺梗死是临床猝死的常见原因,因此下肢深静脉血栓脱落最易栓塞的部位是肺。

23. 答案:E

解析:细菌性痢疾是由志贺菌属引起的肠道传染病。传播方式是通过消化道传播,其粪便培养可分离出志贺菌属痢疾杆菌,用于确认诊断免疫学检查早期可快速诊断,但易出现假阳性。脓血便与腹泻只是症状,不作为重要依据。

24. 答案:A

解析:戊型肝炎经粪-口(包括动物粪便)途径传播,多见于雨季或洪水之后,预后良好。

25. 答案:E

解析:胃壁细胞分泌盐酸和内因子。胃壁细胞表面分布着组胺 H₂ 受体、胃泌素受体、乙酰胆碱受体,当组胺、胃泌素、乙酰胆碱与其受体结合后就会激活质子泵,生成盐酸;内因子与食物中的维生素 B₁₂ 结合,使其被回肠末端吸收。

26. 答案:C

解析:腰椎穿刺可以测定颅内压力,同时可取脑脊液作检查,但有明显颅内压增高者可能会引发脑疝,故应禁忌腰穿,避免促成枕骨大孔疝。

27. 答案:B

解析:由于社区居民来自不同的文化阶层,故社区护理健康教育应以不同的形式开展。其主要形式有 4 种:①语言教育形式:是实际应用中最简便、最有效的常用方法之一;②文字教育形式:可为多种多样,如标语、传单、课本、小册子、报刊、墙报、板报等;③形象教育形式:包括戏剧、电影、电视、录像、展览等;④电化教育形式:包括广播、网站、搜集整理、收音、录音等。小品贴近生活,角度新颖,语言精练,感染力强,属于形象教育形式。

28. 答案:D

解析:劝服是针对健康教育对象存在的健康问题,说服其改变不正确的健康态度、信念及行为习惯的人际传播形式。

29. 答案:E

解析:一般在术前 0.5-1 小时通过静脉途径给予一次足量抗生素,使手术开始时组织和血清内达到药物杀菌波度,并在整个手术过程中使药物浓度维持在治疗性水平。

30. 答案:B

解析:左向右分流型又称潜伏青紫型,在左右心之间或主动脉与肺动脉之间有异常通路,常见的有室间隔缺损、房间隔缺损和动脉导管未闭等。另外右向左分流型包括法洛四联症和大动脉错位,无分流型包括主动脉狭窄和肺动脉狭窄。

31. 答案:B

解析:①目标管理提出者:彼得-德鲁克;②管理职能提出者:哈罗德孔茨;③管理学基本原理提出者:切斯特巴纳德;④决策模式理论提出者:赫伯特,西蒙;⑤需要层次理论提供者:马斯洛。

32. 答案:A

解析:超急性排斥反应一般发生于移植器官恢复血流后数分钟至数小时内。超急性排斥反应在肾移植术后比较常见,一般发生于恢复血流后 24 小时内。

33. 答案:B

解析:颅底部的硬脑膜与颅骨贴附紧密,故颅底骨折时易撕裂硬脑膜,产生脑脊液外漏而成为开放性骨折。骨折本身无需特殊处理,重点是预防颅内感染,出现脑脊液漏时应使用 TAT 及抗生素预防感染。此外,脑脊液漏者禁忌腰椎穿刺,注意预防颅内逆行感染。

34. 答案:E

解析:人体主要内分泌腺有下丘脑、垂体、甲状腺、甲状旁腺、胰岛、肾上腺和性腺。

35. 答案:A

解析:流行性乙型脑炎是由乙型脑炎病毒引起,以脑实质炎症为主要病变的中枢神经系统急性传染病。其血清学检查中特异性 IgM 抗体测定,在感染后第 4 天即出现,2~3 周达高峰,阳性率达 95%以上,是目前最常见的用于确诊流行性乙型脑炎的抗体。

36. 答案:B

解析:成人缺铁性贫血最常见的原因是慢性失血

37. 答案:B

解析:女性生殖系统的生理特点之一就是它的周期性变化,月经则是这个周期性变化的重要标志。月经周期的建立不仅是青春期成熟的重要标志,同时也作为内生殖器已经发育成熟的指标,因此,规律月经是性功能成熟的标志。此题注意月经初潮是青春期的重要标志,不要混淆。

38. 答案:A

解析:耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MR-SA)的传播主要通过医护人员的手,在患者、医护人员,意者间传播。

39. 答案:E

解析:子宫肌瘤的发生与生长和雌激素的长期刺激有关。

40. 答案:D

解析:面部危险三角区通常是指两侧口角至鼻根连线所形成的三角形区域。挤压此区域易发生脑膜炎或脑脓肿。

41. 答案:A

解析:迷走神经为混合性神经,是行程最长、分布范围最广的脑神经。含有感觉、运动和副交感神经纤维。迷走神经兴奋属于抑制反应,它支配呼吸、消化、循环系统和腺体的分泌,兴奋时可出现头晕眼花、眼睑下垂、鼻塞、流泪以及心动过缓等。

42. 答案:D

解析:慢性支气管炎是气管、支气管黏膜及周围组织的慢性非特异性炎症。本病的病因尚不完全清楚,可能是多种因素长期作用的结果,如有害气体和有害颗粒、感染因素以及其他因素。当有害气体和有害颗粒刺激黏膜下感受器,使副交感神经功能亢进、支气管平滑肌收缩、腺体分泌亢进、杯状细胞增生、黏液分泌增加和气道阻力增加。

43. 答案:E

解析:开放性肺结核属于呼吸道传染性疾病,主要通过飞沫传播。

44. 答案:B

解析:健康教育指通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动,使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式,消除或减轻影响健康的危险因素,预防疾病、促进健康、提高生活质量并对教育效果作出评价。健康教育以调查研究为前提,以传播信息为主要措施,以改善对象健康相关行为为目标,以达到预防疾病、促进健康。

45. 答案:E

解析:健康促进指运用行政的或组织的手段,广泛协调社会各相关部门及社区、家庭和个人,使其履行各自对健康的责任,共同维护和促进健康的一种社会行为和社会战略。健康促进领域包括五个方面:①制订能促进健康的公共政策;②创造支持性环境;③加强社区行动;④发展个人技能;⑤调整卫生服务方向。

46. 答案:C

解析:健康传播是指通过各种渠道,运用各种传播媒介和方法,为维护和促进人类健康而收集、制作、传递、分享健康信息的过程。健康传播的特点主要有以下四点:①健康传播传递的是健康信息;②健康传播具有明确的目的性;③健康传播的过程具有复合性;④健康传播者属于专门的技术人才。健康传播是以健康为中心的知识传播,一般都是非盈利性的。

47. 答案:C

解析:慢性肾小球肾炎的进程主要取决于疾病的病理类型,但有些因素可促使肾功能急剧恶化,如感染、劳累、妊娠、应用肾毒性药物、预防接种以及高蛋白、高脂或高磷饮食等。排除A、C、E选项,慢性肾小球肾炎治疗原则中有降压治疗,所以血压也是有影响的,故此题应选C选项。慢性肾小球肾炎患者应选择优质低蛋白饮食。

48. 答案:D

解析:急性乳腺炎是乳腺的急性化脓性感染,常发生于产后哺乳期妇女且多为初产妇,往往发生在产后3~4周。预防措施包括:①保持乳头清洁;②纠正乳头内陷;③排空乳汁,防止淤积;④保持婴儿口腔卫生;⑤及时处理乳头破损,破损时应暂停哺乳,改用吸乳器,及时涂抗生素软膏,待损伤愈合后再哺乳。

49. 答案:D

解析:急性感染性多发性神经根神经炎又称吉兰-巴雷综合征,是儿童最常见的急性周围神经疾病。易发于夏、秋季节,因此,为7~9月。

50. 答案:C

解析:预防措施包括:①控制局麻药的安全剂量;②在局麻药溶液中加入肾上腺素,以减慢吸收和延长麻醉时效;③防止局麻药误注入血管内,必须注意抽吸时有无血液回流,在注入全剂量前,可先注试剂量以观察反应;④警惕毒性反应的先驱症状,如惊恐、突然入睡、多语和肌肉抽动;⑤使用地西洋和其他苯二氮类药作为麻醉前用药。

51. 答案:D

解析:考虑患者出现肝性脑病,肝性脑病常见诱因有上消化道出血、高蛋白饮食、大量使用排钾利尿剂和放腹水、应用镇静催眠药和麻醉药、便秘、感染、尿毒症、低血糖和外科手术等。根据患者症状——呕血1000ml、排黑便一次可判断患者为上消化道出血。

52. 答案:B

解析:根据题意判断该患者为一氧化碳中毒,其中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。轻度一氧化碳中毒者血中碳氧血红蛋白可高于10%,中度中毒者可高于30%,严重中毒时可高于50%。

53. 答案:B

解析:肺结核症状常表现为发热(午后低热)、月经不调、乏力、盗汗、体重减轻、咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难等,X线胸片常有异常阴影出现。与此患者症状基本符合,故首先考虑肺结核。

54. 答案:E

解析:根据题意知患者为妊娠期高血压伴子痫前期,应注意休息,密切监护母儿状态,间断吸氧,应提供充足的蛋白质和热量饮食,不限盐和液体,对全身水肿者适当限盐,B项错误。患者已经妊娠 36+2 周,主要的护理措施应该为定期监测胎儿发育状况及胎盘情况,根据情况选择合适的妊娠方式。

55. 答案:D

解析:患者车祸脾破裂。(实质性脏器破裂)会出现大出血,根据患者查体情况可判断患者为脾破裂出血引起的失血性休克,失血性休克属于低血容量性休克。

56. 答案:C

解析:本题患者出现咯血症状,咯血最严重的并发症是窒息,窒息是危及生命的,因此,保持呼吸道通畅是首要的措施。

57. 答案:A

解析:膀胱损伤是膀胱在收到外力的作用时发生破裂,引起膀胱完整性破坏、血尿外渗。导尿试验有助于诊断膀胱损伤,导尿试验是经导尿管注入无菌生理盐水 200ml 至膀胱,片刻后吸出。若引流出的液体量明显少于或多于注入量,则提示膀胱破裂。

58. 答案:A

解析:妊娠期糖尿病.产妇分娩后,新生儿仍存在高胰素血症,如不及时补充糖则易发生新生儿低血糖,严重时可危及生命.新生儿出生 30 分钟后应定时滴服 25%葡萄糖液防止低血糖。

59. 答案:D

解析:子宫脱垂的病因包括:①分娩损伤(最主要原因);②长期腹压增加;③盆底组织发育不良或退行性变。根据患者已婚未育可判断为盆底组织发育不良,子宫脱垂偶见于未产妇或处女,多是先天性盆底组织发育不良或营养不良所致。

60. 答案:A

解析:两次月经第 1 日的间隔时间称为月经周期,一般为 21~35 天,平均 28 天,周期的长短因人而异,但每位妇女的月经周期有自己的规律性。以一个正常月经周期 28 天为例,月经期为月经周期的第 1~4 天,患者周期为 32 天,则月经期为月经周期的第 1~7 天。

61. 答案:C

解析:短暂性脑缺血表现为神经功能障碍持续数分钟至数小时,并在 24 小时内恢复正常,可反复发作,多无意识障碍。椎动脉系统闭塞的主要表现为眩晕、恶心呕吐、眼球震颤、步态不稳、复视、耳鸣及猝倒等,故此题应选 C 项。

62. 答案:A

解析:患者出现心前区疼痛且持续2小时不缓解,判断可能为急性心肌梗死。心电图的动态演变和血清心肌坏死标志物波度的动态改变是明确诊断急性心肌梗死的首选检查。

63. 答案:C

解析:原发性肝癌的并发症包括肝性脑病、上消化道出血、癌肿破裂出血、肝肾综合征及继发性感染等。当肝癌结节发生坏死、破裂,引起腹腔内出血时,则表现为突发右上腹剧痛和压痛,腹膜刺激征和内出血等。

64. 答案:B

解析:根据该患者有吞咽哽噎感半年的临床症状和查体情况以及食管吞钡检查可诊断该患者为食管癌。食管纤维内镜检查可直视肿块部位、形态,还可钳取活组织作病理学检查,病理学检查确诊该病,因此选择食管镜。

65. 答案:D

解析:经尿道膀胱造瘘肿瘤电切术后,对保留膀胱的患者需要行膀胱灌注化疗。灌注后嘱患者应多饮水,起到生理性膀胱冲洗的作用,减少化疗药物对尿道黏膜的刺激。

66. 答案:D

解析:本题患者有静脉吸毒史10年,可能是使用了受病毒污染的、未消毒的针头或注射器刺伤皮肤,导致的病毒感染,属于血液传播。

67. 答案:A

解析:根据题意可判断患者为腮腺炎,是儿童和青少年期常见的呼吸道传染病。它是由腮腺炎病毒引起的急性、全身性感染,以腮腺肿痛为主要特征,有时亦可累及其他唾液腺。患者是传染源,直接接触、飞沫、唾液的吸入为主要传播途径。

68. 答案:C

解析:水痘是自限性疾病,无合并症时以一般护理和对症护理为主。为避免皮肤留有瘢痕,皮肤护理是关键。应卧床休息至热退、症状减轻;保持室内空气清新,保持皮肤清洁;给予富含营养且易消化的饮食。此外,水痘的黏膜皮疹还可出现在口腔,应做好口腔护理。A、B、D、E选项均正确。酒精会刺激皮肤,增加患者不适,故此题应选C项。

69. 答案:A

解析:医疗过程中发生不良事件应当立即协助医生减轻或避免对患者的伤害,然后立即上报不良事件。

70. 答案:A

解析:护理道德原则包括:自主原则、公正原则、无害原则、有利原则、知情同意原则。B、C、D、E选项均不符合护理道德原则,故此题应选A项,符合知情同意原则。

71. 答案:B

解析:重症胰腺炎的病因包括胆石症与胆道疾病、胰管阻塞、酗酒和暴饮暴食、手术与创伤、内分泌与代谢障碍、感染、药物等。可以看出A、C选项均错误,高钙血症和高脂血症与胰腺炎发病有关,低钙血症和低脂血症与其无关。

72. 答案:D

解析:小儿特异性免疫反应包括细胞免疫和体液免疫两种,这两种免疫反应必须由抗原性物质进入机体刺激免疫系统后方可形成。T淋巴细胞主要担负细胞免疫功能,B淋巴细胞主要担负体液免疫功能。本题A、B、C、E选项均为非特异性免疫特征,只有D选项为特异性免疫。

73. 答案:A

解析:上尿路结石主要表现为与活动有关的肾区疼痛与血尿。其程度与结石的部位、大小,活动与否及有无损伤、感染、梗阻等有关。肾盂内大结石及肾盏结石可无明显临床症状,活动后可引起上腹和腰部钝痛。输尿管结石疼痛位于腰部或上腹部,沿输尿管放射至同侧下腹和会阴部,可至大腿内侧。疼痛性质为刀割样阵发性绞痛。

74. 答案:D

解析:护士临床工作中需做到三查八对,收到医嘱时应双人核查,若有疑问应当核实无误后才能执行。

75. 答案:A

解析:隔离室装有空调装置,感染患者的隔离室采用负压空调,易感宿主隔离室采用正压空调。室内空气交换8次/小时,以降低病原菌通过空气传播的可能性。隔离室内非独立通风系统,故应选A项。

76. 答案:A

解析:气管上端平第6颈椎体下缘,起自环状软骨下缘,向下至胸骨角平面分为左、右主支气管,B选项正确。左主支气管细而长,走向较水平,右主支气管粗而短,走向较垂直。C、D选项均正确。肺的主要生理功能是通气功能和换气功能,E选项正确,故应选A项。

77. 答案:E

解析:标准预防认为患者的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性,需进行隔离。

78. 答案:E

解析:隔离的目的对感染者进行治疗,控制感染源,切断传播途径,保护易感染者,隔离并不能消灭感染源。

79. 答案:B

解析:高渗性脱水又称原发性脱水,水和钠同时缺失,但缺水多于缺钠,故血清钠高于正常范围,细胞外液呈高渗状态;低渗性脱水时,失钠大于失水;等渗性脱水时,失水等于失钠。

80. 答案:A

解析:大脑皮质是调节躯体运动或控制躯体运动的最高级中枢。大脑皮层既有躯体运动中枢,又有感觉中枢(如痛觉、渴觉中枢),因此,感觉疼痛的中枢位于大脑皮层的躯体运动中枢。

81. 答案:D

解析:腹外疝是由腹腔内的脏器或组织连同腹膜壁层,经腹壁薄弱点或孔隙向体表突出所形成,其最重要的发病因素是自身的腹壁有薄弱点或存在缺损。

82. 答案:C

解析:腹部手术后早期肠胀气是由于胃肠蠕动受抑制所致,随胃肠蠕动恢复即可自行缓解。若术后数日仍未排气且兼有腹胀,可能是腹膜炎或其他原因所致的肠麻痹,术后应注意观察。

83. 答案:C

解析:风湿性心脏瓣膜病是由于风湿热活动累及心脏瓣膜而造成的心脏瓣膜病变,主要累及40岁以下人群,临床上以二尖瓣最常受累,其次为主动脉瓣。

84. 答案:C

解析:多器官功能障碍综合征是指机体在急性疾病过程中,有两个或两个以上的器官或系统同时或序贯发生功能障碍的临床综合征。其器官系统功能障碍发展常呈序贯性,多以某一器官起始,以肺功能障碍最常见,其次为肾、肝障碍,还可累及循环系统、中枢神经系统、消化系统、免疫系统以及凝血系统。

85. 答案:D

解析:由钝器直接作用于人体软组织而引起的损伤叫做挫伤,是最常见的损伤。裂伤多由于急剧的拉扯或扭转造成,火器伤一般是由于火焰、热液、热蒸汽等造成,擦伤是与较粗糙物体快速摩擦造成。

86. 答案:B

解析:由于门诊患者流动性、差异性大,不可能针对每个患者的需求开展健康教育。因此,门诊教育往往根据不同季节、地域,侧重于常见病的防治教育。

87. 答案:A

解析:70%乙醇适用于手和皮肤消毒,95%乙醇消毒剂杀菌效果低于70%乙醇,2%碘酊适用于手术部位、注射部位和穿刺部位的皮肤消毒,2%戊二醛的灭菌常用浸泡法。病室内受到病原微生物污染的各类用品、物品表面,可用一定浓度的含氯消毒剂或过氧乙酸喷洒或擦拭,还可用紫外线灯照射消毒。

88. 答案:A

解析:断肢再植是对完全断离或不完全断离的肢体,采用显微外科技术对其进行清创、血管吻合、骨骼固定以及修复肌腱和神经,将肢体重新缝合到原位,使其完全存活并恢复一定功能的精细手术,断肢再植符合自体移植(献出器官和接受器官的供受者属同一个体),所以选择自体移植。

89. 答案:C

解析:二尖瓣狭窄是常见的瓣膜病,其并发症包括充血性心力衰竭、心律失常、亚急性感染,性心内膜炎、栓塞。其中,充血性心力衰竭是首要潜在并发症,是本病就诊和致死的主要原因。

90. 答案:A

解析:胆道疾病常用的超声检查方法有B超和超声内镜检查。B超是诊断胆道疾病的首选方法,因该方法无创、简单、可重复、经济且准确率高。

91. 答案:C

解析:烧伤早期为急性体液渗出期,组织烧伤后的立即反应是体液渗出,伤后2~3小时最为急剧,8小时达高峰。此期由于体液的大量渗出和血管活性物质的释放,容易发生低血容量休克,临床又称休克期。

92. 答案:C

解析:每天尿蛋白持续超过150mg,蛋白定量试验呈阳性反应,称为蛋白尿。若24小时尿蛋白持续超过3.5g/1.73m²或50mg/kg,称为大量蛋白尿。

93. 答案:A

解析:处理针刺伤的步骤:轻轻挤压伤口→挤出污血至挤不出血为止→用流动的水和肥皂液冲洗伤口10分钟以上→用70%乙醇或0.5%碘附消毒伤口。挤压伤口为必要动作,挤出污血才是首要步骤,尽量减少血液传播。

94. 答案:E

解析:肠内营养是经胃肠道提供代谢需要的营养物质及其他各种营养素的营养支持方式。肠内营养的途径有口服和经导管输入两种,其中经导管输入可选用鼻胃管、鼻十二指肠管、鼻空肠管和胃空肠造瘘管,不包括经中心静脉。

95. 答案:A

解析:肠结核主要由人型结核分枝杆菌引起,主要发生回盲部,可能与含有结核分枝杆菌的肠内容物在回盲部停留的时间较长且回盲部淋巴组织丰富,结核分枝杆菌又容易侵犯淋巴组织有关。肠段也常受累,依次为升结肠、空肠、横结肠、降结肠、阑尾、十二指肠和乙状结肠,少数见于直肠。

96. 答案:B

解析:产褥感染是指产褥期内生殖道受病原体侵袭而引起局部和全身的炎性变化,包括内源性感染和外源性感染。需氧性链球菌是外源性感染的主要致病菌,尤其B族 β -溶血性链球菌产生外毒素与溶组织酶,有极强的致病力、毒力和播散力,可致严重的产褥感染。

97. 答案:C

解析:新生儿感染性肺炎病原体的侵入,可发生在出生前、出生时及出生后。出生前感染一般是胎膜早破感染,母孕期感染以及胎盘感染。出生时感染为产道分泌物或断脐消毒不严发生的感染,为脐带感染。出生后感染为上呼吸道下行感染。因此分娩时为脐带感染。

98. 答案:E

解析:定期检查是通过专业的医疗技术手段完成的身体健康检查,属于非日常行为。A、B、C、D选项都属于日常健康行为,故应选E项。

99. 答案:E

解析:甲状腺危象是甲状腺毒症急性加重的一个综合征,发生原因可能与短时间内大量T₃、T₄释放入血有关。多发生于较重甲亢未治疗或治疗不充分的患者。主要诱因有应激状态(感染、手术)、严重躯体疾病、口服过量TH制剂、严重精神创伤、手术中过度挤压甲状腺、手术准备不充分。

100. 答案:A

解析:胃、十二指肠溃疡急性穿孔,主要表现为突发性上腹部刀割样剧痛,且持续不缓解;胆石症疼痛表现为阵发性疼痛或持续性疼痛,呈阵发性加剧;输尿管结石典型表现为突发性疼痛,持续数分钟至数小时不等;机械性肠梗阻表现为阵发性腹部绞痛;胆道蛔虫病表现为突发性剑突下方钻顶样疼痛,疼痛可突然平息,又可突然再发,无一定规律。因此表现为持续性腹痛的是胃、十二指肠溃疡穿孔。